Ион АКИРИ Николае ПРОДАН Валентин ГАРИТ Думитру ТАРАГАН Петру ЕФРОС Анатол ТОПАЛЭ Василе НЯГУ Василе ЧОБАНУ

S S S MAM



PRUT

класс



Ион АКИРИ Николае ПРОДАН Валентин ГАРИТ Думитру ТАРАГАН Петру ЕФРОС Анатол ТОПАЛЭ Василе НЯГУ Василе ЧОБАНУ

МАТЕМАТИКА





Acest manual este proprietatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Manualul școlar a fost realizat în conformitate cu prevederile curriculumului la disciplină, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 906 din 17 iulie 2019. Manualul a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1219 din 06 noiembrie 2020, ca urmare a evaluării calității metodico-științifice.

Школа/лицей Учебник №									
Год	Фамилия и имя	Учебный	Состояние учебника						
пользования	учащегося	год	в начале года	в конце года					
1									
2									
3									
4									
5									

- Учитель должен проверить правильность написания фамилии и имени ученика.
- Запрещаются записи на страницах учебника.
- Состояние учебника в начале и в конце года определяется оценками: отлично, хорошо, удовлетворительно или плохо.

Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin Editurii *Prut Internațional*. Reproducerea integrală sau parțială a textului sau a ilustrațiilor din această carte este permisă doar cu acordul scris al editurii.

Autori: Ion Achiri, doctor, conferențiar universitar, IŞE (Modulul 4)

Vasile Ciobanu, doctor, conferențiar universitar, USM (Modulul 1)

Petru Efros, doctor, conferențiar universitar, USM (Modulele 8-10)

Valentin Garit, doctor, conferențiar universitar, USM (Modulele 8-10)

Vasile Neagu, doctor habilitat, profesor universitar, USM (Modulele 3, 5)

Nicolae Prodan, doctor, conferențiar universitar, USM (Modulele 6, 7)

Dumitru Taragan, doctor, conferențiar universitar, USM (Modulul 2)

Anatol Topală, doctor, conferențiar universitar, USM (Modulele 6, 7)

Comisia de evaluare: Ludmila Baş, grad didactic superior, LT "Constantin Stere", Soroca – coordonator Aliona Laşcu, grad didactic superior, LT "Mihai Eminescu", Chişinău Gabriela Diaciuc, grad didactic superior, LT "Alexandr Puşkin", Făleşti Radion Blându, grad didactic superior, LT "Spiru Haret", Chişinău Andrei Corlat, doctor, conferențiar universitar, UTM

Traducere din limba română: Ion Achiri, Petru Efros, Antonina Erhan, Valentin Garit, Nicolae Prodan

Redactor: Tatiana Rusu Corector: Tatiana Şarşov Copertă: Sergiu Stanciu

Paginare computerizată: Valentina Stratu

© Editura Prut Internațional, 2020

© I. Achiri, V. Ciobanu, P. Efros, V. Garit, V. Neagu, N. Prodan, D. Taragan, A. Topală, 2020

Editura Prut Internațional, str. Alba Iulia 23, bl. 1 A, Chișinău, MD-2051

Tel.: (+373 22) 75 18 74; (+373 22) 74 93 18; e-mail: office@prut.ro; www.edituraprut.md

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Математика: Учебник для 11-го класса / Ион Акири, Василе Чобану, Петру Ефрос, Валентин Гарит, Василе Нягу, Николае Продан, Думитру Тараган, Анатол Топалэ; comisia de evaluare: Ludmila Baş (coordonator) [et al.]; traducere din limba română: Ion Achiri [et al.]; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. – Chișinău: Prut Internațional. – 304 p.

ISBN 978-9975-54-516-7

51(075.3) M 340

Imprimat la Tipografia Unisoft

Предисловие

Данный учебник составлен в соответствии с действующим куррикулумом для лицеев (2019 г.), основанным на формировании компетенций.

Учебник структурирован по модулям. В начале каждого модуля приводятся образовательные цели, которые могут быть достигнуты в процессе изучения модуля. Цели, обозначенные (*), рекомендованы только для реального профиля. Согласно куррикулуму, учебник содержит разделы по математическому анализу, комплексным числам, высшей алгебре и геометрии.

На этом этапе изучения математики ученики знакомятся с ранее неизвестными им понятиями. Поэтому необходимо обращать внимание как на теоретический материал (определения, теоремы, свойства и т. д.), представленный в учебнике, так и на приведенные примеры, задания с решением. Только в таком случае можно реализовать принцип конструктивности и формирующий принцип, положенные в основу математического образования.

Учебник составлен таким образом, что им можно пользоваться при преподавании математики как для реального профиля, так и для гуманитарного профиля, профилей искусство и спорт. Заметим, что материал, обозначенный вертикальной чертой слева, предусмотрен только для реального профиля. Для гуманитарного профиля, профилей искусство и спорт этот материал предлагается как дополнительный. Кроме того, в соответствии с предусмотренными целями, упражнения и задачи, приведенные в конце каждого параграфа, а также в конце каждой главы, классифицированы по профилям*). Задания повышенной сложности обозначены звездочкой (*) и поэтому необязательны.

Итоговые тесты предназначены для проверки достигнутого уровня и разработаны по профилям.

Некоторые указания призваны упростить организацию индивидуальной работы учащихся. Кроме мотивационных упражнений, упражнений для закрепления и применения понятий, в учебнике приведены образцы решения типовых упражнений.

^{*)} Упражнения и задачи для каждого профиля классифицированы по уровням:

а) гуманитарный профиль, профили искусство и спорт: \mathbf{A} – знание и понимание, \mathbf{B} – применение, \mathbf{C} – интегрирование;

б) реальный профиль: A_1 – знание и понимание, B_1 – применение, C_1 – интегрирование.

В данном учебнике использованы символы и обозначения, обычно встречающиеся в литературе и рекомендованные куррикулумом по математике для гимназии. Также использованы буквы греческого алфавита, который приведен ниже.

Учебник дает возможность ученикам с математическими способностями углубить свои знания, усваивая дополнительные теоретические понятия и выполняя задания повышенной сложности.

Уважаемые учителя! Дорогие учащиеся! Надеемся, что данный учебник станет полезным дидактическим инструментом в изучении математики. Также будем благодарны за Ваши отзывы, пожелания и предложения по совершенствованию учебника.

Авторы

Греческий алфавит

Буквы	Названия	Буквы	Названия		
Αα	альфа	N v	НЮ		
В β	бета	Ξξ	кси		
Γγ	гамма	Оо	омикрон		
Δδ	дельта	Ππ	ПИ		
Εε	эпсилон	Pρ	po		
Ζζ	дзета	Σσ	сигма		
Нη	эта	Τ τ	тау		
Θθ	тета	Υυ	ИПСИЛОН		
Ιι	йота	Φφ	фи		
Kκ	капа	×χ	ХИ		
Λλ	лямбда	Ψψ	ПСИ		
Μ μ	МЮ	Ωω	омега		

Модуль

LOCUSTIOE GLEVIPHOCTN действительных чисел

Цели

- использование действительных чисел для выполнения вычислений в различных кон-
- представление различными способами последовательностей, арифметических и геометрических прогрессий;
- классификация последовательностей действительных чисел по разным критериям; применение последовательностей, арифметических и геометрических прогрессий в различных контекстах;
- *использование в различных контекстах понятия предела последовательности, сходящихся и расходящихся последовательностей.

Модули 1-5 учебника посвящены изучению начал математического анализа (или просто анализа) – одного из фундаментальных разделов математики. Анализ находит применение в физике, геометрии, технике, экономике и других областях. В основе математического анализа лежат понятия действительного числа и предела. Предмет исследования математического анализа – это функциональные зависимости, производные, интегралы, которые по существу являются соответствующими пределами. Прежде чем приступить к изучению предела функции, рассмотрим предел числовой последовательности.

Последовательности действительных чисел. Повторение и дополнения

1.1. Точные верхние и нижние грани множеств лействительных чисел

Рассмотрим некоторые свойства множеств действительных чисел, необходимые для знакомства с начальными понятиями и методами математического анализа.


Аксиома непрерывности множества действительных чисел


Пусть A и B – два таких непустых подмножества \mathbb{R} , что для любого $a \in A$ и любого $b \in B$ верно соотношение $a \le b$. Тогда существует хотя бы один элемент $c \in \mathbb{R}$ такой, что $a \le c \le b$.

Принцип Архимеда1

Для любого $x \in \mathbb{R}$ существует единственное целое число mтакое, что $m \le x < m+1$.

Число m называется **целой частью** числа x и обозначается [x].





Определения. • Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху (снизу), если существует такое число $c \in \mathbb{R}$, что $x \le c$ ($x \ge c$) для любого $x \in X$. Число c называется верхней (нижней) гранью множества X.

• Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется **ограниченным**, если оно ограничено сверху и снизу, то есть существуют действительные числа m, M такие, что $m \le x \le M$ для любого $x \in X$.

Для каждого из этих определений можно сформулировать логическое отрицание. Например, отрицание первого определения: множество $X \subset \mathbb{R}$ не ограничено сверху (снизу), если для любого $m \in \mathbb{R}$ найдется $x' \in X$ такой, что x' > m (x' < m). (Используя кванторы \forall , \exists , условие "для любого [для всех, для каждого] $m \in \mathbb{R}$ существует [найдется] $x' \in X$ " можно записать так: $\forall m \in \mathbb{R}$, $\exists x' \in X$.)

Замечание. Любое множество $X \subset \mathbb{R}$, ограниченное сверху (снизу), имеет бесконечное число верхних (нижних) граней. Если число c – верхняя (нижняя) грань множества X, то любое другое число c, большее (меньшее), чем c, также является верхней (нижней) гранью множества X. Действительно, для любого $x \in X$, при котором $x \le c$ и c < c, следует, что $x \le c$, значит, c, также является верхней гранью.

Определение. Элемент $a \in X$ (если он существует), $X \subset \mathbb{R}$, называется наибольним (соответственно наименьшим) элементом множества X, если $x \le a$ (соответственно $x \ge a$) для любого $x \in X$. Обозначают: $a = \max X$ ($a = \min X$).

Пример

Для множества $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ очевидно, что $\max A = 1$, а $\min A$ не существует.

Определения. • Наименьшая верхняя грань (если она существует) множества $X \subset \mathbb{R}$, ограниченного сверху, называется **точной верхней гранью**, или **супремумом** множества X, и обозначается $\sup X$.

- Наибольшая нижняя грань (если она существует) множества $X \subset \mathbb{R}$, ограниченного снизу, называется **точной нижней гранью**, или **инфинимумом** множества X, и обозначается inf X.
- Замечание. Если $\alpha = \inf X$ и $\beta = \sup X$, а $Y = \{-x \mid x \in X\}$, то $\inf Y = -\beta$ и $\sup Y = -\alpha$. Примеры
- **1.** Множество натуральных чисел **N** не ограничено сверху, но ограничено снизу. Следовательно, множество **N** не ограничено. Множества **Z**, \mathbb{Q} , \mathbb{R} не ограничены ни сверху, ни снизу.
 - **2.** Множество $X = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ ограничено, так как $\forall n \ge 1$ имеем $0 < \frac{1}{n} \le 1$.
 - 3. Множество $A = \{\sin x \mid x \in \mathbb{R}\}$ ограничено, так как $-1 \le \sin x \le 1$ для любого $x \in \mathbb{R}$.

Замечание. В примере **2**, inf $X = 0 \notin X$, sup $X = 1 \in X$, а в примере **3**, inf $A = -1 \in A$, sup $A = 1 \in A$. Таким образом, точная верхняя (нижняя) грань некоторого множества $X \subset \mathbb{R}$ может принадлежать или не принадлежать этому множеству.

Непустое множество, ограниченное сверху, имеет бесконечное число верхних граней, а его точной верхней гранью является наименьшая верхняя грань. Так как бесконечное множество чисел может не иметь наименьшего элемента (см. пример 2), возникает вопрос: есть ли точная верхняя (нижняя) грань у числового множества, ограниченного сверху (снизу).

Теорема 1. У любого непустого числового множества, ограниченного сверху (снизу), есть, и причем единственная, точная верхняя (нижняя) грань.

Теорема 2 (характеристическое свойство точной верхней грани множества)

Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, ограниченное сверху. Число M^* является точной верхней гранью множества X тогда и только тогда, когда:

- 1) любой элемент $x \in X$ удовлетворяет неравенству $x \le M^*$;
- 2) для любого $\varepsilon > 0$ существует элемент $x_{\varepsilon} \in X$ такой, что $x_{\varepsilon} > M^* \varepsilon$.

Теорема 3 (характеристическое свойство точной нижней грани множества)

Пусть $X \subset \mathbb{R}$ – непустое множество, ограниченное снизу. Число m^* является точной нижней гранью множества X тогда и только тогда, когда:

- 1) любой элемент $x \in X$ удовлетворяет неравенству $x \ge m^*$;
- 2) для любого $\varepsilon > 0$ существует элемент $x_{\varepsilon} \in X$ такой, что $x_{\varepsilon} < m^* + \varepsilon$.

Доказательство этих теорем следует из определения точной верхней (нижней) грани множества.

Если множество X не ограничено сверху (снизу), то будем записывать $\sup X = +\infty$ (inf $X = -\infty$). Для $X = \mathbb{R}$ имеем inf $\mathbb{R} = -\infty$ и $\sup \mathbb{R} = +\infty$. Для любых $x \in \mathbb{R}$ полагаем, что $-\infty < x < +\infty$.

Задания с решением

🔖 1. Определим точную верхнюю и точную нижнюю грани множества

$$A = \left\{ 1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Решение:

Очевидно, что $0 \le 1 - \frac{1}{n} < 1$ для любого $n \in \mathbb{N}^*$. Значит, множество A ограничено.

Докажем, что $\sup A = 1$. Применим теорему о характеристическом свойстве точной верхней грани множества. Так как $1 - \frac{1}{n} < 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, то первое условие теоремы 2 выполняется.

Заметим, что для любого $\varepsilon > 0$ неравенство $1 - \frac{1}{n} > 1 - \varepsilon$ имеет решения на множестве \mathbb{N}^* . Пусть n_ε – одно из этих решений. Получим, что для каждого $\varepsilon > 0$ существует такое число $1 - \frac{1}{n_\varepsilon} \in A$, что $1 - \frac{1}{n_\varepsilon} > 1 - \varepsilon$. Следовательно, второе условие теоремы 2 выполняется. Значит, $\sup A = 1$.

Докажем, что inf A = 0. Имеем $1 - \frac{1}{n} \ge 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Так как 0 принадлежит множеству A (при n = 1), то inf A = 0. Заметим, что inf $A = \min A \in A$, a $\sup A \notin A$.

- **\$ 2.** Пусть множество $A = \left\{ \frac{n^2}{n^2 + 4} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$.
 - а) Докажем, что множество A ограничено.
 - б) Определим точную верхнюю и точную нижнюю грани множества A.

Решение:

- а) Заметим, что $0 \le \frac{n^2}{n^2 + 4} < 1$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Значит, множество A ограничено.
- б) Докажем, что $\sup A = 1$. Применим теорему 2. Первое условие теоремы выполняется. Покажем, что для любого $0 < \varepsilon < 1$ неравенство $\frac{n^2}{n^2 + 4} > 1 \varepsilon$ имеет решения

на множестве N. Решив это неравенство, получим $n>2\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}-1$ и, согласно принципу Архимеда, $\exists n_{\varepsilon}\in\mathbb{N}$ такое, что $n_{\varepsilon}>2\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}-1$, а именно $n_{\varepsilon}=\left[2\sqrt{\frac{1}{\varepsilon}-1}\right]+1$. Значит, $\sup A=1$.

Так как $\frac{n^2}{n^2+4} \ge 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, и $0 \in A$, получим, что $\inf A = 0$.

Замечание. Множество всех положительных правильных дробей не имеет ни наименьшего элемента, ни наибольшего элемента. Точной верхней гранью и точной нижней гранью этого множества соответственно являются числа 0 и 1.

1.2. Понятие числовой последовательности. Конечные последовательности, бесконечные последовательности

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}$ – подмножество. Последовательностью действительных чисел (или числовой последовательностью) называется числовая функция $f \colon \mathbb{N}^* \to E$.

Такая функция ставит в соответствие каждому натуральному числу $n \in \mathbb{N}^*$ единственное действительное число $f(n) \in E$.

Если функция f задана на конечном подмножестве последовательных элементов множества \mathbb{N}^* , то получаем конечную числовую последовательность. В противном случае последовательность называется бесконечной числовой последовательностью.

Условимся, вместо числа f(n) писать x_n и обозначать последовательность так: $(x_n)_{n\geq 1}$. Число x_n называется n-м членом последовательности, или общим членом последовательности.

Замечания. 1. Иногда функция f задана на множестве \mathbb{N} и последовательность начинается с нулевого члена, тогда условимся писать $(x_n)_{n\geq 0}$, или задана на множестве $\mathbb{N}\setminus\{0,1,...,k-1\}$, тогда условимся писать $(x_n)_{n\geq k}$.

2. Числовые последовательности принято обозначать и так: $(a_n)_{n\geq 1}$, $(b_n)_{n\geq 1}$, $(c_n)_{n\geq 1}$, $(\alpha_n)_{n\geq 1}$, $(\beta_n)_{n\geq 1}$ и т. д.

Примеры

- 1. $(x_n)_{n\geq 1}, \ x_n=\frac{1}{n},$ это последовательность чисел, обратных ненулевым натуральным числам.
 - **2.** $(a_n)_{n\geq 0}, \ a_n=n,$ это последовательность натуральных чисел.
 - 3. $(b_n)_{n\geq 2},\ b_n=\sqrt{n-2},\ -$ это последовательность 0, 1, $\sqrt{2},\ ...,\ \sqrt{n-2},\ ...$

Последовательность считается заданной, если указан способ, позволяющий найти любой член этой последовательности.

Последовательность может быть задана:

1) аналитически, то есть формулой общего члена последовательности

По этой формуле можно найти любой член последовательности.

Например, для последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, заданной формулой общего члена $x_n=1+(-1)^n$, имеем $x_1=0, x_2=2, x_3=0, x_4=2, \dots$

2) перечислением членов последовательности

Например, последовательность простых чисел 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...

3) рекуррентным соотношением. В этом случае задаются один или несколько первых членов последовательности и рекуррентное соотношение, позволяющее получить последующие члены последовательности.

Примеры

1. При начальном условии $x_1 = \sqrt{2}$ и рекуррентном соотношении $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$,

 $\forall n \ge 1$, получим последовательность $x_1 = \sqrt{2}$, $x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}$, $x_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$, ...

2. Пусть $x_0=1,\ x_1=1$ и $x_n=x_{n-1}+x_{n-2}$ для любого $n\geq 2.$ Найдем члены последовательности: $x_0=1,\ x_1=1,\ x_2=x_1+x_0=2,\ x_3=x_2+x_1=3,\ x_4=x_3+x_2=5,\ x_5=x_4+x_3=8,\ \dots$

Итак, получили последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, ..., которая называется последовательностью Фибоначчи 1 .

Можно доказать, что общий член последовательности Фибоначчи выражается формулой:

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$$
 для любого $n \in \mathbb{N}$.



Леонардо Пизанский (Фибоначчи)

Последовательность Фибоначчи встречается во многих разделах математики: в комбинаторике, теории чисел, математическом анализе и др. В этой последовательности много интересного (например, все члены последовательности с номерами, кратными 3, – четные числа, с номерами, кратными 4, – делятся на 3, с номерами, кратными 15, – делятся на 10 и т. д.).

Определение. Две последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$ и $(y_n)_{n\geq 1}$ называются равными, если $x_n=y_n$ для любого $n\in \mathbb{N}^*$.

Таким образом, последовательности $\left(\frac{1+(-1)^{n-1}}{2}\right)_{n\geq 1}$ и 1, 0, 1, 0, ... равны, а последовательности 1, 0, 1, 0, ... и 0, 1, 0, 1, ... не равны, несмотря на то, что имеют одно и то же множество значений их членов: $\{0,1\}$.

Определение. Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ называется постоянной, если $x_{n+1} = x_n$ для всех $n \in \mathbb{N}^*$.

¹ Леонардо Пизанский (Фибоначчи) (1175–1250) – итальянский математик.

Пример

Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, заданная начальным значением $x_1=3$ и рекуррентным соотношением $x_{n+1}=\sqrt{x_n+6}$, $\forall n\geq 1$, является постоянной: $x_1=3$, $x_2=3$, $x_3=3$, ...

1.3. Монотонные последовательности.

*Ограниченные последовательности

Определения. • Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ называется возрастающей (соответственно убывающей), если $x_n \leq x_{n+1}$ (соответственно $x_n \geq x_{n+1}$) $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

- Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ называется **строго возрастающей** (соответственно **строго убывающей**), если $x_n < x_{n+1}$ (соответственно $x_n > x_{n+1}$) $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
- Возрастающие и убывающие последовательности называются монотонными.
- Строго возрастающие и строго убывающие последовательности называются строго монотонными.

Замечание. Существуют последовательности, которые не являются монотонными. Например, немонотонной является последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = (-1)^n$: $x_1 = -1$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$, ...

Чтобы выяснить, является ли последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ возрастающей или убывающей, можно поступить следующим образом:

- 1. Исследуем знак разности двух последовательных членов последовательности:
- если $x_{n+1} x_n \ge 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, то последовательность $(x_n)_{n \ge 1}$ возрастающая;
- если $x_{n+1} x_n \le 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, то последовательность $(x_n)_{n \ge 1}$ убывающая.
- **2.** Если члены последовательности положительные числа, то сравниваем с единицей *отношение* двух последовательных членов:
- если $x_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, и $\frac{x_{n+1}}{x_n} \ge 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, то последовательность $(x_n)_{n \ge 1}$ возрастающая;
- если $x_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, и $\frac{x_{n+1}}{x_n} \le 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, то последовательность $(x_n)_{n \ge 1}$ убывающая.

Поставив знак ">" ("<") вместо знака " \geq " (" \leq "), получим аналогичные критерии для строгой монотонности.

Задание с решением

Исследуем на монотонность последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, где:

a)
$$x_n = \frac{n+1}{n+2}$$
; 6) $x_n = \frac{1}{n(n+1)}$.

Решение:

a)
$$x_{n+1} - x_n = \frac{(n+1)+1}{(n+1)+2} - \frac{n+1}{n+2} = \frac{n+2}{n+3} - \frac{n+1}{n+2} = \frac{(n+2)(n+2) - (n+1)(n+3)}{(n+3)(n+2)} = \frac{n^2 + 4n + 4 - n^2 - 4n - 3}{(n+3)(n+2)} = \frac{1}{(n+3)(n+2)} > 0, \ \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

А это означает, что $x_{n+1} > x_n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, то есть последовательность строго возрастающая.

б) Заметим, что $x_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Тогда
$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$
: $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \cdot n(n+1) = \frac{n}{n+2} < 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Следовательно, данная последовательность строго убывающая.

Определения. • Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ называется ограниченной сверху (ограниченной снизу), если существует действительное число a (соответственно b) такое, что $x_n \leq a$ (соответственно $x_n \geq b$) для всех $n \in \mathbb{N}^*$.

• Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ называется **ограниченной**, если она ограничена сверху и снизу, то есть существуют такие два числа $a,b\in \mathbb{R}$, что $a\leq x_n\leq b$ для всех $n\in \mathbb{N}^*$.

Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ *пеограничена*, если $\forall M>0$ найдется $n_M\in \mathbb{N}^*$ такой, что $|x_{n_M}|>M$.

Задание с решением

У Исследуем на ограниченность последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = \frac{2n+1}{2n+3}$,

Решение:

$$x_n = \frac{2n+1}{2n+3} > 0$$
, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, следовательно, последовательность ограничена снизу.

Докажем, что последовательность ограничена и сверху.

В самом деле,
$$x_n = \frac{2n+1}{2n+3} = \frac{2n+1+2-2}{2n+3} = \frac{(2n+3)-2}{2n+3} = 1 - \frac{2}{2n+3} < 1, \ \forall n \ge 1.$$

Итак, поскольку последовательность ограничена снизу и сверху, то она ограничена: $0<\frac{2n+1}{2n+3}<1,\ \ \forall n\in {\hbox{\it I\hspace{-.07em}N}}^*.$

Упражнения и задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- А 1. Приведите примеры конечных и бесконечных последовательностей.
 - 2. Работайте в парах! Приведите пример строго убывающей числовой последовательности с положительными членами, которая "приближается" к нулю.
 - **3.** Дана последовательность $(x_n)_{n\geq 1}, x_n = \frac{2n+1}{n+4}$
 - а) Напишите первые пять членов последовательности.
 - б) Исследуйте последовательность на монотонность.
- **В 4.** Приведите пример строго возрастающей последовательности с отрицательными членами, которая "приближается" к нулю.
 - 5. Приведите примеры немонотонных последовательностей.
 - **6.** Исследуйте на монотонность последовательность $(x_{_{n}})_{_{n\geq 1}},$ если:

a)
$$x_n = \frac{3n+1}{4n+3}$$
; 6) $x_n = \frac{n-1}{n+1}$; B) $x_n = \frac{3n+1}{5n}$.

- **С** 7. Найдите формулу общего члена $(n \ge 1)$ последовательности:
 - a) 1, 3, 5, 7, 9, ...;

- $6) \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots$
- **8.** Является ли членом последовательности $(a_n)_{n\geq 1}$, где $a_n=n^2-17n$, число:
 - a) -30
- б) –72:
- B) -200?
- 9. Работайте в группах! Проект Приложение последовательности Фибоначчи в природе.

Реальный профиль

- А₁ 1. Приведите примеры ограниченных, неограниченных и монотонных последовательностей.
 - **2.** Работайте в парах! Запишите при помощи кванторов отрицание высказывания: "Числовая последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ ограничена сверху".
 - **3.** Напишите первые пять членов последовательности $(x_n)_{n\geq 1}, x_n = \frac{2n+(-1)^n}{3n}$.
 - **4.** Дана последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, общий член которой выражается формулой $x_n = \left(\frac{11}{10}\right)^n$.
 - а) Напишите первые пять членов последовательности.
 - б) Исследуйте последовательность на монотонность и ограниченность.
 - **5.** Докажите, что последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = \frac{3n-1}{3n+1}$, строго возрастающая и ограничена.
 - 6. Найдите верхнюю и нижнюю границы множества:
 - a) $X = \left\{ \frac{n^2}{n+1}, \ n \in \mathbb{N}^* \right\};$
- 6) $X = \left\{ -\frac{n^2}{n+1}, \ n \in \mathbb{N}^* \right\}.$
- **В**₁ 7. Пусть последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ задана рекуррентным соотношением $x_{n+1} = x_n 2$, $\forall n \geq 1$, а $x_1 = -1$.
 - а) Найдите формулу для общего члена последовательности.
 - б) Исследуйте последовательность на монотонность и ограниченность.
 - **8.** Напишите первые пять членов последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$ и задайте эту последовательность формулой n-го члена, если:
 - а) $x_1 = -10$, $x_{n+1} = x_n + 5$ при $n \ge 1$;
- б) $x_1 = 4$, $x_{n+1} = 2x_n$ при $n \ge 1$.

Исследуйте последовательность на монотонность и ограниченность.

- 9. Запишите при помощи кванторов:
 - а) подмножество $X \subset \mathbb{R}$ не ограничено сверху;
 - б) число m не является нижней границей подмножества $X \subset \mathbb{R}$;
 - с) число M не является верхней границей подмножества $X \subset \mathbb{R}$.
- C_1 10. Исследуйте! Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ задана рекуррентно: $x_1=1$ и $x_{n+1}=x_n+\frac{1}{3^n},\ \forall n\geq 1.$
 - а) Найдите формулу общего члена последовательности.
 - б) Исследуйте последовательность на монотонность.
 - в) Ограничена ли последовательность?
 - 11. Найдите верхнюю и нижнюю границы множества:
 - a) $A = \{x \in \mathbb{R}, |x| \ge 3\};$
- 6) $B = \{x \in \mathbb{R}, x^3 < 7\}.$
- 12. Работайте в группах! Проект Приложение последовательности Фибоначчи в различных областях (биологии, физике, медицине, природе и т.п.).

§2 Арифметические прогрессии. Геометрические прогрессии

В этом параграфе мы изучим последовательности, получившие широкое применение в различных областях, благодаря своим интересным свойствам.

2.1. Арифметические прогрессии

2.1.1. Понятие арифметической прогрессии

Пусть дана последовательность действительных чисел $(a_n)_{n\geq 1}$, в которой $a_1=2$ и $a_{n+1}=a_n+3$ для любого $n\geq 1$. Тогда $a_1=2$, $a_2=a_1+3=2+3=5$, $a_3=a_2+3=5+3=8$, $a_4=a_3+3=8+3=11$, ...

Замечаем, что каждый член этой последовательности, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом 3.

Определение. Арифметической прогрессией называется числовая последовательность, каждый член которой, начиная со второго, получается из предыдущего прибавлением одного и того же числа.

Числовая последовательность $a_1, a_2, ..., a_n, ...$ является арифметической прогрессией, если для любого $k \ge 1$ имеем $a_{k+1} = a_k + r$, где r – действительное число. Число r называется *разностью арифметической прогрессии*, а число a_1 – *первым членом* этой прогрессии.

Арифметическая прогрессия $(a_n)_{n\geq 1}$ полностью определена, если известны ее первый член a_1 и разность r.

Если: • r > 0, то арифметическая прогрессия является *строго возрастающей*;

- r < 0, то арифметическая прогрессия является *строго убывающей*;
- r = 0, то арифметическая прогрессия является *постоянной*.

Примеры

- **1.** При $a_1 = 1$, r = 2 получим арифметическую прогрессию 1, 3, 5, 7, ...
- **2.** Для $a_1 = 1$, r = -3 получим арифметическую прогрессию 1, -2, -5, -8, ...
- **3.** При $a_1 = 7$, r = 0 получим арифметическую прогрессию 7, 7, 7, ...

Определение. Говорят, что числа $a_1, a_2, ..., a_n$ образуют арифметическую прогрессию, если они являются последовательными членами некоторой арифметической прогрессии.

Арифметическая прогрессия получила свое название благодаря следующему важному свойству ее членов.

Теорема 4. Любой член арифметической прогрессии $a_1, a_2, a_3, ..., a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, ...,$ начиная со второго, равен среднему арифметическому двух соседних с ним членов:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \ \forall n \ge 2.$$

Задание. Докажите теорему 4.

Верно и обратное утверждение.

Теорема, обратная теореме 4. Если каждый член некоторой последовательности действительных чисел, начиная со второго, равен среднему арифметическому двух соседних с ним членов, то эта последовательность является арифметической прогрессией.

Доказательство

Предположим, что для любых трех последовательных членов последовательности $(a_n)_{n\geq 1}$ имеет место соотношение: $a_n=\frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2},\ n\geq 2.$

Тогда
$$2a_n=a_{n-1}+a_{n+1}$$
, откуда получаем
$$a_n+a_n=a_{n-1}+a_{n+1} \quad \text{или} \quad a_n-a_{n-1}=a_{n+1}-a_n.$$

А это означает, что разность между последующим и предыдущим членами есть одно и то же число, значит, последовательность $(a_n)_{n\geq 1}$ – арифметическая прогрессия.

2.1.2. Формула общего члена арифметической прогрессии

Пусть a_1 – первый член арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, а r – ее разность. Тогда по определению арифметической прогрессии получим:

$$a_2 = a_1 + r,$$

 $a_3 = a_2 + r = (a_1 + r) + r = a_1 + 2r,$
 $a_4 = a_3 + r = (a_1 + 2r) + r = a_1 + 3r,$

Теорема 5. Общий член арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$ задается формулой:

$$a_n = a_1 + (n-1) \cdot r. \tag{1}$$

Доказательство

Докажем формулу (1), используя метод математической индукции.

Обозначим через A(n) утверждение из равенства (1).

- 1. Для n = 1 утверждение A(1) верно.
- 2. Пусть утверждение A(k) верно для $k \ge 1$, то есть $a_k = a_1 + (k-1) \cdot r$.

Докажем, что верно и утверждение A(k+1).

Действительно, $a_{k+1} = a_k + r = a_1 + (k-1) \cdot r + r = a_1 + k \cdot r$.

3. Согласно методу математической индукции, утверждение A(n) верно для любого ненулевого натурального числа n.

Замечание. Арифметическую прогрессию $(a_n)_{n\geq 1}$ с разностью r можно задать рекуррентным соотношением $a_{n+1}=a_n+r,\ \forall n\geq 1,\$ или рекуррентным соотношением $a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n,\ \forall n\geq 1,\$ и первым членом $a_1.$

2.1.3. Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии

Теорема 6. Пусть действительные числа $a_1, a_2, ..., a_{n-1}, a_n$ образуют арифметическую прогрессию. Тогда сумма членов, равноудаленных от первого и последнего членов прогрессии, равна сумме первого и последнего членов прогрессии: $a_k + a_{n-k+1} = a_1 + a_n$, для любых $k \ge 1$.

Доказательство

Пусть действительные числа $a_1, a_2, ..., a_n$ образуют арифметическую прогрессию. Если r – разность этой прогрессии, то

$$a_k = a_1 + (k-1) \cdot r$$
 $u \quad a_{n-k+1} = a_1 + (n-k) \cdot r$,

откуда
$$a_k + a_{n-k+1} = [a_1 + (k-1)r] + [a_1 + (n-k)r] = 2a_1 + (n-1)r.$$

Ho
$$a_1 + a_n = a_1 + [a_1 + (n-1)r] = 2a_1 + (n-1)r$$
.

Таким образом, получили равенство
$$a_k + a_{n-k+1} = 2a_1 + (n-1)r = a_1 + a_n$$
.

Используя теорему 6, можно легко получить общую формулу для суммы n первых членов арифметической прогрессии.

Обозначим через S_n сумму n первых членов арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$ и запишем ее два раза следующим образом:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n,$$

 $S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_3 + a_2 + a_1.$

Сложив почленно эти равенства, получим:

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + (a_3 + a_{n-2}) + \dots + (a_{n-2} + a_3) + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1).$$

Согласно теореме 6, имеем:

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots = a_{n-2} + a_3 = a_{n-1} + a_n.$$

Поэтому
$$2S_n = n(a_1 + a_n)$$
, следовательно, $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$.

Важно знать: $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$ (2) — формула суммы n первых членов арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$.

 $S_n = \frac{2a_1 + (n-1)r}{2} \cdot n$ (3) — формула суммы n первых членов арифметической прогрессии, применяемая в случае, когда известны ее первый член a_1 и разность r.

Задание. Докажите формулу (3).

Задания с решением

1. Найдем сумму натуральных чисел от 1 до 100.

Решение:

Эти 100 чисел образуют арифметическую прогрессию. Первый член прогрессии равен 1, а последний член равен 100.

Значит,
$$S_{100} = \frac{a_1 + a_{100}}{2} \cdot 100 = \frac{1 + 100}{2} \cdot 100 = 5050.$$

5. Найдем первый член арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, если $a_{10}=131$, r=12. *Решение*:

Применив формулу (1), получим: $131 = a_1 + (10-1) \cdot 12 \Leftrightarrow 131 = a_1 + 108 \Leftrightarrow a_1 = 23$.

\bigcip 3. Найдем первый член и разность арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, в которой $a_5=27$, $a_{27}=60$.

Решение:

Используя формулу (1), составим систему
$$\begin{cases} a_1 + 4r = 27, \\ a_1 + 26r = 60. \end{cases}$$


Решив эту систему, получим: $a_1 = 21$, r = 1,5.

4. Вычислим сумму первых 100 членов арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, в которой $a_1=10,\ a_{100}=150.$

Решение:

Применив формулу (2), получим: $S_{100} = \frac{10 + 150}{2} \cdot 100 = 80 \cdot 100 = 8000$.

 $\$ 5. Докажем, что если котангенсы углов треугольника ABC образуют арифметическую прогрессию, то квадраты длин соответствующих сторон этого треугольника также образуют арифметическую прогрессию.



Решение:

Пусть R – радиус окружности, описанной около треугольника ABC. По условию задачи имеем, например, $\operatorname{ctg} A - \operatorname{ctg} B = \operatorname{ctg} B - \operatorname{ctg} C \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \frac{\cos A}{\sin A} - \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{\cos B}{\sin B} - \frac{\cos C}{\sin C} \Leftrightarrow \frac{\sin B \cos A - \sin A \cos B}{\sin A \sin B} = \frac{\sin C \cos B - \sin B \cos C}{\sin B \sin C}$$
Значит,
$$\frac{\sin(B - A)}{\sin A} = \frac{\sin(C - B)}{\sin C}.$$

Так как $\sin C = \sin(B+A)$, $\sin A = \sin(B+C)$, получим

$$\sin(B-A)\sin(B+A) = \sin(C-B)\sin(C+B) \Leftrightarrow \sin^2 A - \sin^2 B = \sin^2 B - \sin^2 C.$$

Ho
$$\sin A = \frac{a}{2R}$$
, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$. Таким образом, $a^2 - b^2 = b^2 - c^2$.

Следовательно, квадраты длин сторон треугольника, a^2, b^2, c^2 , образуют арифметическую прогрессию.

2.2. Геометрические прогрессии



ЛЕГЕНДА О ШАХМАТНОЙ ИГРЕ

По преданию, шахматы были изобретены в IV веке от Р. Х. в Индии. Индусский царь был так восхищен этой игрой, что решил наградить изобретателя шахмат мудреца Сесса и очень удивился, когда тот попросил выдать ему за первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно, за вторую -2 зерна, за третью -4 зерна, за четвертую -8 зерен и т. д. до 64-й клетки доски. Эта просьба показалась царю очень скромной. Так ли это?

2.2.1. Понятие геометрической прогрессии

Пусть дана последовательность действительных чисел $(b_n)_{n\geq 1}$, в которой $b_1=3$ и $b_{n+1}=b_n\cdot 4$ для любого $n\geq 1$.

Тогда
$$b_1 = 3$$
, $b_2 = b_1 \cdot 4 = 3 \cdot 4 = 12$, $b_3 = b_2 \cdot 4 = 12 \cdot 4 = 48$, $b_4 = b_3 \cdot 4 = 48 \cdot 4 = 192$, ...

Замечаем, что каждый член этой последовательности, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на одно и то же число 4.

Определение. Геометрической прогрессией называется числовая последовательность, первый член которой отличен от нуля, а каждый член, начиная со второго, получается из предыдущего умножением на одно и то же число.

Числовая последовательность $b_1, b_2, ..., b_n, ...$ $(b_1 \in \mathbb{R}^*)$ является геометрической прогрессией, если для любого $k \ge 1$ имеем $b_{k+1} = b_k \cdot q, \ q \in \mathbb{R}^*$.

Число q называется знаменателем геометрической прогрессии, а b_1 – первым членом этой прогрессии.

Геометрическая прогрессия $(b_n)_{n\geq 1}$ полностью определена, если известны ее первый член b_1 и знаменатель q.

Определение. Говорят, что числа $b_1, b_2, ..., b_n$ образуют геометрическую прогрессию, если они являются последовательными членами некоторой геометрической прогрессии.

Примеры

- **1.** При $b_1 = 1, q = \frac{1}{2}$ получим геометрическую прогрессию $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, ..., \frac{1}{2^n}, ...$
- **2.** При $b_1 = 2$, q = -2 получим геометрическую прогрессию 2, -4, 8, -16, 32, ...

Геометрическая прогрессия с положительными членами получила свое название благодаря следующему важному свойству ее членов.

Теорема 7. Если все члены геометрической прогрессии $b_1, b_2, b_3, ..., b_{n-1}, b_n, b_{n+1}, ...,$ положительны, то любой ее член, начиная со второго, равен среднему геометрическому соседних с ним членов: $b_n = \sqrt{b_{n-1} \cdot b_{n+1}}$, $\forall n \ge 2$.

Доказательство

По определению геометрической прогрессии $b_n = b_{n-1} \cdot q$ и $b_n = \frac{b_{n+1}}{q}$ для всех $n \ge 2$. Поэтому $\frac{b_n}{b_{n-1}} = \frac{b_{n+1}}{b_n} = q$, откуда находим: $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$.

Так как $b_n > 0$, то получаем: $b_n = \sqrt{b_{n-1} \cdot b_{n+1}}$.

Замечание. Соотношение $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$ (или $|b_n| = \sqrt{b_{n-1} \cdot b_{n+1}}$) справедливо для любой геометрической прогрессии $(b_n)_{n>1}$.

Верно и обратное утверждение.

Теорема, обратная теореме 7. Если каждый член некоторой последовательности действительных положительных чисел, начиная со второго, равен среднему геометрическому соседних с ним членов, то эта последовательность является геометрической прогрессией.

Задание. Докажите теорему, обратную теореме 7.

2.2.2. Формула общего члена геометрической прогрессии

Пусть b_1 – первый член геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$ и q – ее знаменатель. Тогда по определению геометрической прогрессии получим:

$$b_{2} = b_{1} \cdot q,$$

$$b_{3} = b_{2} \cdot q = (b_{1} \cdot q) \cdot q = b_{1} \cdot q^{2},$$

$$b_{4} = b_{3} \cdot q = (b_{1} \cdot q^{2}) \cdot q = b_{1} \cdot q^{3},$$

Теорема 8. Общий член геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$ задается формулой:

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}. \tag{4}$$

Доказательство

Применим метод математической индукции.

Обозначим через P(n) утверждение из равенства (4).

- 1. Для n = 1, утверждение P(1) верно.
- 2. Пусть утверждение P(k) верно для $k \ge 1$, то есть $b_k = b_1 \cdot q^{k-1}$.

Докажем, что верно утверждение P(k+1).

Действительно, $b_{k+1} = b_k q = (b_1 q^{k-1})q = b_1 q^k$.

- 3. Согласно методу математической индукции, утверждение P(n) верно для любого ненулевого натурального числа n.
 - **Замечание.** Геометрическую прогрессию $(b_n)_{n\geq 1}$ со знаменателем q можно задать рекуррентным соотношением $b_{n+1} = b_n \cdot q$, $\forall n \geq 1$, и первым членом b_1 .

2.2.3. Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии

Пусть $(b_{\scriptscriptstyle n})_{\scriptscriptstyle n\geq 1}$ – геометрическая прогрессия, первый член которой равен $b_{\scriptscriptstyle 1}$ и q – ее знаменатель.

Замечание. Как и в случае арифметической прогрессии, для чисел $b_1, b_2, ..., b_n$, которые образуют геометрическую прогрессию, имеет место соотношение: $b_k \cdot b_{n-k+1} = b_1 \cdot b_n$,

то есть произведение членов, равноудаленных от первого и последнего членов прогрессии, равно произведению первого и последнего членов прогрессии.

Пусть сумма *п* первых членов этой прогрессии равна:

$$S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n. (5)$$

Для того чтобы вычислить S_n , рассмотрим два случая:

- 1) знаменатель q=1; тогда $S_n=b_1\cdot n$;
- 2) знаменатель $q \neq 1$; тогда умножим обе стороны равенства (5) на q и получим:

$$qS_n = b_1q + b_2q + \dots + b_{n-1}q + b_nq.$$

Но $b_1q = b_2$, $b_2q = b_3$, ..., $b_{n-1}q = b_n$, следовательно,

$$qS_n = b_2 + b_3 + \dots + b_n + b_n q. (6)$$

Вычитая почленно равенство (5) из равенства (6), получим:

$$qS_n - S_n = b_n q - b_1 \iff S_n \cdot (q - 1) = b_n q - b_1.$$

Так как $q \neq 1$, то получим $S_n = \frac{b_n q - b_1}{q - 1} = \frac{b_1 - b_n q}{1 - q}$.

Важно знать: $S_n = \frac{b_1 - b_n q}{1 - q}, \quad q \neq 1$ – формула суммы n первых членов геометрической прогрессии $(b_n)_{n \geq 1}$.

 $S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}, \ q \neq 1 \ (7)$ — формула суммы n первых членов геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, применяемая в случае, когда известны ее первый член b_1 и знаменатель q.

Задание. Докажите формулу (7).

Теперь вернемся к легенде о шахматной игре.

Чтобы ответить на вопрос, мы должны сложить зерна пшеницы, лежащие на клеточках доски, т. е. вычислить сумму $1+2+2^2+2^3+...+2^{63}$.

Имеем: $b_1 = 1$, q = 2, $b_{64} = 2^{63}$.

Тогда
$$S_{64} = \frac{2^{63} \cdot 2 - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1 = 18446744073709551615.$$

Получили двадцатизначное число. Зная, что 30000000 зерен составляют приблизительно 1 тонну, убеждаемся, что желание мудреца Сесса не могло быть исполнено. (Сравните: мировой урожай зерна в 2018-2019 сельскохозяйственном году составил примерно 770 000 000 т, а мудрец попросил около 614 миллиардов тонн.)

Геометрическая прогрессия, в которой:

- $b_1 > 0$, q > 1 или $b_1 < 0$, 0 < q < 1 является строго возрастающей;
- $b_1 < 0, q > 1$ или $b_1 > 0, 0 < q < 1$ является строго убывающей;
- q < 0 не является монотонной;
- q = 1 является **постоянной**.

Задание. Приведите по одному примеру для каждого случая.

Геометрическая прогрессия $(b_n)_{n\geq 1}$ называется бесконечно убывающей, если для знаменателя прогрессии q верно неравенство |q|<1. Для бесконечно убывающей геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$ имеем:

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{b_1}{1 - q} - \frac{b_1}{1 - q} \cdot q^n.$$

При неограниченном увеличении n, q^n стремится к нулю ("приближается" к нулю), так как |q|<1, а сумма S_n стремится к значению выражения $\frac{b_1}{1-a}$. (См. также §3, раздел 3.3.)

Задания с решением

 \S 1. Найдем первый член и знаменатель геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, если $\begin{cases} b_2 - b_1 = -4, \\ b_3 - b_1 = 8. \end{cases}$

Применив формулу (4), составим систему: $\begin{cases} b_1 q - b_1 = -4, \\ b_1 q^2 - b_1 = 8. \end{cases}$ Решив последнюю систему, получим $b_1 = 1$, q =

🔖 2. Турист, взбираясь на гору, за первый час поднялся на 800 м. Каждый последующий час он поднимался на 25 м меньше, чем за предыдущий час. За какое время турист поднимется до отметки в 5 700 м?



Решение:

Числа 800, 775, 750, ... образуют арифметическую прогрессию, в которой

 $a_1 = 800, r = -25$. По условию задачи составим систему: $\begin{cases} a_n = x = 800 - 25(n-1), \\ S_n = \frac{800 + x}{2} \cdot n = 5700. \end{cases}$ Решив эту систему, получим x = 1625 м, n = 8 ч.

Ответ: 8 часов.

- **\&** 3. Найдем положительные числа x, y, z, которые одновременно удовлетворяют условиям: 1) числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию;
 - 2) числа x, y+4, z образуют арифметическую прогрессию;
 - 3) числа x, y+4, z+32 образуют геометрическую прогрессию.

Решение:

По условию составим систему:

$$\begin{cases} xz = y^2 \\ x + z = 2(y+4) \\ x(z+32) = (y+4)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xz = y^2 \\ y = 4x - 2 \\ z = 2y - x + 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9x^2 - 20x + 4 = 0, \\ y = 4x - 2, \\ z = 7x + 4. \end{cases}$$

Решив последнюю систему, получим ответ: x = 2, y = 6, z = 18.

Упражнения и задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. Запишите первые четыре члена арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, в которой: a) $a_1=7,\ r=2;$ б) $a_1=-3,\ r=5;$ в) $a_1=1,3,\ r=0,3;$ г) $a_1=\frac{2}{7},\ a_2=\frac{1}{5}.$
 - **2.** Найдите первый член a_1 арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, если:
 - **3.** Запишите первые четыре члена геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, в которой:

a)
$$b_1 = -10$$
, $q = \frac{1}{2}$; 6) $b_1 = \frac{1}{2}$, $q = \sqrt{3}$.

4. Дана последовательность: а) 6, 9, 12, 15, ...; б) 4, 8, 16, 32, ... Заполните рамки, чтобы получить истинное высказывание:

"Последовательность является прогрессией с разностью/знаменателем ".

- **В** 5. Для построения теплицы используют вертикальные металлические стержни, наименьший из которых равен 5дм, а каждый следующий на 3дм больше предыдущего. Найдите высоту седьмого, наибольшего стержня.
 - **6.** В амфитеатре 10 рядов. В первом ряду 100 мест, а в каждом следующем на 20 мест больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в амфитеатре?
 - 7. В горах температура воздуха летом при подъеме на каждые 100 м понижается в среднем на 0,7°С. У подножья температура составляет 26°С. Как высоко находится турист, если термометр показывает 14,8°С?
- **8.** ** Работайте в парах! Банк выплачивает 9% годовой прибыли. Какую сумму денег получит вкладчик через 5 лет, если его первоначальный вклад составляет 2 700 леев?

- 9. Людям, которые взялись копать колодец, обещали за первый метр заплатить 150 леев, а за каждый последующий метр – на 60 леев больше, чем за предыдущий. Сколько они заработают денег, выкопав колодец глубиной 12 метров?
- 10. В благоприятных условиях за один час каждая бактерия делится на две бактерии. Сколько бактерий размножится за 10 часов из одной бактерии?
- 11. Работайте в группах! Проект Прогрессии в моей будущей профессии.

Реальный профиль

- **А**₁ **1.** Найдите сумму первых пяти членов геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, если $\frac{b_1+b_2}{b_2+b_3}=\frac{1}{3}$ и $b_1+b_2+b_3=52$.
 - **2.** Найдите формулу общего члена арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$ и S_n , если:
 - a) $a_1 = -4$, $r = \frac{1}{3}$, n = 14;
- 6) $a_1 = \frac{3}{5}$, $r = \frac{1}{7}$, n = 25.
- **3.** Запишите формулу общего члена геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, в которой:
 - a) $b_1 = 9$, $b_{-1} = 2b_{-1}$;

- 6) $b_1 = 10$, $b_{n+1} = \frac{1}{5}b_n$.
- **4.** Дана геометрическая прогрессия, у которой $S_3 = 40$, $S_6 = 60$. Найдите S_9 .
- **5.** Дана последовательность: a) 16, 12, 8, 4, ...; б) $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $-\frac{1}{16}$, ... Заполните рамки, чтобы получить истинное высказывани прогрессией с разностью/знаме-"Последовательность является нателем
- **В**₁ **6.** Докажите, что если числа a, b, c образуют арифметическую прогрессию, то и числа $a^2 - bc$, $b^2 - ac$, $c^2 - ab$ образуют арифметическую прогрессию.
 - 7. Найдите первый член и знаменатель геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, если: a) $b_4=-12,\ b_7=23\frac{7}{16};$ 6) $b_1+b_4=\frac{7}{16},\ b_3-b_2+b_1=\frac{7}{8}.$


- **8.** Найдите числа $x, y, z \in \mathbb{R}$, которые одновременно удовлетворяют условиям:
 - а) числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию;
 - б) числа x, y + a, z образуют арифметическую прогрессию;
 - в) числа x, y + a, z + b образуют геометрическую прогрессию.
- **9.** При каких значениях $x \in \mathbb{R}$ числа 2x-1, 2x+1, x+26 образуют геометрическую прогрессию?
- **10.** Найдите первый член геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, если: а) $S_4 = 12, \ q = 3;$ б) $S_6 = 1, \ q = -2.$
- C_1 11. Решите на множестве \mathbb{R} уравнение: 1+7+13+...+x=280.
 - 12. Длины сторон треугольника ABC, взятые последовательно, образуют возрастающую геометрическую прогрессию. Знаменатель этой прогрессии будет больше или меньше 2?
 - 13. Представьте число 180 в виде суммы четырех положительных действительных чисел, которые образуют геометрическую прогрессию со знаменателем $q \neq \pm 1$, если известно, что третий член прогрессии на 36 больше, чем первый. Предложите два варианта.
 - 14. Проект Приложение прогрессий в различных областях.

§3 Предел последовательности. Сходящиеся последовательности довательности, расходящиеся последовательности

В античности греческие математики Архимед, Зенон Элейский и другие применяли числовые последовательности для нахождения наилучших приближений некоторых величин. Намного позже были введены понятия сходящейся последовательности и предела.

3.1. Понятие предела последовательности

Окрестностью точки $a \in \mathbb{R}$ называется любой интервал вида $(a-\varepsilon, a+\varepsilon), \ \varepsilon>0$. Окрестность точки a обозначается $U(a, \varepsilon)$ или $V(a, \varepsilon)$.



Зенон Элейский

Следовательно, $U(a, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid a - \varepsilon < x < a + \varepsilon\} = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \varepsilon\}.$

Говорят, что точка x_0 является *внутренней точкой* множества X, если существует окрестность $U(x_0,\varepsilon), \varepsilon>0$, точки x_0 такая, что $U(x_0,\varepsilon)\subset X$.

Определение ("на языке окрестностей"). Пусть $(x_n)_{n\geq 1}$ — последовательность действительных чисел и a — действительное число. Число a называется пределом последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, если любая окрестность числа a содержит все члены последовательности, за исключением, быть может, их конечного числа.

В этом случае пишут: $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ (читают: "предел последовательности x_n при n, стремящемся к бесконечности, равен a") или $x_n \to a$ при $n \to \infty$ (читают: " x_n стремится к a при n, стремящемся к ∞ "). (Здесь $\lim_{n\to\infty} x_n \to a$ при $x_n \to a$ при x_n

Замечание. Пишем $n \to \infty$, а не $n \to +\infty$, так как n – натуральное число, и не может возникнуть двусмысленности.

Определение ("на языке ε "). Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $(x_n)_{n \ge 1}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $n_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$, что для каждого $n \in \mathbb{N}^*$, $n > n_\varepsilon$, выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$.

Замечания. 1. Для каждого определения можно сформулировать логическое отрицание. Например, логическое отрицание определения "на языке ε ": Число $a \in \mathbb{R}$ не является пределом последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, если $\exists \varepsilon_0 > 0$ такое, что $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\exists n > n_0$, при котором $|x_{n_0} - a| \geq \varepsilon_0$.

2. В определении предела последовательности на языке \mathcal{E} , вместо \mathcal{E} можно взять $\alpha \mathcal{E}$, где $\alpha > 0$ – фиксированное действительное число. Следовательно, критерий на языке \mathcal{E} можно сформулировать так: Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $(x_n)_{n \geq 1}$, если $\forall \mathcal{E} > 0$ $\exists n_{\mathcal{E}} \in \mathbb{N}^*$ такое, что $\forall n > n_{\mathcal{E}}$ выполняется неравенство $|x_n - a| < \alpha \mathcal{E}$, где $\alpha > 0$.

Задания с решением

5 1. Пусть последовательность $(x_n)_{n\geq 1}, \ x_n = \frac{1}{n}$. Докажем, что $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.

¹ Зенон Элейский (490-430 до Р. Х.) – древнегреческий философ и математик.

Доказательство

Пусть U – произвольная окрестность точки 0, $U = (-\varepsilon, \varepsilon)$. Пусть $n \in \mathbb{N}^*$ такое, что $n > \frac{1}{\epsilon}$, то есть, $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$. Значит, $x_n = \frac{1}{n} \in (-\epsilon, \epsilon) = U$ при $n > \frac{1}{\epsilon}$. Таким образом, члены данной последовательности, начиная с номера $n_{\varepsilon} = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, содержатся в окрестности U точки 0.

Следовательно, число 0 является пределом последовательности $(x_n)_{n\geq 1}, \ x_n=\frac{1}{n}.$ Важно знать: $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0.$

У 2. Докажем, что $\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n+1} = 2$.

Докажем, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется $n_{\varepsilon} \in \mathbb{N}^*$ такое, что для каждого $n \in \mathbb{N}^*$, $n > n_{\varepsilon}$, выполняется неравенство $\left| \frac{2n+1}{n+1} - 2 \right| < \varepsilon$. Вычислим $\left| \frac{2n+1}{n+1} - 2 \right| = \left| \frac{-1}{n+1} \right| = \frac{1}{n+1}$. Для любого $\varepsilon > 0$ положим, что $\left| \frac{2n+1}{n+1} - 2 \right| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon$. Если $\varepsilon > \frac{1}{2}$, то неравенство $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$ верно для любого $n \in \mathbb{N}^*$. Если $0 < \varepsilon \le \frac{1}{2}$, то неравенство верно для любого $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$, $n \in \mathbb{N}^*$, и в этом случае полагаем $n_{\varepsilon} = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} - 1 \right\rceil + 1$, $n_{\varepsilon} \in \mathbb{N}^*$. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ существует $n_{\varepsilon} \in \mathbb{N}^*$ такое, что неравенство $\left| \frac{2n+1}{n+1} - 2 \right| < \varepsilon$ верно для всех $n, n > n_{\varepsilon}$. Следовательно, $\lim_{n \to +\infty} \frac{2n+1}{n+1} = 2$.

5. Докажем, что у последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = (-1)^n$, нет предела. Доказательство

Предположим противное, что существует такое число $a \in \mathbb{R}$, что $\lim_{n \to \infty} (-1)^n = a$. Тогда по определению предела для любого $\varepsilon > 0$, в частности для $\varepsilon = \frac{1}{2}$, существует $n_{\varepsilon} \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n > n_{\varepsilon}$ выполняется неравенство $|x_n - a| < \frac{1}{2}$. Так как $x_n \in \{-1, 1\}$, следовательно, одновременно выполняются неравенства $|1-a| < \frac{1}{2}$ и $|-1-a| < \frac{1}{2}$. Получим, что $2 = |(1-a)+(a+1)| \le |1-a|+|1+a| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, то есть 2 < 1, что неверно. Значит, у данной последовательности нет предела.

\$ 4. Докажем, что $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}=0$, $\alpha\in\mathbb{R}_{+}^{*}$.

Доказательство

Докажем, что для любого $\varepsilon > 0$ существует $n_{\varepsilon} \in \mathbb{N}^*$ такое, что для всех $n \in \mathbb{N}^*$, $n > n_{\varepsilon}$, выполняется неравенство $\left| \frac{1}{n^{\alpha}} \right| < \varepsilon$, $\alpha > 0$.

Действительно, для любого $\varepsilon > 0$, учитывая, что $\left| \frac{1}{n^{\alpha}} \right| = \frac{1}{n^{\alpha}}$ и решив неравенство

$$\left|\frac{1}{n^{\alpha}}\right| < \varepsilon$$
 относительно n , получим $n > \frac{1}{\varepsilon^{\frac{1}{\alpha}}}$. Заметим, что $n_{\varepsilon} = \left[\frac{1}{\varepsilon^{\frac{1}{\alpha}}}\right]$ является нату-

ральным числом. Значит, для любого $\varepsilon > 0$ существует $n_{\varepsilon} = \left[\frac{1}{\varepsilon^{\frac{1}{\alpha}}}\right] \in \mathbb{N}^*$ такое, что

неравенство $\left|\frac{1}{n^{\alpha}}-0\right|<\varepsilon$ верно для каждого $n\in\mathbb{N}^*$, $n>n_{\varepsilon}$. Итак, $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}=0,\ \alpha>0$.

Важно знать: $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}=0$, $\alpha>0$.

Задание. Применив определение "на языке окрестностей", докажите, что у последовательности $(x_n)_{n\geq 1},\ x_n=(-1)^n,$ нет предела.

Определения. • Говорят, что числовая последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ имеет предел плюс бесконечность, пишут $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ такое, что неравенство $x_n > \varepsilon$ верно для каждого $n > n_\varepsilon$.

- Говорят, что числовая последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ имеет предел минус бесконечность, пишут $\lim_{n\to\infty}x_n=-\infty$, если для любого $\varepsilon>0$ существует $n_\varepsilon\in\mathbb{N}$ такое, что неравенство $x_n<-\varepsilon$ верно для каждого $n>n_\varepsilon$.
- Говорят, что числовая последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ имеет **бесконечный предел**, пишут $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$, если для любого $\varepsilon>0$ существует $n_\varepsilon\in\mathbb{N}$ такое, что неравенство $|x_n|>\varepsilon$ верно для каждого $n>n_\varepsilon$.
- **Замечание.** Очевидно, если $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$ или $\lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$, то $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$.

Примеры

- **1.** Пусть последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n=n^2$. Очевидно, что $\lim_{n\to\infty}x_n=+\infty$.
- **2.** Пусть последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = -2^n$. Имеем $\lim_{n \to \infty} x_n = -\infty$.
- **3.** Для последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = (-1)^n \cdot n$, имеем $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$.

Задание с решением

У Дана последовательность $(x_n)_{n\geq 1}, \ x_n=q^n, \ q<-1.$ Покажем, что $\lim_{n\to\infty} q^n=\infty.$ *Решение*:

Согласно определению, надо показать, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $n_{\varepsilon} \in \mathbb{N}$, что для каждого $n > n_{\varepsilon}$ верно неравенство $|q^n| > \varepsilon$.

Пусть $\varepsilon > 0$. Неравенство $|q^n| > \varepsilon$ равносильно неравенству $|q|^n > \varepsilon$. Логарифмируя неравенство по основанию |q|, |q| > 1, получим:

$$\log_{|q|} |q|^n > \log_{|q|} \varepsilon \Leftrightarrow n > \log_{|q|} \varepsilon.$$

Значит, для любого $\varepsilon > 0$ существует $n_{\varepsilon} = [\log_{|q|} \varepsilon] + 1$ такое, что неравенство $|q^n| > \varepsilon$ верно для каждого $n > n_{\varepsilon}$. Согласно определению $\lim_{n \to \infty} q^n = \infty$.

При доказательстве теорем и при выполнении заданий с бесконечными пределами иногда будем использовать следующие множества:

$$U(+\infty, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \varepsilon, \varepsilon > 0\};$$

$$U(-\infty, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -\varepsilon, \varepsilon > 0\};$$

$$U(\infty, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| > \varepsilon, \varepsilon > 0\},$$

которые называются *окрестностями* соответственно для $+\infty$, $-\infty$ и ∞ .

В определениях окрестностей символов $+\infty$ и $-\infty$ условие $\varepsilon > 0$ иногда может быть опущено. Это условие необходимо, чтобы придать единообразие формулировкам понятий. Значит, окрестность любого конечного числа, $+\infty$, $-\infty$ и ∞ определяется положительным числом. Это условие иногда удобно при записи результатов, когда несущественно, каким является предел: конечным или бесконечным. Применив эту терминологию, определение конечного или бесконечного предела можно сформулировать следующим образом:

Определения. • Говорят, что число a (где a – конечное число, +∞, −∞ или ∞) является пределом последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, если для любой окрестности $U(a,\varepsilon)$ точки a существует такое натуральное число n_u , что $x_n \in U$ для всех $n > n_u$.

• Последовательность, имеющая конечный предел, называется сходящейся. Последовательность, не являющаяся сходящейся (то есть последовательность, у которой нет предела или предел равен бесконечности), называется расходящейся.

Теорема 9. Если последовательность действительных чисел имеет предел, то этот предел единственный.

Теорема 10 (Вейерштрасса¹). Любая монотонная и ограниченная числовая последовательность является сходящейся.

Доказательство

Рассмотрим случай, когда последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ возрастает и ограничена сверху. Тогда $x_n \le x_{n+1}, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$. Согласно условию, множество $\{x_n | n \ge 1\}$ непусто и ограничено. Пусть $x_0 = \sup(x_n), x_0 \in \mathbb{R}$.



По теореме о характеристическом свойстве точной верхней грани множества, для каждого $\varepsilon>0$ существует такой номер n_{ε} , что $x_{n_{\varepsilon}}>x_{0}-\varepsilon$. Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ возрастающая, значит, $x_n>x_{n_\varepsilon}>x_0-\varepsilon$ для любого $n>n_\varepsilon$. С другой стороны, из условия, что x_0 – точная верхняя грань, имеем $x_n \le x_0 < x_0 + \varepsilon$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Таким образом, для любого $n > n_{\varepsilon}$ имеем $x_0 - \varepsilon < x_n < x_0 + \varepsilon$ или $|x_n - x_0| < \varepsilon$, то есть $\lim x_n = x_0$, и поскольку $x_0 \in \mathbb{R}$, последовательность $(x_n)_{n \ge 1}$ является сходящейся. Аналогично доказывается случай, когда последовательность убывает и ограничена снизу.

Задание с решением

७ Покажем, что последовательность $(x_n)_{n≥1}$, заданная начальным условием $x_1 = \sqrt{2}$ и рекуррентным соотношением $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, $\forall n \ge 1$, является сходящейся.

¹ Карл Теодор Вильгельм Вейерштрасс (1815–1897) – немецкий математик.

Сначала докажем, что последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ – возрастающая. Рассмотрим разность $x_{n+1}^2-x_n^2$. Получаем: $x_{n+1}^2-x_n^2=2+x_n-x_n^2=(1+x_n)(2-x_n)>0$ для всех $n \in \mathbb{N}^*$. Из последнего соотношения следует, что $x_{n+1}^2 > x_n^2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Так как $x_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, то получим, что $x_{n+1} > x_n$ для любого $n \in \mathbb{N}^*$. То есть данная последовательность - возрастающая.

Применяя метод математической индукции, докажем, что последовательность ограничена сверху.

Имеем: $x_1 = \sqrt{2} < 2$, $x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} < \sqrt{2 + 2} = 2$.

Предположим, что $x_n < 2$. Тогда $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} < \sqrt{2 + 2} = 2$.

Из метода математической индукции вытекает, что $x_n < 2, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

По теореме Вейерштрасса, последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, монотонно возрастающая и ограниченная сверху, является сходящейся.

- **Замечания.** 1. В доказательстве теоремы 10 получили, что $\lim x_n = \sup(x_n)$, если последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ возрастающая. Если последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ убывающая, то аналогично получаем $\lim_{n\to\infty} x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}^*} (x_n)$. 2. Если $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, то еще говорят, что *последовательность* $(x_n)_{n\geq 1}$ *сходится* к

Теорема 11. Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ сходится к x_0 тогда и только тогда, когда любая ее подпоследовательность $(x_{n_k})_{k\geq 1}$ сходится к x_0 . To есть $\lim_{k\to\infty} x_n = x_0 \Leftrightarrow \lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0$ для любой $(x_{n_k})_{k\geq 1}$.

Замечание. Чтобы числовая последовательность не имела предела, достаточно, чтобы две ее подпоследовательности имели различные пределы.

3.2. Свойства сходящихся последовательностей

Пусть $(x_n)_{n\geq 1}$ и $(y_n)_{n\geq 1}$ – две числовые последовательности. Последовательности $(\lambda \cdot x_n)_{n \ge 1}, \quad \lambda \in \mathbb{R}; \quad (x_n + y_n)_{n \ge 1}; \quad (x_n \cdot y_n)_{n \ge 1}; \quad \left(\frac{x_n}{y_n}\right)_{n \ge 1}, \quad y_n \ne 0, \quad \forall_n \in \mathbb{N}^*; \quad (x_n^{y_n})_{n \ge 1},$

 $\forall x_n > 0, n \in \mathbb{N}^*$, соответственно называются произведением последовательности на число, последовательностью-суммой, последовательностью-произведением, последовательностью-частным, последовательностью-степенью.

Естественным образом возникает вопрос: что можно сказать о пределах последовательностей, определенных выше, если последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, $(y_n)_{n\geq 1}$ имеют пределы, и если имеют, то как вычислить предел.

Теорема 12

1. Если последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ является сходящейся и $\lim x_n = a$, а число $\lambda \in \mathbb{R}$, то последовательность $(\lambda \cdot x_n)_{n \geq 1}$ – сходящаяся, и $\lim_{n \to \infty} (\lambda \cdot x_n)^{n \to \infty} = \lambda \cdot a = \lambda \cdot \lim_{n \to \infty} x_n$, то есть постоянный множитель может быть вынесен за знак предела.

2. Если последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$ и $(y_n)_{n\geq 1}$ являются сходящимися и $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim_{n\to\infty} y_n = b$, то последовательность $(x_n + y_n)_{n\geq 1}$ – сходящаяся, и $\lim_{n\to\infty} (x_n + y_n) = a + b = \lim_{n\to\infty} x_n + \lim_{n\to\infty} y_n$, то есть *предел суммы двух сходящихся последовательностей равен сумме пределов этих последовательностей*.

3. Если последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$ и $(y_n)_{n\geq 1}$ являются сходящимися и $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, $\lim_{n\to\infty} y_n = b$, то последовательность $(x_n\cdot y_n)_{n\geq 1}$ – сходящаяся, и $\lim_{n\to\infty} (x_n\cdot y_n) = a\cdot b = \lim_{n\to\infty} x_n\cdot \lim_{n\to\infty} y_n$, то есть предел произведения двух сходящихся последовательностей равен произведению пределов этих последовательностей.

4. Если последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$ и $(y_n)_{n\geq 1}$ являются сходящимися и $\lim_{n\to\infty} x_n = a$,

$$\lim_{n\to\infty} y_n = b \ (y_n \neq 0, \ \forall n \in \mathbb{N}^*)$$
 и $b \neq 0$, то последовательность $\left(\frac{x_n}{y_n}\right)_{n\geq 1}$ — сходя-

щаяся, и $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{a}{b} = \frac{\lim_{n\to\infty} x_n}{\lim_{n\to\infty} y_n}$, то есть предел частного двух сходящихся последовательностей равен частному пределов этих последовательностей.

3.3. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии

Теорема 13. Пусть последовательность $(S_n)_{n\geq 1},\ S_n=b_1+b_1q+...+b_1q^{n-1},\ y$ которой 0<|q|<1 и $b_1\neq 0.$ Тогда $\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{b_1}{1-q}.$

Доказательство

Сумму первых n членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии b_1 , b_1q , b_1q^2 , ... можно записать в виде $S_n = \sum_{i=1}^n b_i q^{i-1}$, |q| < 1.

Зная, что
$$S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$$
, $|q| < 1$, получаем:

$$\lim_{n \to \infty} S_n = \lim_{n \to \infty} \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{b_1}{1 - q} \cdot \lim_{n \to \infty} (1 - q^n) = \frac{b_1}{1 - q}, \text{ так как } \lim_{n \to \infty} q^n = 0.$$

3.4. Число е

Теорема 14. Последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, является сходящейся.

Доказательство

Применим теорему 10 (Вейерштрасса) из раздела 3.1 и *неравенство средних*: $\frac{a_1+a_2+...+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1a_2...a_n}\,, \quad a_1,\,a_2,\,...,\,a_n \in \mathbb{R}_+.$

Покажем, что последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $n \ge 1$, монотонна и ограничена.

Докажем монотонность последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$.

Рассмотрим числа
$$\underbrace{1+\frac{1}{n},\ 1+\frac{1}{n},\ ...,\ 1+\frac{1}{n}}_{n,\ n}$$
, 1.

Согласно неравенству средних, для этих n+1 положительных чисел верно нера-

$$\text{BEHCTBO: } \frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1} > \sqrt[n+1]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot 1} \Leftrightarrow \frac{n+2}{n+1} > \sqrt[n+1]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \Leftrightarrow \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} > \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \Leftrightarrow \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > \left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \quad \forall n \geq 1.$$

Значит, $\vec{x_n} < \vec{x_{n+1}}$, $\forall \vec{n} \ge 1$, откуда следует, что данная последовательность строго возрастает.

Докажем, что данная последовательность ограничена сверху. Рассмотрим следующие n+2 положительные числа: $1+\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n}, ..., 1+\frac{1}{n}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$.

Из неравенства средних для этих n+2 чисел следует, что

$$\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}{n+2} > {n+2 \choose n+2} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \iff$$

$$\Leftrightarrow \frac{n+2}{n+2} > {n+2 \choose n+2} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{4} \Leftrightarrow 1 > \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{4} \Leftrightarrow \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 4, \ \forall n \ge 1.$$

Значит, последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $n \ge 1$, ограничена сверху. Последовательность $(x_n)_{n\ge 1}$ монотонно возрастает и ограничена сверху, следовательно, по теореме Вейерштрасса, является сходящейся.

Предел последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, следуя Эйлеру¹, обозначают через e. Число e является иррациональ-




Даниил Бернулли

ным и принадлежит интервалу (2, 3). Иррациональность числа e была доказана в 1815 году Ж. Фурье². В 1728 году Д. Бернулли³ установил, что

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2,7182818284590...$$

Вамсно знать:
$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e.$$
 (8)

Замечание. Число e — фундаментальная константа математического анализа. Логарифм по основанию e широко используется в математике, физике и других областях, называется **натуральным логарифмом** и обозначается $\ln x = \log_e x$).



Леонард Эйлер



Жозеф Жан Батист Фурье

 $^{^{\}rm 1}$ Леонард Эйлер (1707–1783) – швейцарский математик, физик и астроном.

² Жозеф Жан Батист Фурье (1768–1830) – французский математик.

³ Даниил Бернулли (1700–1782) – швейцарский математик и физик.

Задания с рещением

4 1. Вычислим $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{3n+8}{3n+7}\right)^{6n+1}$.

Решение:

Применив теорему 11 и соотношение (8), получим:

$$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{3n+8}{3n+7} \right)^{6n+1} = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{3n+7} \right)^{6n+1} = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{3n+7} \right)^{\frac{3n+7}{1} \cdot \frac{1}{3n+7} \cdot (6n+1)} = \lim_{n \to \infty} \left\{ \left(1 + \frac{1}{3n+7} \right)^{\frac{3n+7}{1} \cdot \frac{1}{3n+7}} \right\}^{\frac{1(6n+1)}{3n+7}} = e^2.$$

\bigcips_2. Вычислим предел последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, если:

a)
$$x_n = \sqrt{n^2 + 2n - 3} - n;$$

6)
$$x_n = \frac{n+2}{3n+1}$$
;

$$\mathbf{B}) \ x_n = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n};$$

$$\Gamma) x_n = \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{3^n}}.$$

Решение:

а) Умножим и разделим выражение на сопряженное ему выражение:

$$\lim_{n \to \infty} (\sqrt{n^2 + 2n - 3} - n) = \lim_{n \to \infty} \frac{(n^2 + 2n - 3) - n^2}{\sqrt{n^2 + 2n - 3} + n} = \lim_{n \to \infty} \frac{2n - 3$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{n\left(2 - \frac{3}{n}\right)}{n\left(\sqrt{1 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n^2}} + 1\right)} = 1.$$

6)
$$\lim_{n \to \infty} \frac{n+2}{3n+1} = \lim_{n \to \infty} \frac{n\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n\left(3+\frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \to \infty} \frac{1+\frac{2}{n}}{3+\frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \to \infty} \left(1+\frac{2}{n}\right)}{\lim_{n \to \infty} \left(3+\frac{1}{n}\right)} = \frac{1+0}{3+0} = \frac{1}{3}.$$

в) Умножим числитель и знаменатель на выражение, сопряженное числителю:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)-n}{n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = 0.$$

г) Воспользуемся формулой суммы *п* первых членов геометрической прогрессии:

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n}}}{1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{3^{n}}} = \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}}{\frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}} = \frac{4}{3} \lim_{n \to \infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}} = \frac{4}{3}.$$

Упражнения и задачи

Реальный профиль

- Приведите примеры сходящихся, расходящихся числовых последовательностей.
 - 2. Пользуясь определением предела числовой последовательности, докажите, что:
- a) $\lim_{n\to\infty} \frac{4n-1}{n} = 4;$ 6) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2+1}{n^2} = 2;$ B) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n-3}{4n+5} = \frac{1}{2};$ $\lim_{n\to\infty} \frac{5n+6}{n+1} = 5.$
- сь определением предела последовательности, докажите, что:
 - a) $\lim_{n \to 1} \frac{n-1}{2} \neq \frac{1}{2}$;
- 6) $\lim_{n \to \infty} \frac{2n+1}{5n+1} \neq 1$.
- В 1 4. Применяя теорему Вейерштрасса, докажите сходимость последовательности

 $(x_n)_{n\geq 1}$, если: a) $x_n = \frac{2n+1}{n+1}$; б) $x_n = 1 + \frac{1}{3^n}$; в) $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$.

- 5. Вычислите предел:
 - Вычислите предел: a) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1};$ б) $\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n^2+n};$ в) $\lim_{n\to\infty}\frac{5}{3^n};$ г) $\lim_{n\to\infty}\frac{n+2}{3n+1};$ д) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{3}}{2^n}\right);$ e) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n;$ ж) $\lim_{n\to\infty}\frac{3^n+5\cdot 2^n}{4^n+5^{n+1}};$ 3) $\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+2n+3}-n).$ Вычислите предел: a) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2n};$ б) $\lim_{n\to\infty}\frac{1-2+3-4+...-2n}{n};$

- \mathbb{C}_1 6. Вычислите предел: a) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2n}$;

- B) $\lim_{n \to \infty} \left(\frac{n^2}{2n^2 + 1} + \frac{\sqrt{n+2}}{n+3} \right)$; $\Gamma = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{2n-1}{2n+3} \right)^n$.

Упражнения и задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. Запишите первые пять членов последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, заданной формулой:
 - a) $x_n = \frac{3n-2}{2+n}$;

- а) $x_n = \frac{3n-2}{2+n}$; б) $x_n = \sin\left(\frac{\pi}{6} \cdot n\right)$; в) $x_n = (-1)^n \cdot 7 + \frac{1}{n}$.

- a) $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{\bar{3}}{4}$, $\frac{\bar{4}}{5}$, ...; 6) 2, 4, 6, 8, 10, ...; B) 3, -3, 3, -3, ...; Γ) $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{27}$, $\frac{1}{81}$, ...
- 3. Paбomaйте в парах! Приведите примеры: а) конечных последовательностей; б) бесконечных последовательностей; в) монотонных последовательностей.
- **4.** Выясните, является ли монотонной последовательность $(x_n)_{n\geq 1}, x_n = \left(-\frac{1}{2}\right)$.
- **В** 5. Запишите формулу общего члена арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, в которой: а) $a_1 = -2$ и r = -4; б) $a_1 = 1$ и r = 2; в) $a_1 = -10$ и r = 5; г) $a_1 = 3$ и r = 7.
 - **6.** Найдите сумму первых 100 членов арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, если: a) $a_1 = 2$, r = -5; б) $a_1 = -1$, r = 1.
 - 7. Запишите формулу общего члена геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, в которой: 6) $b_1 = -10$, $q = \frac{1}{2}$; B) $b_1 = 3$, q = 2.
 - **8.** *Исследуйте!* Выясните, является ли последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ арифметической или геометрической прогрессией, если: a) $x_1 = 2$, $x_{n+1} = 3x_n$; 6) $x_1 = 4$, $x_{n+1} = 2 + x_n$; B) $x_1 = -4$, $x_{n+1} = \frac{1}{3}x_n$; r) $x_1 = -1$, $x_{n+1} = 5 + x_n$.
 - В положительном случае найдите формулу общего члена прогрессии и ее разность или соответственно знаменатель.

- **9.** Пусть числа $a_1, a_2, ..., a_n$ образуют арифметическую прогрессию. Найдите: а) n и S_n , если $a_n = 5$, $a_1 = 23$, r = -2; б) a_1 и n, если $a_n = 18$, r = 2, $S_n = 88$.
- **С 10.** Пусть числа b_1 , b_2 , ..., b_n образуют геометрическую прогрессию. Найдите S_n , если: a) $b_n = 1280$, $b_1 = 5$, n = 9; 6) $b_n = 384$, q = 2, n = 8.
 - 11. Велосипедист проехал за первый час 8 км. За каждый следующий час от проезжал расстояние на 2 км больше, чем за предыдущий. За сколько часов он преодолел 60 км?
 - 12. Камень, брошенный в скважину, проходит за первую секунду 4,9 м, и его скорость увеличивается на 9,8 м/с. Найдите глубину скважины, если камень достиг ее дна через 8 с.
 - **13.** *Исследуйте!* Найдите значения $x \in \mathbb{R}$, при которых числа 2x-2, x^2+1 , $3x^2 - 1$ образуют арифметическую прогрессию.

Реальный профиль

А₁ 1. Применяя определение предела последовательности, докажите, что

a)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1-5n}{n} = -5;$$
 6) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2-1}{3n^2} = \frac{2}{3};$ B) $\lim_{n\to\infty} \frac{n-3}{4n+5} = \frac{1}{4};$ $\lim_{n\to\infty} \frac{5n+6}{1-n} = -5.$

B)
$$\lim_{n \to \infty} \frac{n-3}{4n+5} = \frac{1}{4}$$
;

$$\lim_{n \to \infty} \frac{5n+6}{1-n} = -5$$

2. Пользуясь определением предела последовательности, докажите, чт

a)
$$\lim_{n \to \infty} \frac{n-1}{n+1} \neq \frac{1}{3}$$
;

6)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n+1}{7n+1} \neq 1$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{2n+1} \neq 1$$

3. Применяя теорему Вейерштрасса докажите, что последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$ сходится:

a)
$$x_n = \frac{3n+1}{2n+1};$$
 6) $x_n = 1 + \frac{1}{5^n};$ B₁ 4. Вычислите: a) $\lim_{n \to \infty} \frac{5}{n+1};$ 6) $\lim_{n \to \infty} \frac{2n}{n^2 + n};$

6)
$$x_n = 1 + \frac{1}{5^n}$$
;

B)
$$x_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{n+1}$$
.

a)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{5}{n+1}$$

$$6) \lim_{n \to \infty} \frac{2n}{n^2 + n}$$

B)
$$\lim_{n\to\infty}\frac{5}{2n}$$
;

$$\Gamma) \lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{3n+1};$$

- C_1 5. Длины сторон треугольника образуют арифметическую прогрессию с разностью 2. Косинус наименьшего угла этого треугольника равен $\frac{4}{5}$. Найдите периметр треугольника.
 - 6. Из полного сосуда, содержащего 729 л кислоты, забрали а литров кислоты, затем дополнили сосуд водой. После получения однородного раствора опять забрали aлитров кислоты и столько же долили воды. Эту процедуру проделали 6 раз, и после этого в сосуде осталось 64 л кислоты. Найдите величину а.
 - 7. Работайте в парах! Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел, которые при делении на 4 дают в остатке 1.
 - **8.** Докажите, что числа $(a+x)^2$, a^2+x^2 , $(a-x)^2$, $a, x \in \mathbb{R}$, образуют арифметическую прогрессию. Найдите сумму первых n членов прогрессии, если $(a+x)^2$ – первый член.

6)
$$\lim_{n\to\infty} (2n^3 - n^2 + 1);$$

B)
$$\lim_{n\to\infty} (1+3n-n^5);$$

$$\Gamma) \lim_{n\to\infty} \frac{2n-1}{2-3n};$$

$$\exists \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2n} + \frac{2n}{3n+1} \right)$$

$$\Gamma$$
) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n-1}{2-3n}$; $\prod_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2n} + \frac{2n}{3n+1}\right)$; e) $\lim_{n\to\infty} \frac{1+2+3+...+n}{n^2}$;

ж)
$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$
; 3) $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$;

$$\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

$$\operatorname{Him}_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1}).$$

Итоговый тест

Время выполнения работы: 45 минут

3

4

6

8

8

(8)

(9)

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **1.** Запишите первые 3 члена последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$: a) $x_n = \frac{3n-2}{n+2}$;
 - 6) $x_n = \frac{1 + (-1)^n}{3}$.
- **2.** Исследуйте на монотонность последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, заданную формулой: $x_n = \frac{2n-1}{2n+1}.$
- **3.** Найдите первый член и разность арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, в которой: $a_2 + a_4 = 16$, $a_1a_5 = 28$.
- **4.** Найдите первый член и знаменатель геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, если: $b_n-b_n=-4$, $b_n-b_n=8$.
- **5.** Чтобы поднять пианино на второй этаж, заплатили 3 д. ед., а за каждый следующий этаж платили в два раза больше, чем за предыдущий. Определите, на какой этаж подняли пианино, если за последний этаж заплатили 48 д. ед.

Схема опенивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	32–31	30–28	27–24	23–20	19–15	14–10	9–6	5–4	3–2	1-0

Время выполнения работы: 90 минут

Реальный профиль

- 1. Применяя теорему Вейерштрасса, докажите сходимость последовательности $(x_n)_{n\geq 1}, \ x_n = \frac{10\cdot 11\cdot ...\cdot (n+9)}{1\cdot 3\cdot ...\cdot (2n-1)}.$
- **2.** Найдите первый член и разность арифметической прогрессии $(a_n)_{n\geq 1}$, в которой $a_1+a_5=\frac{5}{2},\ a_3\cdot a_4=\frac{65}{72}.$
- **3.** Найдите первый член и знаменатель геометрической прогрессии $(b_n)_{n\geq 1}$, если: $b_4-b_2=-\frac{45}{32},\ b_6-b_4=-\frac{405}{512}.$
- **4.** За изготовление и монтаж нижнего кольца скважины заплатили 26 д. ед., а за каждое следующее кольцо платили на 2 д. ед. меньше, чем за предыдущее. Дополнительно заплатили еще 40 д. ед. Средняя цена за изготовление и монтаж одного кольца $22\frac{4}{9}$ д. ед. Найдите, сколько всего колец было смонтировано.

Схема оценивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	34–33	32–30	29–26	25–21	20–16	15–11	10–7	6–4	3–2	1-0

Последовательности действительных чисел

последовательности Способы задания

- 2) перечислением членов последовательности;
 - рекуррентным соотно-

Ограниченная 1) аналитический;

последовательность Обозначают: $(x_n)_{n\geq 1}$ Числовая $f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$

Последовательность- $(x_n + y_n)_{n \ge 1}$ сумма

Последовательностьпроизведение $(x_n \cdot y_n)_{n \ge 1}$

возрастающая: $x_n \le x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ убывающая: $x_n \ge x_{n+1}, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$

Монотонная последовательность

Последовательность- Последовательность- $((x_n)^{y_n})_{n\geq 1}$ частное $|x| \leq |x|$

Арифметическая прогрессия $a_n = a_1 + r(n-1), n \in \mathbb{N}^*$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n, \ n \in \mathbb{N}^*$$

 $a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}, \ k \in \mathbb{N}^*$

Геометрическая прогрессия

$$b_n = b_1 q^{n-1}, n \in \mathbb{N}^*$$

 $S_n = \frac{b_1 (1 - q^n)}{1 - q}, n \in \mathbb{N}^*$

$b_k^2 = b_{k-1} \cdot b_{k+1}, \ k \in \mathbb{N}^*$

Неравенство средних

$$\frac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{n} \ge \sqrt[n]{a_1 a_2 ... a_n}, \ n \in \mathbb{N}^*,$$

$$a_1, a_2, ..., a_n \in \mathbb{R}_+$$

=eчисло е $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)$

Георема о характеристическом свойстве точной верхней грани множества

 $\exists M \in \mathbb{R}: x_n \leq M, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$

 $\exists m \in \mathbb{R} : x_n \ge m, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$

последовательность

Пусть $X \subset \mathbb{R}$ – непустое множество, ограниченное сверку. Число $M^{^st}$ является точной верхней гранью множества X тогда и только тогда, когда:

2) для любого $\varepsilon > 0$ существует элемент $x_{\varepsilon} \in X$ такой, что I) любой элемент $x \in X$ удовлетворяет неравенству $x \le M^*$; $x_{\varepsilon} > M^* - \varepsilon.$

Георема о характеристическом свойстве очной нижней грани множества

Число m^st является точной нижней гранью множества XПусть $X \subset \mathbb{R}$ – непустое множество, ограниченное снизу. гогда и только тогда, когда:

1. $\lim_{n \to \infty} (\lambda \cdot x_n) = \lambda \cdot \lim_{n \to \infty} x_n$, $\lambda - \text{const}$

Свойства сходящихся последовательностей

 $(x_n)_{n\geq 1}, (y_n)_{n\geq 1}$ pabhbi \Leftrightarrow

 $\Leftrightarrow x_n = y_n, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$

последовательности

Равные

2. $\lim_{n\to\infty}(x_n\pm y_n)=\lim_{n\to\infty}x_n\pm\lim_{n\to\infty}y_n$

3. $\lim_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = \lim_{n\to\infty}x_n \cdot \lim_{n\to\infty}y_n$

1) любой элемент $x \in X$ удовлетворяет неравенству $x \ge m^*$; 2) для любого $\varepsilon > 0$ существует элемент $x_{\varepsilon} \in X$ такой, что $x_{\varepsilon} < m^* + \varepsilon.$

Георема Вейерштрасса

Любая монотонная и ограниченная числовая последовательность является сходящейся.

5. $\lim_{n\to\infty}(x_n)^{y_n} = \left[\lim_{n\to\infty}x_n\right]_{n\to\infty}^{\lim y_n}$

4. $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} x_n}{\lim_{n\to\infty} y_n}$

Модуль

Предел функции

Цели

- *определение предельных и изолированных точек множества;
- *применение в различных контекстах предела функций в точке*, использование односторонних пределов функций при решении задач, *распознавание функций, имеющих или не имеющих предел в данной точке;
 - *вычисление пределов элементарных и сложных функций в точке, *применение при решении задач алгебраических операций над пределами функций;
 - *применение замечательных пределов при вычислении пределов функций, *распознавание неопределенностей и использование методов их раскрытия.

§1 Предел функции в точке

1.1. Предельные точки множества

Пусть $E\subseteq\mathbb{R}$ — подмножество множества действительных чисел и $f\colon E\to\mathbb{R}$ — некоторая функция. В этом модуле рассматривается поведение функции f в окрестности точки x_0 , которая, в общем случае, не принадлежит множеству E, то есть исследуется, что происходит со значениями f(x) функции f, если значения аргумента $x, x\neq x_0$, сколь угодно близки к x_0 . Для того чтобы аргумент $x\in E$ приближался достаточно близко к x_0 , необходимо, чтобы в любой окрестности x_0 находились точки множества E, то есть, чтобы точка x_0 была предельной точкой множества E.

Определение. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}$. Точка $x_0 \in \mathbb{R}$ называется предельной точкой множества E, если в любую окрестность x_0 попадает хотя бы одна точка множества $E \setminus \{x_0\}$.

Следовательно, $x_0 \in \mathbb{R}$ является *предельной точкой* множества E, если для любой окрестности V точки x_0 верно соотношение $V \cap (E \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$. И наоборот, $x_0 \in \mathbb{R}$ не является предельной точкой множества E, если существует окрестность V' точки x_0 , которая не содержит ни одной точки множества $E \setminus \{x_0\}$, то есть $V' \cap (E \setminus \{x_0\}) = \emptyset$. Точка $x_0 \in E$, не являющаяся предельной точкой для E, называется изолированной точкой множества E. Множество $E \subseteq \mathbb{R}$ называется замкнутым множеством, если ему принадлежат все его предельные точки. Ограниченное и замкнутое множество называется компактным множеством.

Теорема 1. Точка $x_0 \in \mathbb{R}$ является предельной точкой множества $E \subseteq \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда существует последовательность $(x_n)_{n\geq 1}, \ x_n \in E \setminus \{x_0\},$ такая, что $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$.

Доказательство

 $\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} $Heo \emph{б} xo \emph{d} u \textit{мость}.$ Предположим, что x_0 является предельной точкой множества E, и рассмотрим окрестности $V_n = \left(x_0 - \frac{1}{n}, \; x_0 + \frac{1}{n}\right)\!, \; n \in \mathbb{N}, \; n \geq 1, \; \text{точки x_0.} \end{tabular} . \end{tabular}$ окрестность \$V_n\$ попадает хотя бы одна точка \$x_n \in E\$, \$x_n \neq x_0\$, то есть \$x_0 - \frac{1}{n} < x_n < x_0 + \frac{1}{n}\$, откуда следует, что \$|x_n - x_0| < \frac{1}{n} < \varepsilon \; для любого \$n > \$\left(\frac{1}{\varepsilon} \right) + 1\$. Следовательно, \$\lim_{n \to \infty} x_n = x_0\$.} \end{tabular}

Достаточность. Если множество E содержит последовательность $(x_n)_{n\geq 1}$, члены которой $x_n \neq x_0$, такую, что $x_n \to x_0$ при $n \to \infty$, то из определения предела числовой последовательности следует, что для любой окрестности V точки x_0 все члены x_n данной последовательности принадлежат окрестности V, начиная с некоторого номера N. Следовательно, $V \cap (E \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$, то есть x_0 является предельной точкой множества E. ▶

Замечание. Определение предельной точки и теорема 1 верны и тогда, когда x_0 является $+\infty$, $-\infty$ или ∞ . В этих случаях при доказательстве теоремы 1 рассматривают окрестности $V_n = (n, +\infty)$, $V_n = (-\infty, -n)$ или $V_n = (-\infty, -n) \cup (n, +\infty)$, $n \in \mathbb{N}, n \ge 1$.

Примеры


- **1.** Для E = (a, b) или E = [a, b] любая точка $x_0 \in [a, b]$ является предельной точкой.
- 2. Для множества N предельной точкой является +∞. Все точки множества N являются изолированными точками.
- **3.** Для множества $E = [-2, 1) \cup \{3\}$ в качестве предельной точки может быть любая точка $x_0 \in [-2, 1]$, а точка $x_0 = 3$ является изолированной точкой этого множества.
- **4.** Предельными точками множества $E = \left\{ -1, \ 2, \ -\frac{1}{2}, \ \frac{3}{2}, \ -\frac{1}{3}, \ \frac{4}{3}, \ -\frac{1}{4}, \ \frac{5}{4}, \ -\frac{1}{5}, \ \frac{6}{5}, \ \ldots \right\},$ являются точки $x_0 = 0$ и $x_0 = 1$, так как это множество содержит последовательности $(x'_n)_{n\geq 1}, \ x'_n = -\frac{1}{n},$ и $(x''_n)_{n\geq 1}, \ x''_n = 1 + \frac{1}{n},$ для которых $\lim_{n\to\infty} x'_n = 0,$ $\lim_{n\to\infty} x''_n = 1,$ где $x'_n \neq 0,$ $x''_n \neq 1,$ $\forall n \geq 1$. Все точки $x_0 \in E$ являются изолированными точками множества .

1.2. Предел функции в точке

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}$, $f: E \to \mathbb{R}$ —некоторая функция, $x_0 \in \mathbb{R}$ —предельная точка множества E и $l \in \mathbb{R}$. Далее раскроем точный смысл утверждения: "Если значения аргумента x приближаются к точке x_0 , то значения f(x) функции f приближаются к числу l".

Для начала рассмотрим несколько примеров.

1. Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{2}$, и точка $x_0 = 2$ (рис. 2.1).




На рисунке 2.1 видно, что если значения аргумента x приближаются сколь угодно близко к $x_0 = 2$, то значения f(x) функции f приближаются сколь угодно близко к l = 1.

Полученный результат можно описать различными способами.


Например, если $(x_n)_{n\geq 1}$ – произвольная последовательность, сходящаяся к $x_0=2$, то последовательность $(f(x_n))_{n\geq 1}$, где $f(x_n) = \frac{x_n}{2}$, сходится к l=1 (рис. 2.1).


Другой способ: для любой окрестности $U = (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon), \ \varepsilon > 0$, с центром в точке l=1 оси Oy, существует окрестность $V=(2-2\varepsilon, 2+2\varepsilon), \varepsilon>0$, с центром в точке $x_0 = 2$ оси Ox такая, что для любого $x \in V$ следует, что $f(x) \in U$ (рис. 2.1).

2. Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1},$ которая не определена в точке 1. Для любой последовательности $(x_{_n})_{_{n\geq 1}},\, x_{_n}\neq 1,$ где $x_{_n}\to 1$ при $n\to\infty,$ получим $f(x_n) = \frac{x_n^2 - 1}{x - 1} = x_n + 1 \to 2$ при $n \to \infty$ (рис. 2.2).



и точка $x_0 = 1$ (рис. 2.3). Из графического изображения функции f следует: если значения x сколь угодно близки к $x_0 = 1$, но больше 1, то значения функции f близки к l=2; если же значения x сколь угодно близки к $x_0=1$, но меньше 1, то значения функции f близки к l = 0. Значит, не существует такое число $l \in \mathbb{R}$, к которому значения функции f приближаются тогда, когда значения аргумента x приближаются к $x_0 = 1$.





Таким образом, в примере 1 (соответственно в примере 2) будем говорить, что число l=1 (соответственно число l=2) является пределом функции f в точке $x_0=2$ (соответственно в точке $x_0=1$), а в примере 3 будем говорить, что функция f не имеет предела в точке $x_0=1$.

Рассмотренные примеры приводят к трем определениям предела функции в точке.

Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ $(E \subseteq \mathbb{R})$ — некоторая функция и $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества E.

Определение ("на языке окрестностей"). Говорят, что функция f имеет предел $l \in \mathbb{R}$ в точке x_0 , если для любой окрестности U точки l существует окрестность V точки x_0 такая, что для любого $x \in V \cap (E \setminus \{x_0\})$ следует, что $f(x) \in U$.


Предел функции f в точке x_0 обозначают $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$ или $f(x) \to l$ при $x \to x_0$ и читают: Предел функции f(x) при x, стремящемся κ x_0 , равен l, или f(x) стремится κ l при x, стремящемся κ x_0 .

В определении предела функции в точке, окрестности точки l можно рассматривать в виде $U = \{y \in \mathbb{R} \big| |y-l| < \varepsilon\} = (l-\varepsilon, l+\varepsilon), \ \varepsilon > 0$, а окрестности точки x_0 — в виде $V = \{x \in \mathbb{R} \big| |x-x_0| < \delta\} = (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \ \delta > 0$, и очевидно, что в общем случае V зависит от U. Значит, δ зависит от ε , то есть $\delta = \delta(\varepsilon)$.

Следовательно, определение предела может быть сформулировано эквивалентно при помощи числовых неравенств.

Определение (по Коши¹, или на языке $\varepsilon - \delta$). Говорят, что функция f имеет предел $l \in \mathbb{R}$ в точке x_0 , если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для любого $x \in E \setminus \{x_0\}$ из $|x - x_0| < \delta$ следует, что $|f(x) - l| < \varepsilon$.

Понятия предела $l = \lim_{x \to x_0} f(x)$ функции f в точке x_0 распространяется и на случай, когда одно или оба значения x_0 , l не являются конечными.



Огюстен Луи Коши

Представим некоторые из этих определений.

Определения (по Коши)

1. Говорят, что предел функции f в точке x_0 равен $+\infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для любого $x \in E \setminus \{x_0\}$ из неравенства $|x - x_0| < \delta$ следует, что $f(x) > \varepsilon$. Обозначают: $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$.

При помощи символов \exists , \forall , определение 1 можно записать короче: $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty \ (x_0 \in \mathbb{R}),$ если $\forall \varepsilon > 0, \ \exists \ \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\forall x \in E \setminus \{x_0\},$ $|x-x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > \varepsilon.$

¹ Огюстен Луи Коши (1789–1857) – французский математик.

2. Говорят, что предел функции f в точке x_0 равен ∞, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для любого $x \in E \setminus \{x_0\}$ из неравенства $|x - x_0| < \delta$ следует, что $|f(x)| > \varepsilon$.

Обозначают: $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$.

В сокращенном виде определение 2 можно записать так: $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$ $(x_0 \in \mathbb{R})$ если $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\forall x \in E \setminus \{x_0\}$, $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > \varepsilon$.

- 3. $\lim_{x\to +\infty} f(x) = l \ (l \in \mathbb{R})$, если $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\forall x \in E$, $x > \delta \Rightarrow |f(x) l| < \varepsilon$.
- **4.** $\lim_{x \to \infty} f(x) = -\infty$, если $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\forall x \in E$, $|x| > \delta \Rightarrow f(x) < -\varepsilon$.
- 5. $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \infty$, если $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $\forall x \in E$, $x > \delta \Rightarrow |f(x)| > \varepsilon$.

Замечания. 1. Для x_0 , $l \in \mathbb{R}$ геометрический смысл определений предела функции f в точке x_0 "на языке окрестностей" и по Коши состоит в следующем: для значений аргумента x, достаточно близких κ x_0 , соответствующие значения f(x) функции f сколь угодно близки κ l (рис. 2.4).

2. Для функции $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $f(n) = a_n$, определения 3 и 5 (по Коши) предела функции в точке представляют собой определение предела числовой последовательности с конечным или бесконечным пределом.




Рис. 2.4

- 3. Можно доказать, что если существуют две последовательности $(x'_n)_{n\geq 1}$ и $(x''_n)_{n\geq 1}$ множества $E\setminus\{x_0\}$, у которых $\lim_{n\to\infty}x'_n=\lim_{n\to\infty}x''_n=x_0$ такие, что соответствующие последовательности $(f(x'_n))_{n\geq 1}$ и $(f(x''_n))_{n\geq 1}$ имеют различные пределы или вообще не имеют предела, то функция f не имеет предела в точке x_0 . Замечание 3 применяется при доказательстве того, что функция f не имеет предела в точке x_0 .
- **4.** Можно доказать, что *если существует предел функции в точке, то этот предел единственный.*

При выполнении каждого из следующих заданий было применено то определение предела функции в точке, которое ему адекватно.

Задания с решением

4. Применив определение предела функции в точке "на языке окрестностей", покажем, что функция $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 3x, \text{ если } x < 1, \\ 0, \text{ если } x = 1, \\ 2x + 1, \text{ если } x > 1, \end{cases}$ имеет предел в $x_0 = 1$ и $\lim_{x \to \infty} f(x) = 3$.

Решение:

Пусть $U=(3-\varepsilon, 3+\varepsilon), \ \varepsilon>0, -$ произвольная окрестность точки l=3. Если x<1, то

$$f(x) = 3x \in U \Leftrightarrow 3 - \varepsilon < 3x < 3 + \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \frac{\varepsilon}{3} < x < 1 + \frac{\varepsilon}{3} \Leftrightarrow x \in \left(1 - \frac{\varepsilon}{3}, 1\right)$$

Если же x > 1, то

$$f(x) = 2x + 1 \in U \Leftrightarrow 3 - \varepsilon < 2x + 1 < 3 + \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \frac{\varepsilon}{2} < x < 1 + \frac{\varepsilon}{2} \Leftrightarrow x \in \left(1, 1 + \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Пусть $V = \left(1 - \frac{\varepsilon}{3}, 1 + \frac{\varepsilon}{3}\right)$ – окрестность точки $x_0 = 1, V \subset \left(1 - \frac{\varepsilon}{3}, 1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)$ Из $x \in V$,

 $x \neq 1$, следует, что $x \in \left(1 - \frac{\varepsilon}{3}, 1\right)$ или $x \in \left(1, 1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)$, откуда $f(x) \in U$.

Следовательно, $\lim_{x\to 1} f(x) = 3$.

\$ 2. Дана функция $f: [-1, 3] \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$. Применив определение предела функции в точке по Коши, покажем, что $\lim_{x\to 2} f(x) = 5$.

Решение:

 $\forall \varepsilon > 0 \text{ и } \forall x \in [-1, \ 3] \text{ имеем } |x| \leq 3 \text{ и } |f(x) - 5| = |3x^2 - 4x - 4| = |(x - 2)(3x + 2)| \leq \\ \leq |x - 2|(3|x| + 2) \leq 11|x - 2| < \varepsilon, \text{ если } |x - 2| < \frac{\varepsilon}{11}. \text{ Значит, } \forall \varepsilon > 0, \ \exists \, \delta > 0 \left(\delta = \frac{\varepsilon}{11} \right) \\ \text{такое, что } \forall x \in [-1, \ 3] \setminus \{2\} \text{ из } |x - 2| < \delta \text{ следует, что } |f(x) - 5| < \varepsilon. \\ \text{То есть } \lim_{x \to 2} f(x) = 5.$

७ 3. Дана функция $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{(x+1)^3}$. Покажем, что $\lim_{x \to -1} f(x) = \infty$. *Решение*:

Зададим $\varepsilon > 0$. Взяв любой $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, получим $|f(x)| > \varepsilon \Leftrightarrow |x+1|^3 < \frac{1}{\varepsilon} \Leftrightarrow \Leftrightarrow |x+1| < \frac{1}{\sqrt[3]{\varepsilon}}$. Значит, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0 \left(\delta = \frac{1}{\sqrt[3]{\varepsilon}}\right)$ такое, что $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ из $|x+1| < \delta$ следует, что $|f(x)| > \varepsilon$ и, согласно определению по Коши, получим, что $\lim f(x) = \infty$.

4. Дана функция $f: \mathbb{R} \setminus \{-2\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{2x^2 + 5x + 2}{x + 2}$. Докажем, что $\lim_{x \to 2} f(x) = -3$.

Решение:

Пусть $\varepsilon > 0$ произвольное и любое $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Тогда
$$f(x) = \frac{2x^2 + 5x + 2}{x + 2} = \frac{(2x + 1)(x + 2)}{x + 2} = 2x + 1 \in (-3 - \varepsilon, -3 + \varepsilon) = U$$
, если и только если $-3 - \varepsilon < 2x + 1 < -3 + \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < 2x + 4 < \varepsilon \Leftrightarrow -\frac{\varepsilon}{2} < x + 2 < \frac{\varepsilon}{2} \Leftrightarrow \Leftrightarrow x \in V = \left(-2 - \frac{\varepsilon}{2}, -2 + \frac{\varepsilon}{2}\right)$ Значит, $\lim_{x \to -2} f(x) = -3$.

5. Даны функции $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \cos \frac{1}{x}$, и $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \sin x$. Покажем на основании замечания 3, что не существуют пределы $\lim_{x \to 0} f(x)$ и $\lim_{x \to +\infty} g(x)$.

Решение:

Функция f не имеет предела в точке $x_0=0$, так как существуют, по крайней мере, две последовательности $(x'_n)_{n\geq 1}$, $x'_n=\frac{1}{2n\pi}$, и $(x''_n)_{n\geq 1}$, $x''_n=\frac{1}{\pi+2n\pi}$, предел которых равен 0 при $n\to\infty$, тем не менее соответствующие им последовательности $(f(x'_n))_{n\geq 1}$, $f(x'_n)=1$, и $(f(x''_n))_{n\geq 1}$, $f(x''_n)=-1$, имеют различные пределы: 1 и -1 соответственно. Аналогично, функция g не имеет предела при $x\to+\infty$, потому что у последовательностей $(x'_n)_{n\geq 1}$, $x'_n=n\pi$, и $(x''_n)_{n\geq 1}$, $x''_n=\frac{\pi}{2}+2n\pi$, предел равен $+\infty$ (см. замечание 2), а $\lim_{n\to\infty} g(x'_n)=0$ и $\lim_{n\to\infty} g(x''_n)=1$.

1.3. Односторонние пределы

Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ $(E \subseteq \mathbb{R})$ – некоторая функция и $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка множества E. Предположим, что x_0 является предельной точкой множества $E_- = E \cap (-\infty, x_0)$ или множества $E_+ = E \cap (x_0, +\infty)$. В этом случае будем говорить, что x_0 является предельной точкой слева или предельной точкой справа множества E.

Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка слева (справа) множества E. Если x приближается к x_0 слева (соответственно справа) со значениями $x < x_0$ (соответственно $x > x_0$), то пишем $x \to x_0 = 0$ (соответственно $x \to x_0 = 0$). Для $x_0 = 0$ в этих случаях пишем $x \to -0$ (соответственно $x \to +0$).

Для функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} -x+1, \text{ если } x < 1, \\ x+1, \text{ если } x \ge 1, \end{cases}$ рассмотренной в разделе 1.2, мы получили, что не существует такого числа $l \in \mathbb{R}$, к которому значения f(x) функции f приближаются, в то время как значения аргумента x достаточно близки к 1. Если же значения аргумента x стремятся к 1 слева (x < 1), то значения f(x) = -x+1 стремятся к 0, но если значения аргумента x стремятся к 1 справа (x > 1), то значения f(x) = x+1 стремятся к 2. Значит, функция f не имеет предела в точке $x_0 = 1$, но говорят, что y нее есть односторонние пределы в этой точке.

В следующих определениях предполагается, что $f \colon E \to \mathbb{R} \ (E \subseteq \mathbb{R})$ – некоторая функция, а $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка слева (справа) множества E.

Определение. Говорят, что число $l_{_{n}} = l_{_{n}}(x_{_{0}}) \in \mathbb{R}$ является пределом слева функции f в точке $x_{_{0}} \in \mathbb{R}$, если для любой окрестности U точки $l_{_{n}}$ существует окрестность V точки $x_{_{0}}$ такая, что для любого $x \in V \cap E_{_{-}}$ следует, что $f(x) \in U$.

Определение. Говорят, что число $l_{_{\Pi}} = l_{_{\Pi}}(x_{_{0}}) \in \mathbb{R}$ является пределом справа функции f в точке $x_{_{0}} \in \mathbb{R}$, если для любой окрестности U точки $l_{_{\Pi}}$ существует окрестность V точки $x_{_{0}}$ такая, что для любого $x \in V \cap E_{_{+}}$ следует, что $f(x) \in U$.

Числа $l_{_{\rm I}}(x_{_0})$ и $l_{_{\rm II}}(x_{_0})$ называются односторонними пределами функции f в точке $x_{_0}$. Для них приняты обозначения:


$$l_{_{\Pi}}(x_{_{0}}) = \lim_{\substack{x \to x_{0} \\ x < x_{0}}} f(x), \quad l_{_{\Pi}}(x_{_{0}}) = \lim_{\substack{x \to x_{0} \\ x > x_{0}}} f(x)$$

или эквивалентные им обозначения:

$$f(x_0 - 0) = \lim_{x \to x_0 - 0} f(x), \ f(x_0 + 0) = \lim_{x \to x_0 + 0} f(x)$$
 (рис. 2.5).

Если $x_0 = 0$, в таких случаях пишем:

$$\lim_{x \to -0} f(x) = f(-0), \ \lim_{x \to +0} f(x) = f(+0).$$



Отметим, что определения односторонних пределов могут также быть сформулированы по Коши. Представим формулировку одного из этих определений, а остальные сформулируйте самостоятельно.

Определение (по Копи). Говорят, что число $l_{_{\Pi}} \in \mathbb{R}$ является пределом справа функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что для любого $x \in E$ из двойного неравенства $x_0 < x < x_0 + \delta$ следует, что $|f(x) - l_{_{\Pi}}| < \varepsilon$.

Замечание. Как и в случае предела функции, односторонние пределы $l_{_{\rm I}}$ и $l_{_{\rm I}}$ могут быть бесконечны ($+\infty$, $-\infty$ или ∞). Определения этих понятий возможно сформулировать на трех эквивалентных "языках". Представляем одно из этих определений.

Определение (по Коппи). Будем говорить, что $-\infty$ является пределом справа функции f в точке x_0 , если для любого $\varepsilon>0$ существует $\delta=\delta(\varepsilon)>0$ такое, что для любого $x\in E$ из двойного неравенства $x_0< x< x_0+\delta$ следует, что $f(x)< -\varepsilon$. Обозначают: $\lim_{x\to x_0+0} f(x)=-\infty$.

Полезный критерий существования предела функции в точке сформулирован в следующей теореме.

Теорема 2 (критерий "на языке односторонних пределов"). Пусть $f \colon E \to \mathbb{R}$ $(E \subseteq \mathbb{R})$ — некоторая функция и $x_0 \in \mathbb{R}$ является предельной точкой множеств E_- и E_+ . Функция f имеет предел в точке x_0 тогда и только тогда, когда функция f имеет в x_0 равные односторонние пределы: $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$. В этом случае $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$.

Доказательство

Необходимость. Если существует $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$, то согласно определению существуют и односторонние пределы $f(x_0 - 0) = l$ и $f(x_0 + 0) = l$.

Достаточность. Предположим, что существуют односторонние пределы $f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0)$, причем $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = l$, $l \in \mathbb{R}$. Из определения односторонних пределов функции в точке (по Коши) следует: $(\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = l)$ и $\lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = l) \Leftrightarrow \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0, \; \exists \; \delta_1 > 0, \; \exists \; \delta_2 > 0 \; \text{ такие, что} \; \forall x \in E \setminus \{x_0\}, \; \text{ если} \; x_0 - \delta_1 < x < x_0 \; \text{ или}$ $x_0 < x < x_0 + \delta_2 \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$).

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$. Очевидно, что $\forall x \in E \setminus \{x_0\}$ из $|x - x_0| < \delta \Rightarrow (x_0 - \delta_1 < x < x_0)$ или $x_0 < x < x_0 + \delta_2) \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$. Следовательно, $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$.

Аналогично доказывается случай, когда предел l бесконечен.

Задания с решением

5 1. Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2 + x, \text{ если } x \leq 2, \\ 2x + 3, \text{ если } x > 2. \end{cases}$ Вычислим односторонние пределы функции f в точке $x_0 = 2$. Имеет ли функция f предел в точке $x_0 = 2$? Решение:

Согласно определению предела функции по Коши, получим $\lim_{x\to 2}(x^2+x)=6$ и $\lim_{x\to 2}(2x+3)=7$.

На основании определения односторонних пределов и теоремы 2 получим: если x < 2, то $f(x) = x^2 + x$ и, следовательно, $f(2-0) = \lim_{\substack{x \to 2 \\ x < 2}} (x^2 + x) = \lim_{\substack{x \to 2 \\ x < 2}} (x^2 + x) = 6$, а если x > 2, то f(x) = 2x + 3 и, следовательно, $f(2+0) = \lim_{\substack{x \to 2 \\ x > 2}} (2x + 3) = \lim_{\substack{x \to 2 \\ x > 2}} (2x + 3) = 7$.

Так как $f(2-0) \neq f(2+0)$, на основании теоремы 2 функция f не имеет предела в точке $x_0 = 2$.

5. Найдем значения действительного параметра a, при которых функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} x^2 + a^2, \text{ если } x \in [-1, 1], \\ 3ax + 1, \text{ если } x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty), \end{cases}$ имеет предел хотя бы в одной из точек -1 или 1. Чему равны эти пределы?

Решение:

Для любого $x \in (-1, 1)$ имеем $f(x) = x^2 + a^2$ и, следовательно,

$$l_{\pi}(1) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x < 1}} (x^2 + a^2) = 1 + a^2, \ l_{\pi}(-1) = \lim_{\substack{x \to -1 \\ x > -1}} (x^2 + a^2) = 1 + a^2.$$

Аналогично, для любого $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ получим, что f(x) = 3ax + 1 и, следовательно, $l_{\pi}(-1) = \lim_{\substack{x \to -1 \\ x < -1}} (3ax + 1) = 1 - 3a$, $l_{\pi}(1) = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} (3ax + 1) = 1 + 3a$.

Таким образом, функция f имеет предел в точке $x_0 = -1$, если: $l_{_{\rm I}}(-1) = l_{_{\rm I}}(-1) \Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow 1+a^2=1-3a \Leftrightarrow a \in \{-3, 0\}$. Если a=0, то $l_{\scriptscriptstyle \pi}(-1)=l_{\scriptscriptstyle \pi}(-1)=1 \Rightarrow \lim_{x\to -1}f(x)=1$, а если a = -3, то $l_{\pi}(-1) = l_{\pi}(-1) = 10 \Rightarrow \lim_{n \to \infty} f(x) = 10$.

Аналогично, функция f имеет предел в точке $x_0 = 1$, если: $l_n(1) = l_n(1) \Leftrightarrow 1 + a^2 = 1$ $=1+3a \Leftrightarrow a \in \{0, 3\}$. При a=0 получим $l_{_{\Pi}}(1)=l_{_{\Pi}}(1)=1 \Rightarrow \lim_{x\to 1}f(x)=1$, а при a=3получим $l_{\pi}(1) = l_{\pi}(1) = 10 \Rightarrow \lim_{x \to 0} f(x) = 10.$

Таким образом, при a = 0 функция f имеет предел в обеих точках, -1 и 1, а при $a \in \{-3, 3\}$ функция f имеет предел только в одной из них.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

A₁ 1. Покажите, что точка $x_0 = 2$ является предельной точкой множества $E \subseteq \mathbb{R}$:

a)
$$E = \left\{ \frac{2n}{n+1} \middle| n \in \mathbb{N}^* \right\};$$
 6) $E = \left\{ 2 + \frac{(-1)^n}{2^n} \middle| n \in \mathbb{N}^* \right\};$ B) $E = \left\{ \frac{4n+3}{2n+1} \middle| n \in \mathbb{N}^* \right\}.$

6)
$$E = \left\{ 2 + \frac{(-1)^n}{2^n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\};$$

$$E = \left\{ \frac{4n+3}{2n+1} \middle| n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

- **2.** Покажите, что точка $x_1 \in E$ (n=1), где E множество из упражнения 1, является изолированной точкой для E.
- 3. Применив определение предела функции в точке "на языке окрестностей", пока-

жите, что: a)
$$\lim_{x \to 1} (x+1) =$$

6)
$$\lim_{x\to 2} \left(\frac{1}{2}x - 3\right) = -2;$$

$$\Gamma$$
) $\lim_{x \to -1} (1 - 2x) = 3$;

д)
$$\lim_{x\to 2} (x-3) = -1$$
;

e)
$$\lim_{x \to 1} x^2 = 1$$
.

4. Используя определение предела функции в точке на языке $\varepsilon - \delta$, докажите, что:

a)
$$\lim_{x \to -1} (2 - 3x) = 5$$

6)
$$\lim_{x\to 3} \left(\frac{2}{3}x - 3\right) = -1;$$

$$\lim_{x \to 4} (\sqrt{x}) = 2.$$

5. Используя свойства сходящихся последовательностей, вычислите $\lim f(x_n)$, если

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x_0: \quad \text{a)} \ f(x) = \frac{2x^3 - 3x + 5}{x^2 + 1}, \ x_0 = 1; \qquad \qquad \text{b)} \ f(x) = \frac{2x^2 + 5x + 2}{3x^2 + 5x - 2}, \ x_0 = -2;$$

6)
$$f(x) = \frac{2x^2 + 5x + 2}{3x^2 + 5x - 2}$$
, $x_0 = -2$

B)
$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 - 4x - 5}$$
, $x_0 = -1$.

В₁ **6.** Найдите предельные точки множества:

a)
$$E = \left\{ (-1)^n \cdot \frac{2n+3}{n+1} \middle| n \in \mathbb{N} \right\}$$
; 6) $E = \left\{ \frac{n}{n+3} (3 + (-1)^n) \middle| n \in \mathbb{N} \right\}$; B) $E = \left\{ \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{n\pi}{3} \middle| n \in \mathbb{N} \right\}$.

7. Напишите хотя бы одну числовую последовательность из Е, предел которой равен x_0 , где x_0 – предельная точка множества E:

a)
$$E = \mathbb{R} \setminus [0, 4), x_0 = 4;$$

6)
$$E = \left\{ \frac{(-1)^n \cdot n}{n+2} \middle| n \in \mathbb{N}^* \right\}, x_0 \in \{-1, 1\}.$$

- 8. Работайте в парах! Используя определение предела функции в точке по Коши, докажите, что:
 - a) $\lim_{x\to 2} (2x^2 5x + 3) = 1$;
- 6) $\lim_{x \to -2} \frac{3x+7}{x+3} = 1;$ B) $\lim_{x \to +\infty} \frac{2x-1}{x+1} = 2.$
- 9. Покажите, что не существует предела
 - a) $\lim_{x\to 1}\cos\frac{1}{x-1}$;
- б) $\limsup^2 \pi x$;
- B) $\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi}{n}$.

10. Вычислите в указанной точке x_0 односторонние пределы функции $f \colon D^1 \to \mathbb{R}$: a) $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & \text{если } x \leq 2, \\ x^2+x, & \text{если } x > 2, \end{cases}$ б) $f(x) = \frac{3x^2+4x+1}{x^2-1}, \ x_0 \in \{-1,1\}.$

a)
$$f(x) = \begin{cases} 2x+1, & \text{если } x \le 2, \\ x^2+x, & \text{если } x > 2. \end{cases}$$

6)
$$f(x) = \frac{3x^2 + 4x + 1}{x^2 - 1}, x_0 \in \{-1, 1\}.$$

11. Убедитесь, что функция f имеет предел в указанной точке x_0 , и вычислите предел

$$t = \lim_{x \to x_0} f(x), \text{ если } f: D \to \mathbb{R}.$$
a) $f(x) = \begin{cases} 3x + 1, \text{ если } x \le 1, \\ x^3 - 2x, \text{ если } x > 1, \end{cases}$ $x_0 \in \{0, 1\};$ 6) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{2 - x}, x_0 \in \{0, 2\}.$

6)
$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{2 - x}, x_0 \in \{0, 2\}.$$

 \mathbf{C}_1 12. — Исследуйте! Исследуйте в указанных точках x_k , $k \in \mathbb{Z}$, существование предела функции $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x), \ x_k = k\pi, \ k \in \mathbb{Z};$$

6)
$$f(x) = [x], x_k = k, k \in \mathbb{Z}$$

- **13.** Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$: a) f(x) = x [x]; б) $f(x) = [\cos x]$;
 - в) $f(x) = \sigma(\sin x)$, где $\sigma(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ 1, & \text{если } x \ge 0, \end{cases}$ единичная функция Хевисайда.

Выполните эскиз графика функции f и определите точки $x_0 \in \mathbb{R}$, в которых существует предел $\lim_{x \to \infty} f(x)$.

14.

Исследуйте! Пусть
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
:

а) $f(x) = \begin{cases} (ax+1)^2, & \text{если } x \leq 1, \\ ax+3, & \text{если } x > 1, \end{cases}$ $x_0 = 1;$ б) $f(x) = \begin{cases} a^2 - x^2, & \text{если } x < 2, \\ x-a, & \text{если } x \geq 2, \end{cases}$ $x_0 = 2.$

Найдите $a \in \mathbb{R}$ такое, что существует $\lim f(x)$, и вычислите этот предел.

15. Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} a^2x - x^2, & \text{если } x < -2, \\ -6, & \text{если } x = -2, \\ 3ax, & \text{если } x > -2. \end{cases}$ При каких значениях действительного параметра.

тельного параметра a существует $\lim_{x\to a} f(x)$ и $\lim_{x\to a} f(x) = f(-2)$?

Операции над пределами функций. Пределы элементарных функций

2.1. Операции над пределами функций

Рассмотрим операции, которые можно выполнять над пределами функции. Докажем некоторые из этих операций, а доказательства остальных операций будут предложены в качестве упражнений.

Пусть E – непустое подмножество $\mathbb{R},\ x_{\scriptscriptstyle 0}$ – конечная или бесконечная предельная точка множества E и $f,g:E\to\mathbb{R}$ – две функции такие, что $\lim_{x\to\infty}f(x)=a$, $\lim g(x) = b$, где a и b конечны. Верны следующие высказывания:

① Если функция f имеет предел в точке x_0 и $c \in \mathbb{R}$, то и функция $c \cdot f$ имеет предел в точке x_0 и $\lim_{x\to x_0}[cf(x)]=c$ a=c $\lim_{x\to x_0}f(x)$. Следовательно, постоянный множитель можно вынести за знак предела.

Замечание. Если в высказывании ① допустить, что f(x) = 1, то $\lim c = c$. Следовательно, предел постоянной в любой точке x_0 равен этой постоянной.

 $^{^{1}}$ Здесь и далее множество D означает максимальную область определения функции.

② Если функции f, g имеют предел в точке x_0 , то и функция $f \pm g$ имеет предел в точке x_0 и $\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = a \pm b = \lim_{x \to x_0} f(x) \pm \lim_{x \to x_0} g(x)$ – предел суммы (разности) функций равен сумме (разности) пределов этих функций.

Доказательство

Из определения предела функции в точке по Коши следует, что $(\lim_{x\to x_0} f(x) = a)$ и $\lim_{x\to x_0} g(x) = b$) \Leftrightarrow ($\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$, такие, что $\forall x \in E \setminus \{x_0\}$, если $|x-x_0| < \delta_1$ и $|x-x_0| < \delta_2 \Rightarrow |f(x)-a| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $|g(x)-b| < \frac{\varepsilon}{2}$). Итак, $\forall x \in E \setminus \{x_0\}$ из неравенства $|x-x_0| < \delta$, где $\delta = \min(\delta_2, \delta_2) > 0$, следует неравенство $|f(x) \pm g(x) - (a \pm b)| = |(f(x)-a) \pm (g(x)-b)| \le |f(x)-a| + |g(x)-b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Следовательно, согласно определению по Коши, $\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = a \pm b$.

③ Если функции f и g имеют предел в точке x_0 , то и функция $f \cdot g$ имеет предел в точке x_0 и $\lim_{x \to x_0} [f(x) \cdot g(x)] = a \cdot b = \lim_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim_{x \to x_0} g(x) - npeden произведения функций равен произведению пределов этих функций.$

Высказывания ② и ③ истинны и для конечного числа функций $f_1, f_2, ..., f_n$, имеющих предел в точке x_0 . В частности, из высказывания ③, для $f_1 = f_2 = ... = f_n = f$, получим, что $\lim_{x \to x_0} [f(x)]^n = [\lim_{x \to x_0} f(x)]^n$, $n \in \mathbb{N}$, $n \ge 1$.

- 4 Если функции f и g имеют предел в точке x_0 и $\lim_{x \to x_0} g(x) = b \neq 0$, то частное $\frac{f(x)}{g(x)}$ определено в некоторой окрестности точки x_0 множества $E \setminus \{x_0\}$, функция $\frac{f}{g}$ имеет предел в точке x_0 и $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b} = \frac{\lim_{x \to x_0} f(x)}{\lim_{x \to x_0} g(x)} npeden частного двух функций равен частному пределов этих функций.$
- ⑤ Если функции f и g имеют предел в точке x_0 и f(x)>0 для любого $x \in E$, то и функция f^g : $E \to \mathbb{R}$, $(f^g)(x) = [f(x)]^{g(x)}$ имеет предел в точке x_0 (за исключением случая 0^0) и $\lim_{x \to x_0} [f(x)]^{g(x)} = a^b = [\lim_{x \to x_0} f(x)]^{\lim_{x \to x_0} g(x)}.$

Условие существования предела сложной функции сформулировано в высказывании **6**.

- ⑥ Пусть E и F непустые подмножества множества \mathbb{R} , x_0 предельная точка множества E, u: $E \to F$, f: $F \to \mathbb{R}$ две функции, а $f \circ u$: $E \to \mathbb{R}$, $(f \circ u)(x) = f(u(x))$, $\forall x \in E$, сложная функция. Если
- 1) $\lim_{x \to x} u(x) = u_0,$
- 2) $u(x) \neq u_0$ для любого x из некоторой окрестности точки x_0 множества E и $x \neq x_0$,
- 3) $\lim f(u) = l,$

то сложная функция $f\circ u$ имеет предел в точке x_0 и $\lim_{x\to x_0} f(u(x)) = \lim_{u\to u_0} f(u) = l$.

Замечания. 1. Равенство $\lim_{x\to x_0} f(u(x)) = \lim_{u\to u_0} f(u)$, установленное в высказывании ⓐ, подтверждает общий способ, названный **методом подстановки** или **методом замены переменной** при вычислении пределов функций. А именно, правая часть равенства следует из левой при обозначении u=u(x), которое называется **подстановкой** или **заменой переменной**, и, учитывая условия 1) и 2) высказывания ⑥, $u\to u_0$ и $u\neq u_0$.

2. Операции над пределами функций верны и для односторонних пределов.

Высказывания 1 – 5 верны и в тех случаях, когда одна или обе функции f и g имеют бесконечный предел в точке x_0 или когда в частном $\frac{f}{g}$ имеем $\lim_{x \to x_0} g(x) = 0$.

Например, предположим, что $\lim_{x\to x_0} f(x) = a, \ a \in \mathbb{R}, \ a \lim_{x\to x_0} g(x) = +\infty, \ и докажем,$ что в этом случае функция f+g имеет предел в точке x_0 и $\lim_{x\to x_0} [f(x)+g(x)] = +\infty.$

Согласно определению предела функции в точке по Коши, имеем:

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ |x \to x_0|}} f(x) = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta_1(\varepsilon) > 0, \ \forall x \in E \setminus \{x_0\},$$

$$|x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow a - \varepsilon < f(x) < a + \varepsilon;$$

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ |x \to x_0|}} g(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \ \exists \delta_2(M) > 0, \ \forall x \in E \setminus \{x_0\},$$

$$|x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow g(x) > M - (a - \varepsilon).$$
(2)

Из соотношений (1) и (2) следует, что для любого M>0, $\exists \delta=\min(\delta_1(\varepsilon),\delta_2(M))>0$, такое, что для любого $x\in E\setminus\{x_0\}$ из неравенства $|x-x_0|<\delta$ следует $|x-x_0|<\delta_1$ и $|x-x_0|<\delta_2$, в свою очередь, из этих неравенств следует

$$f(x)+g(x)>(a-\varepsilon)+M-(a-\varepsilon)=M$$
.

По определению предела функции в точке по Коши, $\lim_{x \to x_0} [f(x) + g(x)] = +\infty$.

При помощи символов этот результат можно записать так: $a + (+\infty) = +\infty$, и он называется *определенным выражением* или просто *определенностью*.

Аналогично можно доказать и определенности вида:

$$a+(-\infty)=-\infty;$$
 $a+\infty=\infty;$ $(+\infty)+(+\infty)=+\infty;$ $a\cdot (+\infty)=+\infty$ $(a>0);$ $a\cdot (-\infty)=+\infty$ $(a<0);$ $a\neq 0$ и т.д.

В случае, когда $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ и $\lim_{x\to x_0} g(x) = -\infty$, о существовании предела функции f+g или $\frac{f}{g}$ в точке x_0 нельзя ничего утверждать.

При помощи символов этот результат можно записать так: $\infty - \infty$ или $\frac{\infty}{\infty}$, и он называется *неопределенным вырамсением* или просто *неопределенностью* (более подробно эти случаи будут рассмотрены в \$4).

Таким образом, операции над пределами функций могут иметь смысл или не иметь смысла. Поэтому эти операции могут привести к определенным (определенности) и неопределенным (неопределенности) выражениям.

Таблица определенностей

Если $a \in \mathbb{R}$, то:

1.
$$\infty + a = \infty$$

2.
$$(+\infty) + a = +\infty$$

3.
$$(-\infty) + a = -\infty$$

4.
$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

5.
$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

6.
$$a \cdot \infty = \infty \ (a \neq 0)$$

7.
$$a \cdot (+\infty) = +\infty \ (a > 0)$$

8.
$$a \cdot (-\infty) = -\infty \ (a > 0)$$

9.
$$a \cdot (+\infty) = -\infty \ (a < 0)$$

10.
$$a \cdot (-\infty) = +\infty \ (a < 0)$$

11.
$$(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

12.
$$(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$$

13.
$$(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$$

14.
$$\infty \cdot \infty = \infty$$

15.
$$\frac{a}{\infty} = 0$$

16.
$$\frac{\infty}{a} = \infty$$

17.
$$\frac{a}{0} = \infty \ (a \neq 0)$$

18.
$$a^{+\infty} = +\infty \ (a > 1)$$

19.
$$a^{-\infty} = 0$$
 $(a > 1)$

20.
$$a^{+\infty} = 0$$
 (0 < a < 1)

21.
$$a^{-\infty} = +\infty \ (0 < a < 1)$$

22.
$$(+\infty)^a = +\infty \ (a > 0)$$

23.
$$(+\infty)^a = 0$$
 $(a < 0)$

24.
$$0^{+\infty} = 0$$

25.
$$(+\infty)^{+\infty} = +\infty$$

26.
$$(+\infty)^{-\infty} = 0$$
.

Таблица неопределенностей

- 1. $\frac{\infty}{\infty}$
- 2. $\frac{0}{0}$
- **3.** 0·∞
- 4. ∞ ∞
- **5.** 1[∞]
- **6.** 0^{0}
- 7. ∞^0

Примеры

Из определения предела функции в точке следует, что $\lim_{x\to x_0} x = x_0$, где $x_0 \in \mathbb{R}$. Следовательно, на основании высказываний (1-6), получаем:

1.
$$\lim_{x \to 2} (3x^2 - 4x - 2) = 3(\lim_{x \to 2} x)^2 - 4\lim_{x \to 2} x - \lim_{x \to 2} 2 = 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 - 2 = 2;$$

2.
$$\lim_{x \to 2} [(x+3) \cdot (3x^2 - 4x - 2)] = \lim_{x \to 2} (x+3) \cdot \lim_{x \to 2} (3x^2 - 4x - 2) = 5 \cdot 2 = 10;$$

3.
$$\lim_{x\to 2} \frac{3x^2 - 4x - 2}{x + 3} = \frac{\lim_{x\to 2} (3x^2 - 4x - 2)}{\lim_{x\to 2} (x + 3)} = \frac{2}{5};$$

4.
$$\lim_{x \to 2} (3x^2 - 4x - 2)^{(x+3)} = \left[\lim_{x \to 2} (3x^2 - 4x - 2)\right]^{\lim_{x \to 2} (x+3)} = 2^5 = 32;$$


5.
$$\lim_{x \to -1} [3(x+3)^2 - 4(x+3) - 2] = \lim_{u \to 2} (3u^2 - 4u - 2) = 2 \quad (u = x+3 \to 2 \text{ cond } x \to -1).$$

2.2. Пределы элементарных функций

В разделе 2.2. будут изучены пределы элементарных функций, функций при помощи которых можно описать на математическом языке различные природные процессы. Приведем без доказательства соотношения для вычисления пределов соответствующих функций. Эти соотношения можно вывести при помощи определения предела функции в точке по Гейне или по Коши.


І. Степенная функция с натуральным показателем

 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}, n \ge 1 \text{ (рис. 2.6)}$



б)
$$\lim_{x\to\infty} x^n = \begin{cases} +\infty, & \text{если } n - \text{четное,} \\ \infty, & \text{если } n - \text{нечетное;} \end{cases}$$

в)
$$\lim_{x \to -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty, & \text{если } n - \text{четное}, \\ -\infty, & \text{если } n - \text{нечетное}, \end{cases}$$






Рис. 2.6

II. Степенная функция с целым отрицательным показателем

$$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \ n \in \mathbb{N}, \ n \ge 1 \text{ (рис. 2.7)}$$

a)
$$\lim_{x \to x_0} \frac{1}{x^n} = \frac{1}{x_0^n}, x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\};$$

$$6) \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^n}=0;$$

в)
$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty, & \text{если } n - \text{четное}, \\ \infty, & \text{если } n - \text{нечетное}; \end{cases}$$

$$\Gamma$$
) $\lim_{x\to+0}\frac{1}{r^n}=+\infty$;

д)
$$\lim_{x \to -0} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty, & \text{если } n - \text{четное}, \\ -\infty, & \text{если } n - \text{нечетное}. \end{cases}$$




Рис. 2.7

Ш. Функция-многочлен

$$P: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n, \ a_i \in \mathbb{R}, \ i = \overline{0, n}, \ a_0 \neq 0, \ n \in \mathbb{N}^*.$$

- a) $\lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0), x_0 \in \mathbb{R};$
- $6) \lim_{x \to \infty} P(x) = \lim_{x \to \infty} a_0 x^n;$

B) $\lim_{x \to +\infty} P(x) = \lim_{x \to +\infty} a_0 x^n$;

 $\Gamma) \lim_{x \to -\infty} P(x) = \lim_{x \to -\infty} a_0 x^n.$

Примеры

- 1. $\lim_{x \to -1} (3x^3 4x + 2) = 3 \cdot (-1)^3 4 \cdot (-1) + 2 = 3$.
- 2. $\lim_{x \to \infty} (-3x^2 + 5x 2) = \lim_{x \to \infty} (-3x^2) = -\infty$.
- 3. $\lim_{x \to \infty} (-2x^5 + 100x^4 3) = \lim_{x \to \infty} (-2x^5) = +\infty$.

IV. Рациональная функция

Пусть P и Q – функции-многочлены с действительными коэффициентами:

 $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n \text{ if } Q(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \ldots + b_m, \ a_0 \neq 0, \ b_0 \neq 0, \ m, \ n \in \mathbb{N}^*.$

Функция $\frac{P}{Q}$: $E \to \mathbb{R}$, где $E = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$, называется рациональной функцией.

a)
$$\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}, \ \forall x_0 \in E;$$

б)
$$\lim_{x \to \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{a_0 x^n}{b_0 x^m} = \begin{cases} \infty, \text{ если } n > m, \\ \frac{a_0}{b_0}, \text{ если } n = m, \\ 0, \text{ если } n < m. \end{cases}$$

Если $x \to +\infty$ или $x \to -\infty$, то в б) следует указать и знак выражения $\frac{a_0}{h} \lim_{x \to +\infty} x^{n-m}$. Случай $Q(x_0) = 0$ будет рассмотрен в §4.

Примеры

1.
$$\lim_{x \to 2} \frac{2x^3 - 4x^2 + 3}{-x^2 + 6x - 2} = \frac{2 \cdot 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 3}{-2^2 + 6 \cdot 2 - 2} = \frac{1}{2}$$
.


2.
$$\lim_{x \to \infty} \frac{-2x^5 + 3x + 1}{4x^2 - x + 2} = \lim_{x \to \infty} \frac{-2x^5}{4x^2} = \lim_{x \to \infty} \left(-\frac{1}{2}x^3 \right) = +\infty.$$

V. Функция радикал

1 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), f(x) = \sqrt[n]{x}, n \in \mathbb{N}, n \ge 2, n$ - четное (рис. 2.8)

a)
$$\lim_{x \to x_0} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x_0}, \ x_0 \in [0, +\infty);$$

б) $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$, n – четное число.



2 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt[n]{x}, \ n \in \mathbb{N}, \ n \ge 3, \ n$ — нечетное число (рис. 2.9)

a)
$$\lim_{x \to x_0} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x_0}, \ x_0 \in \mathbb{R}$$

- а) $\lim_{x \to x_0} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{x_0}$, $x_0 \in \mathbb{R}$; б) $\lim_{x \to x_0} \sqrt[n]{x} = \infty$, если n нечетное число;
- в) $\lim_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$, если n нечетное число;
- г) $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{x} = -\infty$, если n нечетное число.





Рис. 2.9

VI. Показательная функция

$$f: \mathbb{R} \to (0, +\infty), f(x) = a^x, a > 0, a \neq 1 \text{ (рис. 2.10)}$$



- 6) если a > 1, то: $\lim_{x \to +\infty} a^x = +\infty$, $\lim_{x \to -\infty} a^x = 0$;
- в) если 0 < a < 1, то: $\lim_{x \to +\infty} a^x = 0$, $\lim_{x \to -\infty} a^x = +\infty$;
- Γ) не существует $\lim_{x\to a} a^x$.




Рис. 2.10

VII. Логарифмическая функция

$$f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = \log_a x, a > 0, a \ne 1$$
 (рис. 2.11)

- a) $\lim_{x \to x_0} \log_a x = \log_a x_0, x_0 > 0;$
- б) если a > 1, то: $\lim_{x \to +0} \log_a x = -\infty$, $\lim_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$;
- в) если 0 < a < 1, то: $\lim_{x \to +0} \log_a x = +\infty$, $\lim_{x \to +\infty} \log_a x = -\infty$.




Рис. 2.11

VIII. Степенная функция с действительным показателем

$$f: (0, +\infty) \to (0, +\infty), \quad f(x) = x^{\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ (рис. 2.12)}$$

- a) $\lim_{x \to x_0} x^{\alpha} = x_0^{\alpha}, x_0 > 0;$
- $6) \alpha > 0 \Rightarrow \lim_{x \to +0} x^{\alpha} = 0, \lim_{x \to +\infty} x^{\alpha} = +\infty;$
- B) $\alpha < 0 \Rightarrow \lim_{x \to +\infty} x^{\alpha} = 0$, $\lim_{x \to +0} x^{\alpha} = +\infty$.




Рис. 2.12

IX. Тригонометрические функции

- **1** Функция синус $f: \mathbb{R} \to [-1, 1], f(x) = \sin x$ (рис. 2.13)
- a) $\lim_{x \to x_0} \sin x = \sin x_0, \ x_0 \in \mathbb{R};$
- б) не существует $\limsup_{x\to\infty} x$, $\limsup_{x\to +\infty} x$, $\limsup_{x\to -\infty} x$.




Рис. 2.13

- **2** Функция косинус $f: \mathbb{R} \to [-1, 1], f(x) = \cos x$ (рис. 2.14)
- a) $\lim_{x \to x_0} \cos x = \cos x_0, \quad x_0 \in \mathbb{R};$
- б) не существует $\lim_{x\to\infty} \cos x$, $\lim_{x\to+\infty} \cos x$, $\lim_{x\to-\infty} \cos x$.






Рис. 2.14

3 Функция тангенс

$$f: \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \operatorname{tg} x \text{ (рис. 2.15)}$$



6)
$$\lim_{x \to \alpha_k = 0} \operatorname{tg} x = +\infty$$
, $\lim_{x \to \alpha_k + 0} \operatorname{tg} x = -\infty$, $k \in \mathbb{Z}$.



4 Функция котангенс

$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \operatorname{ctg} x \text{ (puc. 2.16)}$$

a)
$$\lim_{x \to x_0} \operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} x_0$$
, $x_0 \neq \beta_k = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$;

6)
$$\lim_{x \to \beta_k - 0} \operatorname{ctg} x = -\infty, \quad \lim_{x \to \beta_k + 0} \operatorname{ctg} x = +\infty, \quad k \in \mathbb{Z}.$$




Рис. 2.16

Х. Обратные тригонометрические функции

1 Функция арксинус

$$f: [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right], f(x) = \arcsin x \text{ (рис. 2.17)}$$

 $\lim_{x \to x_0} \arcsin x = \arcsin x_0, \ x_0 \in [-1, 1].$




Рис. 2.17

2 Функция арккосинус

$$f: [-1, 1] \to [0, \pi], f(x) = \arccos x \text{ (рис. 2.18)}$$

 $\lim_{x \to x_0} \arccos x = \arccos x_0, \quad x_0 \in [-1, 1].$





Рис. 2.18

6 Функция арктангенс

$$f: \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), f(x) = \operatorname{arctg} x \quad (\text{puc. 2.19})$$



6)
$$\lim_{x \to +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$
, $\lim_{x \to -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$;

в) не существует $\limsup_{x \to \infty} x$.




Рис. 2.19

4 Функция арккотангенс

$$f: \mathbb{R} \to (0, \pi), f(x) = \operatorname{arcctg} x$$
 (рис. 2.20)

- a) $\lim_{x \to x_0} \operatorname{arcctg} x = \operatorname{arcctg} x_0, x_0 \in \mathbb{R};$
- 6) $\lim_{x \to +\infty} \operatorname{arcctg} x = 0$, $\lim_{x \to -\infty} \operatorname{arcctg} x = \pi$;
- в) не существует $\lim_{x\to\infty}$ arcctg x.




Рис. 2.20

XI. Функция модуль (абсолютная величина)

$$f: \mathbb{R} \to [0, +\infty), \ f(x) = |x| \ (\text{puc. } 2.21)$$

a)
$$\lim_{x \to x_0} |x| = |x_0|, x_0 \in \mathbb{R};$$

6)
$$\lim_{x \to +\infty} |x| = +\infty$$
, $\lim_{x \to +\infty} |x| = +\infty$, $\lim_{x \to +\infty} |x| = +\infty$.




Рис. 2.21

Простейший класс функций, который изучается в математическом анализе — это множество элементарных функций I–XI. Функции, которые получаются из элементарных функций посредством последовательного выполнения конечного числа алгебраических операций и операции композиции, иногда также называются элементарными функциями. Из результатов этого параграфа делаем вывод, что для элементарных функций $f \colon D \to \mathbb{R}$ ($D \subseteq \mathbb{R}$, где D — максимальная область определения функции) верно соотношение $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$, $x_0 \in D$, то есть предел функции в точке равен значению функции в этой точке.

Примеры

- **1.** а) Функция, заданная формулой $f(x) = \sqrt{x} + 2^x 3\log_2 x$, элементарная, значит, $\lim_{x \to \infty} (\sqrt{x} + 2^x 3\log_2 x) = f(4) = \sqrt{4} + 2^4 3\log_2 4 = 12$.
 - б) Аналогично,

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{6}} \left(\ln(\sin x) + 3\ln\left(\frac{5}{4} + \cos^2 x\right) \right) = \ln\left(\sin\frac{\pi}{6}\right) + 3\ln\left(\frac{5}{4} + \cos^2\frac{\pi}{6}\right) = \ln\frac{1}{2} + 3\ln 2 = 2\ln 2.$$

2.
$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^3} = \infty$$
; $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x = 0$; $\lim_{x \to +\infty} \ln x = -\infty$; $\lim_{x \to +\infty} \sqrt[3]{x} = \infty$; $\lim_{x \to +\infty} x^{-\frac{1}{3}} = 0$; $\lim_{x \to +\infty} \cot g x = +\infty$ etc.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

A_1 1. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to 4} \left(-\frac{1}{8}x^3 + \sqrt{x} + 5 \right)$$
; 6) $\lim_{x \to \infty} \left(x^4 + \frac{1}{x} + \sqrt[3]{x^2} \right)$; B) $\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt[4]{x} - \frac{2}{x^2} + x^3 \right)$; F) $\lim_{x \to -\infty} \left(-2x^2 + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \sqrt[3]{x} \right)$; $\lim_{x \to 0} \left(\sqrt[5]{x^3} + \frac{1}{x^2} - 3x^2 \right)$; e) $\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{x} + 3 + x^3 + \sqrt[3]{x} \right)$.

2. Вычислите предел:

a)
$$\lim(3x^2 + x - 10)$$
;

5)
$$\lim (2x^3 + 5x^2 + 3)$$
;

B)
$$\lim_{x \to 0} (2x^4 + 3x^3 + 1)$$

$$\Gamma$$
) $\lim_{x \to \infty} (-5x^3 + 100x^2)$

a)
$$\lim_{x \to 2} (3x^2 + x - 10);$$
 6) $\lim_{x \to \infty} (2x^3 + 5x^2 + 3);$ B) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ c) $\lim_{x \to \infty} (-5x^3 + 100);$ d) $\lim_{x \to \infty} (-5x^3 + 100);$ d) $\lim_{x \to \infty} (2x^3 + 5x^2 + 3);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ for $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ e) $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^3 + 100);$ for $\lim_{x \to \infty} (2x^4 + 3x^4 + 100);$ for $\lim_{x \to \infty} (2$

e)
$$\lim_{x\to 0} \frac{2x^3 - x^2 + 3}{5x^4 - x^3 - 1}$$

3. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to 2} (2^x + \log_{0.25} x - (\sqrt{3})^x)$$
; 6) $\lim_{x \to \log_2 e} (2^x - 2 \cdot 4^x + 8^x)$; B) $\lim_{x \to 2^e} (\log_2 x + \log_4 x - e)$.

6)
$$\lim_{x \to 0} (2^x - 2 \cdot 4^x + 8^x);$$

B)
$$\lim(\log_2 x + \log_4 x - e)$$

4. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to -\infty} (-\sqrt[4]{x^4 + 1});$$

6)
$$\lim (x^4 - x^3 + 1)(1 - x^2)$$

B)
$$\lim_{x \to \infty} (x^6 - x^3)(x^3 - x + 1)$$

а) $\lim_{x \to \infty} (-\sqrt[4]{x^4 + 1});$ б) $\lim_{x \to +\infty} (x^4 - x^3 + 1)(1 - x^2);$ в) $\lim_{x \to -\infty} (x^6 - x^3)(x^3 - x + 1).$ 5. Вычислите предел: а) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} (\sin x + \sqrt{3}\cos x - \sqrt{3}\operatorname{tg} x);$ б) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} (\sin x + 2\operatorname{ctg} x - \cos x).$

В₁ **6.** Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to \infty} \frac{2x^3 + x - 3}{x^2 - 5x^3}$$

6)
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x - x^3}{2x^4 + 3}$$
;

a)
$$\lim_{x \to \infty} \frac{2x^3 + x - 3}{x^2 - 5x^3}$$
; 6) $\lim_{x \to +\infty} \frac{x - x^3}{2x^4 + 3}$; b) $\lim_{x \to -\infty} \frac{3x^3 - 2x^2 + 4}{1 + x - x^2}$.

7. Вычислите предел:

a)
$$\lim(\pi^x + \log_3 x)$$
;

a)
$$\lim_{x \to +0} (\pi^x + \log_3 x);$$
 6) $\lim_{x \to +0} (\log_{0,5} x - 2^x);$ B) $\lim_{x \to +\infty} (e^x + \lg x).$

B)
$$\lim (e^x + \lg x)$$

$$6) \lim_{x \to +\infty} \frac{2x+1}{|x+1|}$$

B)
$$\lim_{x\to\infty}\frac{|x-1|}{3x-1}$$

9. При Работайте в парах! Вычислите предел:
а) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2} + n\pi} (\sin x + 2\cos x - 3\cot x), \ n \in \mathbb{Z};$ б) $\lim_{x \to n\pi} (2\sin x - 3\cos x + \tan x), \ n \in \mathbb{Z}.$

a)
$$\lim_{x \to \pi} (\sin x + 2\cos x - 3\cot x), n \in \mathbb{Z}$$
;

6)
$$\lim_{x \to n\pi} (2\sin x - 3\cos x + \operatorname{tg} x), n \in \mathbb{Z}$$

10. Работайте в парах! Заполните пропуски, чтобы получить истинное выскаa) $\lim_{x \to \infty} \sin(2^x) = \limsup_{v \to \infty} y = 0$, где $y = 2^x$;

б)
$$\lim_{x \to 1} \operatorname{tg}(\pi^x + \ln x) = \lim_{x \to 1} \operatorname{tg} y = ...$$
, где $y = ...$

 \mathbb{C}_1 11. Вычислите в указанной точке x_0 односторонние пределы функции $f \colon D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \frac{1}{\ln|x|}$$
, $x_0 \in \{-1, 0, 1\}$;
 6) $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2 - 1}}$, $x_0 \in \{-1, 1\}$;

6)
$$f(x) = e^{-\frac{1}{x^2 - 1}}$$
 $x_0 \in \{-1, 1\}$

B)
$$f(x) = \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x+1}}}, x_0 = -1.$$

12. *Исследуйте!* Определите, истинно ли высказывание: а) $\exists \lim \cos(1-2x);$ б) $\exists \lim \sin x^2;$ в) \exists

a)
$$\exists \lim \cos(1-2x)$$
;

б)
$$\exists \lim \sin x^2$$
;

B)
$$\mathbb{E}\lim_{x\to+\infty}(\sin x - \cos x)$$
,

где символ \mathbb{Z} обозначает "не существует".

13. $f \in \mathbb{R}$ функция $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 3\sqrt{x^2 + m^2} - 2, \text{ если } x < 0, \\ m + 2, \text{ если } x = 0, \\ (m^2 e^x) : \left(1 + 2^{-\frac{1}{x}}\right), \text{ если } x > 0, \end{cases}$$
 имеет в точке $x_0 = 0$ предел, равный $f(0)$?

14. Найдите значения параметра $m \in \mathbb{R}$, при которых функция $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{m^2 x^2 - 6mx + 9 \cdot 2^{1-x}}, & \text{если } x < 1, \\ 4 - \sqrt{m^2 x^2 + 2mx + 3^{x-1}}, & \text{если } x \ge 1, \end{cases}$$
 имеет предел в точке $x_0 = 1$.

- 15. Используя понятие одностороннего предела и теорему о пределе сложной функции, вычислите предел:

 - a) $\lim_{x \to \frac{\pi}{6}} \cos(1 2\sin x)$; 6) $\lim_{x \to 0} \ln(\sin^2 x)$; B) $\lim_{x \to 0} e^{\frac{1}{x^2 x^4}}$; r) $\lim_{x \to \infty} \sqrt[3]{3^x \ln x^2 + x^3}$; $\lim_{x \to \pi} \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}\sin\frac{x}{2}\right)$; e) $\lim_{x \to 0} \operatorname{tg}^3(\pi\cos x)$; ж) $\lim_{x \to 0} \frac{2^{\sin x}}{\ln(\cos x)}$; 3) $\lim_{x \to 1} \ln\left(\frac{\pi}{2} \arcsin x\right)$.

§3 Вычисление пределов функций

3.1. Свойства пределов функций

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}, \ f, g: E \to \mathbb{R}$ — две функции и $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества E. Следующие утверждения выражают свойства пределов функций или достаточные условия существования предела функции в точке и могут быть выведены при помощи определения предела функции в точке.

- 1° Если $\lim f(x) = a$, $a \in \mathbb{R}$, то существует окрестность $V(x_0)$ точки x_0 такая, что функция f ограничена на множестве $V(x_0) \cap E$.
- **2°** Если $\lim_{x \to x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = b$, $a, b \in \mathbb{R}$, и a < b (соответственно a > b), то существует окрестность $V(x_0)$ точки x_0 такая, что f(x) < g(x) (соответственно f(x) > g(x)) для любого $x \in V(x_0) \cap E \setminus \{x_0\}$.

Следствие. В свойстве 2° , если $g(x) = \lambda$ ($\forall x \in E, \lambda \in \mathbb{R}$), то существует окрестность $V(x_0)$ точки x_0 такая, что $f(x) < \lambda$ (соответственно $f(x) > \lambda$) для любого $x \in V(x_0) \cap E \setminus \{x_0\}.$

При $\lambda = 0$ получим, что f(x) < 0 (соответственно f(x) > 0) для любого $x \in V(x_0) \cap E \setminus \{x_0\}.$

- 3° Переход к пределу в неравенствах. Если
- a) существуют пределы $\lim f(x)$ и $\lim g(x)$,
- б) $f(x) \le g(x)$ для любого $x \in E$ или в некоторой окрестности точки x_0 из E, To $\lim f(x) \le \lim g(x)$.

Следствие. В свойстве 3°, если $\lim_{x\to x_0} g(x) = -\infty$, то $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$, а если $\lim f(x) = +\infty$, to $\lim g(x) = +\infty$.

- **4° Признак "зажима".** Пусть функции $f, g, h: E \to \mathbb{R}$ удовлетворяют условиям:
- a) $\lim f(x) = \lim g(x) = a, \ a \in \mathbb{R},$
- б) $f(x) \le h(x) \le g(x)$ для любого $x \in E$ или в некоторой окрестности точки x_0 из E. Тогда $\lim h(x) = a$.

Задание с решением

Вычислим:

a) $\lim (x - \sin x)$; 6) $\lim (\sin x^2 - e^{-x})$.

Решение:

а) Для любого $x \in \mathbb{R}$ верно двойное неравенство: $-1 \le -\sin x \le 1$.

Тогда $x - \sin x \ge x - 1$ (1). Поскольку $\lim_{x \to \infty} (x - 1) = +\infty$, в силу следствия свойства 3° и неравенства (1) следует, что $\lim (x - \sin x) = +\infty$.

б) Так как $\sin x^2 - e^{-x} \le 1 - e^{-x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, и $\lim_{x \to \infty} (1 - e^{-x}) = -\infty$, в силу следствия свойства 3° следует, что $\lim (\sin x^2 - e^{-x}) = -\infty$.

3.2. Замечательные пределы

Следующие пределы применяются при вычислении пределов функций и называются замечательными пределами:


$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2 a)
$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$
, 6) $\lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

Лемма. Двойное неравенство $|\sin x| \le |x| \le |\tan x|$ верно при $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$.

Доказательство

Пусть $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Рассмотрим окружность радиуса 1 и центральный угол АОС, радианная мера которого равна x (рис. 2.22). Обозначим через B точку пересечения касательной к окружности в точке A с полупрямой OC, а через D – основание перпендикуляра, опущенного из точки C на прямую OA. Очевидно, что площадь треугольника АОС меньше площади сектора AOC, которая, в свою очередь, меньше площади треугольника AOB, то есть



$$\frac{1}{2}AO \cdot DC \le \frac{1}{2}AO^2 \cdot x \le \frac{1}{2}AO \cdot AB. \tag{2}$$

Учитывая, что AO = 1, $DC = \sin x$, $AB = \operatorname{tg} x$, из (2) получим двойное неравенство

$$\sin x \le x \le \operatorname{tg} x, \text{ где } 0 \le x < \frac{\pi}{2}. \tag{3}$$

Если $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, то $0 < -x < \frac{\pi}{2}$. Из (3) следует, что $\sin(-x) \le -x \le \operatorname{tg}(-x)$, то есть

$$-\sin x \le -x \le -\text{tg } x$$
, где $-\frac{\pi}{2} < x < 0$. (4)

Неравенства (3) и (4), на основании определения абсолютной величины, равносильны двойному неравенству, указанному в лемме.

Рассмотрим доказательства замечательных пределов 0 и 2.

- **1.** Если $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{0\}$, то $\sin x \neq 0$, и так как $x \neq 0$, из двойного неравенства, указанного в лемме, при делении на $|\sin x|$, получим: $1 < \left|\frac{x}{\sin x}\right| < \left|\frac{1}{\cos x}\right| \Leftrightarrow |\cos x| < \left|\frac{\sin x}{x}\right| < 1$. Но $|\cos x| = \cos x$, а x и $\sin x$ числа одного и того же знака при $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Следовательно, $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$, если $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{0\}$. Так как $\lim_{x \to 0} \cos x = \cos 0 = 1$, из последнего двойного неравенства, согласно признаку "зажима", следует, что $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
 - 2. Доказательство замечательного предела 2 дано лишь схематически.
- а) Применив соотношение $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$ (см. модуль 1, §3, пункт 3.3), можно доказать, что для любой последовательности $(x_n)_{n\ge 1}, \ x_n\in (-\infty,-1)\cup (0,+\infty)$, предел которой $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$, верно соотношение $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e$. В этом случае из определения предела функции в точке по Гейне следует, что $\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$.

Случай б) следует из случая а) и высказывания 6 о пределе сложной функции, если в а) выполнить подстановку $u = \frac{1}{r}$ и $u \to 0$ при $x \to \infty$.

Задания с решением

🔖 1. Покажем, что:

Решение

Применим соответствующие соотношения для пределов элементарных функций, замечательные пределы **1**, **2** и высказывание **6** о пределе сложной функции.

a)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$$
.

б) Выполнив замену переменной $u = a^x - 1$, получим $x = \log_a(1+u)$ и $u \to 0$ при $x \to 0$. Таким образом (см. пример а)), получим:

$$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{u \to 0} \frac{u}{\log_a (1 + u)} = \lim_{u \to 0} \frac{1}{\log_a (1 + u)^{\frac{1}{u}}} = \frac{1}{\log_a e} = \ln a.$$

B)
$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha \ln(1+x)}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \left[\frac{e^{\alpha \ln(1+x)}-1}{\alpha \ln(1+x)} \cdot \alpha \cdot \frac{\ln(1+x)}{x} \right] =$$

$$=\alpha\lim_{u\to 0}\frac{e^u-1}{u}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\alpha\ln e\cdot 1=\alpha, \text{ где } u=\alpha\ln(1+x)\text{ и } u\to 0\text{ при } x\to 0.$$

r)
$$\lim_{x \to 0} \frac{\lg x}{x} = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot \frac{1}{\cos 0} = 1.$$

д)
$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\lim_{u \to 0} \frac{\sin u}{u} \right)^2 = \frac{1}{2}, \quad \text{где } u = \frac{x}{2} \to 0$$

при $x \to 0$.

e)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{u\to 0} \frac{u}{\sin u} = \lim_{u\to 0} \left(\frac{\sin u}{u}\right)^{-1} = 1$$
, где $u = \arcsin x$ и $u\to 0$ при $x\to 0$.

ж)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{u\to 0} \frac{u}{\operatorname{tg} u} = \lim_{u\to 0} \left(\frac{\operatorname{tg} u}{u}\right)^{-1} = 1$$
, где $u = \operatorname{arctg} x$ и $u\to 0$ при $x\to 0$.

Замечание. Замечательные пределы **1** и **2**, а также все пределы, приведенные в задании с решением **1**, в силу высказывания **6** о пределе сложной функции, верны и в том случае, когда выполняется замена переменной x = u(t), где $\lim_{t \to t_0} u(t) = 0$ (за исключением замечательного предела **2** а), где $\lim_{t \to t_0} u(t) = \infty$).

🔖 2. Вычислим предел:

a)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x - \lg 5x}{\sin 4x}$$
;

$$6) \lim_{x \to 0} \frac{e^{3\sin^2 2x} - 1}{x^2};$$

B)
$$\lim_{x\to 0} \frac{2^{3x^2}-3^{2x^2}}{\cos x-\cos 2x}$$
.

Решение:

На основании замечательного предела **1**, примеров задания с решением **1** и предыдущего замечания, получаем:

a)
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x - \tan 5x}{\sin 4x} = \lim_{x \to 0} \frac{3 \frac{\sin 3x}{3x} - 5 \frac{\tan 5x}{5x}}{4 \frac{\sin 4x}{4x}} = \frac{3 \cdot 1 - 5 \cdot 1}{4 \cdot 1} = -\frac{1}{2};$$

6)
$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{3\sin^2 2x} - 1}{x^2} = 12 \lim_{x \to 0} \left[\frac{e^{3\sin^2 2x} - 1}{3\sin^2 2x} \cdot \left(\frac{\sin 2x}{2x} \right)^2 \right] = 12 \ln e \cdot 1^2 = 12;$$

B)
$$\lim_{x \to 0} \frac{2^{3x^2} - 3^{2x^2}}{\cos x - \cos 2x} = \lim_{x \to 0} \frac{(2^{3x^2} - 1) - (3^{2x^2} - 1)}{(1 - \cos 2x) - (1 - \cos x)} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{3 \cdot \frac{2^{3x^2} - 1}{3x^2} - 2 \cdot \frac{3^{2x^2} - 1}{2x^2}}{4 \cdot \frac{1 - \cos 2x}{(2x)^2} - \frac{1 - \cos x}{x^2}} = \frac{3 \ln 2 - 2 \ln 3}{4 \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \ln \frac{8}{9}.$$

🦴 3. Вычислим предел:

a)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\cos 3x)}{2x^2 + x^3}$$
;

6)
$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{5+3x}-2}{x^2+2x-3}$$
.

Решение:

a)
$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(\cos 3x)}{2x^2 + x^3} = \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + (\cos 3x - 1))}{2x^2 + x^3} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \left[\frac{\ln(1 + (\cos 3x - 1))}{\cos 3x - 1} \cdot \frac{\cos 3x - 1}{(3x)^2} \cdot \frac{9}{2 + x} \right] = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{9}{2 + 0} = -\frac{9}{4};$$

б) Выполняем замену переменной: u = x - 1. Тогда $u \to 0$ при $x \to 1$ и

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{5+3x}-2}{x^2+2x-3} = \lim_{u \to 0} \frac{\sqrt[3]{5+3(1+u)}-2}{(1+u)^2+2(1+u)-3} = \lim_{u \to 0} \frac{\sqrt[3]{8+3u}-2}{u^2+4u} =$$

$$=2\lim_{u\to 0}\left[\frac{\left(1+\frac{3}{8}u\right)^{\frac{1}{3}}-1}{\frac{3}{8}u}\cdot\frac{\frac{3}{8}}{u+4}\right]=2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{\frac{3}{8}}{4}=\frac{1}{16}.$$

🦫 4. Вычислим предел:

a)
$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{2x-1}{2x+3}\right)^{1-x}$$
;

6)
$$\lim_{x\to 0} \left(1 + \sin\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$$
.

Решение:

Воспользуемся замечательными пределами 2 а) и 2 б).

a)
$$\lim_{x \to \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+3} \right)^{1-x} = \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{2x-1}{2x+3} - 1 \right)^{1-x} = \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{-4}{2x+3} \right)^{1-x}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2x+3} \right)^{\frac{2x+3}{-4}} \right]^{\frac{-4}{2x+3}(1-x)} = \left[\lim_{u \to \infty} \left(1 + \frac{1}{u} \right)^{u} \right]^{\lim_{x \to \infty} \frac{4(x-1)}{2x+3}} = e^{\lim_{x \to \infty} \frac{4\left(1 - \frac{1}{x}\right)}{2 + \frac{3}{x}}} = e^{2},$$

где $u = \frac{2x+3}{-4}$ и $u \to \infty$ при $x \to \infty$;

$$6) \quad \lim_{x \to 0} \left(1 + \sin \frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \to 0} \left[\left(1 + \sin \frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{\sin \frac{x}{2}}} \right]^{\frac{\sin \frac{x}{2}}{x}} = \left[\lim_{u \to 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} \right]^{\frac{1}{x \to 0}}^{\frac{1}{2} - \frac{\sin \frac{x}{2}}{2}} = e^{\frac{1}{2} \cdot 1} = \sqrt{e}, \quad \text{где}$$

 $u = \sin \frac{x}{2}$ и $u \to 0$ при $x \to 0$.

${f y}$ пражнения и задачи

Реальный профиль

A_1 1. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to \infty} \frac{(3x-1)(2x+1)-3}{(x-3)(x+2)+x^2}$$
;

$$6) \lim_{x \to \infty} \frac{(1+2x)(1+3x)}{(1+x)(1-2x)};$$

B)
$$\lim_{x \to -\infty} \sqrt{\frac{9x^2 + 1}{16x^2 + 1}}$$
;

$$\Gamma) \lim_{x \to 0} \frac{(1+2x)(1+3x)-1}{10x+x^2}; \qquad \text{д) } \lim_{x \to 0} \frac{(1-x)(1-3x)-1}{(1-5x)(1+7x)-1}; \qquad \text{e) } \lim_{x \to 1} \frac{(2+x)^2-9}{(3+x)^2-16}.$$

$$\mu$$
 $\lim_{x\to 0} \frac{(1-x)(1-3x)-1}{(1-5x)(1+7x)-1}$

e)
$$\lim_{x \to 1} \frac{(2+x)^2 - 9}{(3+x)^2 - 16}$$

2. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin 4x}{\sin 3x}$$
;

$$6) \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x + \sin 3x}{\sin 4x}$$

$$\Gamma$$
) $\lim_{x\to 2} \frac{\sin 2(x-2)}{x-2}$;

$$\pi \lim_{x \to 0} \frac{\sin(3x + x^2)}{x}$$

e)
$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 - 2\sin x}{x + 3\sin x}$$
;

ж)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(\pi + 3x)}{\sin(2\pi - 6x)}$$
;

3*)
$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x} + e^{3x} + e^{4x} - 3}{\operatorname{tg} x + \sin 2x}$$
; u^*) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 + x + x^2)}{e^{5x} - e^{3x}}$.

$$\mathbf{u}^*) \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x+x^2)}{e^{5x}-e^{3x}}$$

В₁ 3. Вычислите предел

a)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}}{\sqrt[3]{1+2x+x^3}-1};$$
 6) $\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{1+4x}-3}{\sqrt[3]{2+3x-2}};$ B) $\lim_{x\to \infty} \left(1+\frac{1}{2x}\right)^x;$

$$6) \lim_{x \to 2} \frac{\sqrt{1+4x}-3}{\sqrt[3]{2+3x}-2};$$

$$B) \lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{2x}\right)^x;$$

$$\Gamma) \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+1}{x}\right)^{2x};$$

д)
$$\lim_{x\to 0} (1+3x)^{\frac{1}{x}}$$
;

e)
$$\lim_{x\to 0} (1-x)^{\frac{1}{x}}$$
.

4. Вычислите предел:

$$a^*$$
) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\sin 4x)}{\ln(1+ \log 2x)}$;

$$6^*$$
) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x}{\sin^2 x}$;

r)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+\sin 2x} - \sqrt{1-\sin 3x}}{\tan x - \sin 4x}$$
;

$$e^*$$
) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\cos 3x)}{\ln(e^{x^2} + \sin^2 x)}$.

C_1 5. Вычислите предел:

$$a^*) \lim_{x\to 0} \frac{\arcsin 2x}{\sin(3x+\sin x)};$$

$$B^*) \lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin 3x}}{\sin(\sin(\sin x))}$$

$$\mathbb{Z}^*$$
) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x \cos 2x}{e^{\sin x^2} - \cos 2x}$;

$$6^*) \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{\cos 2x - e^{x^2}};$$

$$\Gamma^*) \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{\cos 2x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\operatorname{arctg} x^2};$$

e)
$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt[3]{1+7x}}{1+\sqrt[5]{1-2x}}$$

6. Применив свойства пределов функций, вычислите:

a)
$$\lim_{x \to \infty} (x^2 - \cos x^2)$$
;

6)
$$\lim (x + \sin 2x - \cos 3x)$$
;

B)
$$\lim (\sin x - 2^x)$$
;

$$\Gamma) \lim (2 + \sin x)e^x.$$

7. $\ \stackrel{\frown}{\mathbb{Q}} \ \stackrel{\frown}{\mathbb{P}} \$ Работайте в парах! Найдите $m,n\in\mathbb{R},$ если:

a)
$$\lim_{x \to \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} + mx + n \right) = 3;$$

б)
$$\lim_{x \to 1} \frac{\sin(mx+n)}{x-1} = 2$$
, где $m+n = \pi$.

§4 Неопределенности в операциях над пределами функций

В §2 утверждалось, что некоторые операции над пределами функций не имеют смысла. Рассмотрим более подробно одну из этих операций.

Пусть x_0 – предельная точка множества $E \subseteq \mathbb{R}$, $f,g: E \to \mathbb{R}$ – две функции, для которых существуют конечные или бесконечные пределы $a = \lim_{x \to x_0} f(x)$ и $b = \lim_{x \to x_0} g(x)$. Например, из соответствующих определений предела функции в точке следует, что:

если
$$a=\infty, b\in\mathbb{R}$$
, то $\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=\infty;$ если $a=+\infty, b=+\infty,$ то $\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=+\infty$ и т. д.

При помощи символов эти высказывания записываются так: $\infty + b = \infty$ ($b \in \mathbb{R}$), $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$ и называются *определенностиями*, а про сумму a + b в этом случае говорят, что она имеет смысл. Полная таблица *определенностей*, к которым могут привести операции над пределами функций, представлена в пункте 2.1.

Если же $a=+\infty$, $b=-\infty$ или $a=-\infty$, $b=+\infty$, то про предел функции f+g в точке x_0 нельзя ничего утверждать. В самом деле, если $x\to+\infty$, то:

a)
$$f(x) = x^2 \to +\infty$$
, $g(x) = -x \to -\infty$ if $f(x) + g(x) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right) \to +\infty$;

б)
$$f(x) = x + \frac{1}{x} \to +\infty$$
, $g(x) = -x \to -\infty$ и $f(x) + g(x) = \frac{1}{x} \to 0$;

B)
$$f(x) = x + l \rightarrow +\infty$$
, $g(x) = -x \rightarrow -\infty$ If $f(x) + g(x) = l \rightarrow l$, $l \in \mathbb{R}$;

г)
$$f(x) = x + \sin x \to +\infty$$
, $g(x) = -x \to -\infty$ и $f(x) + g(x) = \sin x$ не имеет предела.

Таким образом, предел $\lim_{x\to x_0} (f(x)+g(x))$ зависит от самой природы функций f и g и может быть бесконечным, нулем, любым действительным числом, а также может и не существовать. В этом случае говорят, что рассмотренный предел представляет собой неопределенность вида $\infty - \infty$, а про сумму a+b говорят, что не имеет смысла.

Итак, операции a+b, $a\cdot b$, $\frac{a}{b}$ и a^b с пределами функций $a=\lim_{x\to x_0}f(x)$, $b=\lim_{x\to x_0}g(x)$ приводят к следующим семи случаям:

$$\frac{0}{0}$$
, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^{∞} , 0^{0} , ∞^{0}

Не существует четкого правила, позволяющего избавиться от неопределенности. Но есть некоторые рекомендации, позволяющие раскрывать эти неопределенности.

I. Неопределенность вида
$$\frac{0}{0}$$
. Пусть $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, где $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = 0$.

Рекомендуется разложить, если возможно, на множители f(x) и g(x), умножить и числитель и знаменатель отношения $\frac{f(x)}{g(x)}$ на сопряженное, сократив затем на $x-x_0$, или применить замечательный предел $\mathbf{0}$ или пределы из задания с решением $\mathbf{1}$, пункта 3.2.

1.
$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 + x - 2}{3x^2 - 2x - 1} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 1} \frac{(x - 1)(x + 2)}{(x - 1)(3x + 1)} = \lim_{x \to 1} \frac{x + 2}{3x + 1} = \frac{3}{4}$$

(Сокращение на x-1 было возможным, так как $x \to 1$, но $x \ne 1$.)

2.
$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + \sin(2x + x^6))}{4x - x^2} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + \sin(2x + x^6))}{\sin(2x + x^6)} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x + x^6)}{4x - x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x + x^6)}{4x - x^6} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x + x^6)}{4x - x^6} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x + x^6)}{4x - x^6} = \lim_{x \to 0} \frac{$$

$$=1 \cdot \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x+x^6)}{4x-x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x+x^6)}{2x+x^6} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{2x+x^6}{4x-x^2} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x(2+x^5)}{x(4-x)} = \lim_{x \to 0} \frac{2+x^5}{4-x} = \frac{1}{2}.$$

Аналогично примеру 1 поступают с пределом $\lim_{x\to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)}$, где P и Q – многочлены.

Пусть $P, Q: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ – ненулевые многочлены.

а) Если $P(x_0) = Q(x_0) = 0$, то найдутся многочлены $P_1, Q_1: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и числа $i, j \in \mathbb{N}^*$ такие, что $P_1(x_0) \neq 0$, $Q_1(x_0) \neq 0$, $P(x) = (x - x_0)^i P_1(x)$,

$$Q(x) = (x - x_0)^{j} Q_1(x) \text{ if } \lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P_1(x_0)}{Q_1(x_0)} \cdot \lim_{x \to x_0} \frac{1}{(x - x_0)^{j-i}}.$$

б) Если
$$P(x_0) \neq 0$$
, а $Q(x_0) = 0$, то $\lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q_1(x_0)} \cdot \lim_{x \to x_0} \frac{1}{(x - x_0)^j} = \infty$.

II. Неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$ встречается при вычислении предела $\lim_{x\to \infty} \frac{f(x)}{\sigma(x)}$ где $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = \infty$.

Рекомендуется выделить, если это возможно, в числителе и знаменателе отношения $\frac{f(x)}{g(x)}$ функции (члены), дающие наибольший рост на бесконечности, так называемые функции доминанты; вынести за скобки эти функции как общий множитель и эквивалентно преобразовать полученные выражения, применив, если это необходимо, замечательные пределы или пределы из задания с решением 1, пункта 3.2.

Пример

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2^{x} + 3^{x+1}}{4^{x+1} + 2^{x+2}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{3^{x} \left[\left(\frac{2}{3}\right)^{x} + 3\right]}{4^{x+1} \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{x}\right]} = \frac{1}{4} \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x} \cdot \lim_{x \to +\infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{x} + 3}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{x}} = \frac{1}{4} \cdot 0 \cdot \frac{0 + 3}{1 + 0} = 0,$$

где 3^x и 4^{x+1} – функции доминанты.

III. Неопределенность вида $0 \cdot \infty$ встречается при вычислении предела $\lim_{x \to x_0} [f(x) \cdot g(x)],$ где $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = \infty$.

Рекомендуется выполнить эквивалентные преобразования $f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{(f(x))^{-1}}$, $f(x) \neq 0$, или $f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{(g(x))^{-1}}$, $g(x) \neq 0$, чтобы получить неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$ или $\frac{0}{0}$.

Пример

$$\lim_{x \to \infty} \left(x^2 \cdot \sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{2}{x} \right) = (\infty \cdot 0) = \lim_{x \to \infty} \frac{\sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{2}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{y \to 0} \frac{\sin y \cdot \sin 2y}{y^2} =$$

$$= 2 \lim_{y \to 0} \left(\frac{\sin y}{y} \cdot \frac{\sin 2y}{2y} \right) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2, \text{ где } y = \frac{1}{x} \to 0 \text{ при } x \to \infty.$$

IV. Неопределенность вида ∞ - ∞ встречается при вычислении предела $\lim_{x\to x_0}[f(x)-g(x)], \ \text{где } \lim_{x\to x_0}f(x)=a, \ \lim_{x\to x_0}g(x)=b \ \text{ и } a=+\infty, \ b=+\infty \ \text{ или } a=-\infty, \ b=-\infty.$

Рекомендуется выполнить эквивалентное преобразование выражения f(x) - g(x)путем приведения к общему знаменателю или избавления от иррациональности при помощи сопряженных выражений, или применением тождества $f(x) - g(x) = \frac{(g(x))^{-1} - (f(x))^{-1}}{(f(x) \cdot g(x))^{-1}}, \ f(x) \cdot g(x) \neq 0, \ \text{и т. д., чтобы получить неопре-}$ деленность $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$

1.
$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{2x + 1} - \frac{x^2 - 1}{2x - 1} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x^2 + 4x}{4x^2 - 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x^2}{4x^2} = -\frac{1}{2}.$$

2.
$$\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 5} - x) = (\infty - \infty) = \lim_{x \to +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 4x + 5} - x)(\sqrt{x^2 + 4x + 5} + x)}{\sqrt{x^2 + 4x + 5} + x} =$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{4x+5}{\sqrt{x^2+4x+5}+x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{4+\frac{5}{x}}{\sqrt{1+\frac{4}{x}+\frac{5}{x^2}+1}} = 2.$$

V. Неопределенности вида 1^{∞} , 0^{0} , ∞ встречаются при вычислении предела $\lim[f(x)]^{g(x)}$.

Рекомендуется: а) при неопределенности вида 1^{∞} использовать замечательные пределы, относящиеся κ числу e;

б) *при неопределенностях вида* 1^{∞} , 0^{0} , ∞^{0} применять основное логарифмическое тождество $[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}$, f(x) > 0, и соотношение $\lim_{x \to \infty} e^{g(x)\ln f(x)} = e^{x \to x_0}$ (высказывание (5) из (2), чтобы привести показатель степени $g(x) \cdot \ln f(x)$ к неопределенности вида $0 \cdot \infty$.

1.
$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x+1}{x+3} \right)^{2x+1} = (1^{\infty}) = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{x+1}{x+3} - 1 \right)^{2x+1} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{-2}} = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{$$

$$= \left[\lim_{y\to 0} (1+y)^{\frac{1}{y}}\right]^{\lim_{x\to +\infty} \frac{-2(2x+1)}{x+3}} = e^{\lim_{x\to +\infty} \frac{-2\left(\frac{2+\frac{1}{x}}{x}\right)}{1+\frac{3}{x}}} = e^{-4}, \text{ где } y = -\frac{2}{x+3} \to 0 \text{ при } x \to +\infty.$$

2.
$$\lim_{x \to +\infty} (1+x^2)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \to +\infty} e^{\frac{\ln(1+x^2)}{\ln x}} = \lim_{x \to +\infty} e^{\frac{2\ln x + \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{\ln x}} = e^{\frac{2+\lim_{x \to +\infty} \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{\ln x}} = e^{2+0} = e^2.$$

В 4 модуле будут сформулированы правила Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$ при вычислениях пределов функций. Следствиями этих правил являются пределы:

1.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\log_a x}{x^{\alpha}} = 0 \quad (\alpha > 0, \ a > 0, \ a \neq 1)$$

2. $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^{\alpha}}{a^x} = 0 \quad (\alpha > 0, \ a > 1)$

2.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^{\alpha}}{\alpha^{x}} = 0 \quad (\alpha > 0, \ \alpha > 1)$$

Эти пределы следует применять при раскрытии неопределенностей вида $\frac{\infty}{2}$ и $0 \cdot \infty$.

Замечание. Если $x \to +\infty$ и $\alpha > 0$, $\alpha > 1$, то логарифмическая $\log_a x$, степенная x^{a} и показательная a^{x} функции стремятся к плюс бесконечности. Из пределов 1 и 2 следует, что самой "медленной" является функция $\log_{a} x$, "быстрой" – функция x^{α} , а самой "быстрой" – функция a^{x} .

Данное замечание применяется при раскрытии неопределенности вида — тогда, когда нужно определить доминантные функции.

${f y}$ пражнения и задачи

Реальный профиль

А₁ **1.** Вычислите предел:
a)
$$\lim_{x\to 2} \frac{(x^2-4)(x^2-x-2)}{(x^2+x-6)^2};$$
b) $\lim_{x\to \infty} \frac{(2x+1)^5(3x+1)^5}{(2x+6)^{10}};$
b) $\lim_{x\to +\infty} \frac{\sqrt{x}+2\cdot \sqrt[4]{x}}{\sqrt[6]{x}+3\sqrt{x}};$

6)
$$\lim_{x \to \infty} \frac{(2x+1)^5 (3x+1)^5}{(2x+6)^{10}}$$
;

B)
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt{x} + 2 \cdot \sqrt[4]{x}}{\sqrt[6]{x} + 3\sqrt{x}}$$

$$\Gamma$$
) $\lim_{x\to -1} \frac{3x^2 + 5x + 2}{\sqrt[3]{x} + 1}$;

$$\exists 1 \lim_{x \to +\infty} \frac{3^x - 4^x}{2^x - 4^x};$$

e)
$$\lim_{x \to -\infty} \frac{3^x - 4^x}{2^x - 4^x}$$
;

ж)
$$\lim_{x\to 0} \frac{3^x - 4^x}{2^x - 4^x}$$
;

3)
$$\lim_{x \to -\infty} \frac{\ln(x^2 + x^6)}{\ln(x^4 + x^{10})}$$
;

$$\text{и) } \lim_{x\to 0} \frac{\ln(x^2+x^6)}{\ln(x^4+x^{10})}.$$

a)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x+x^2)}{\ln(1-x^3+x^6)}$$
;

$$6) \lim_{x\to 0} \frac{\ln(x^2 + e^{5x})}{\ln(x^{10} + e^{4x})};$$

$$\Gamma$$
) $\lim (\sqrt{x^2+6x}-x)$

д)
$$\lim (\sqrt{x^2 + x} + x)$$

ж)
$$\lim_{x\to -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right)$$

3)
$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 2} - \frac{x^2 + 3}{x - 1} \right)$$

ж)
$$\lim_{x \to -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right)$$
; з) $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+2} - \frac{x^2+3}{x-1} \right)$; и) $\lim_{x \to \infty} \left(\frac{x^2+x-1}{x+1} - \frac{x^2-2x-1}{x-1} \right)$

В₁ **3.** Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to \frac{\pi}{6}} \frac{6\sin^2 x + \sin x - 2}{4\sin^2 x - 8\sin x + 3}$$
; 6) $\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 - 3x + 2}$; 8) $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(3^{-x} + 2^{3x})}{\ln(e^{-x} + e^{2x})}$;

$$\Gamma \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x+1}{4x+3} \right)^{x^{2}}; \qquad \qquad \pi \lim_{x \to \infty} \left(\frac{x+4}{x+3} \right)^{5-2x}; \qquad \text{e) } \lim_{x \to 0} \left(\frac{1+4x}{1+x} \right)^{\frac{1}{x}};$$

ж)
$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{2^x+3^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$$
; 3) $\lim_{x\to 2} (x^2+x-5)^{\frac{1}{x-2}}$; и) $\lim_{x\to +\infty} [x^{\frac{3}{2}}(\sqrt{x+3}-2\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1})]$.

4. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{2+\operatorname{tg} x}{2+\operatorname{sin} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sin}^3 2x}};$$
 6) $\lim_{x\to 0} \left(\frac{\cos 2x}{\cos 5x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}};$ B) $\lim_{x\to +\infty} x^{\frac{1}{\ln(x^2+x^3)}};$ r) $\lim_{x\to +\infty} (\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x})^{\frac{1}{\ln(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})}};$ e) $\lim_{x\to 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2};$

ж)
$$\lim_{x \to \infty} \frac{(1+x)(1+x^2)...(1+x^n)}{[(4x)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}}, n \ge 1;$$
 3) $\lim_{x \to 1} \frac{x+x^2+...+x^n-n}{x-1}, n \ge 1.$

 \mathbf{C}_1 **5.** *Исследуйте!* Найдите значения параметров $a, b \in \mathbb{R}$, если $\lim_{x \to +\infty} (\sqrt[3]{4x^2 - x^3} + ax + b) = \frac{1}{3}$.

6. Вычислите $\lim_{x\to +\infty} (a\sqrt{x^2+x}+b\sqrt{4x^2+x})$ в зависимости от значений параметров $a,b\in\mathbb{R}$.

7. Дана функция $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{ax^2 + bx + 4}{x + 1}$. Найдите значения $a, b \in \mathbb{R}$, зная, что $\lim_{x \to -1} \frac{f(x)}{x} = 2$, $\lim_{x \to -1} [f(x) - ax] = 3$, а затем вычислите $\lim_{x \to -1} f(x)$.

8. *Исследуйте!* Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1, \text{ если } x < 2, \\ b + \ln(x - 1), \text{ если } x \ge 2. \end{cases}$

Найдите значения параметров $a,b \in \mathbb{R}$, при которых существуют пределы $\lim_{x \to 2} f(x)$ и $\lim_{x \to 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$, причем $\lim_{x \to 2} f(x) = f(2)$.

Упражнения и задачи на повторение

Реальный профиль

A₁ **1.** Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to 2} \frac{8 - 6x + x^2}{2 + 3x - 2x^2}$$
;
 6) $\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{(1 - 2x)(3x + 4)}$;
 B) $\lim_{x \to 0} \frac{(2 + x)(1 + 3x) - 2}{9 - (3 - 2x)^2}$;

$$\Gamma) \lim_{x \to +\infty} \frac{(2x+1)(3x+1)(4x+1)}{(3-2x)^3}; \quad \text{д)} \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x^2-3x}{x+1} - \frac{2x^2+5x}{x-2} \right); \quad \text{e)} \lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-2\sqrt[4]{x^3}}{2\sqrt{x}+3\sqrt[3]{x^2}};$$

ж)
$$\lim_{x \to -1} \frac{\sqrt{6-10x}-4}{2x^2-3x-5}$$
; 3) $\lim_{x \to 2} \frac{x-2}{5-\sqrt{10x+5}}$; и) $\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{7+x}-2}{x-1}$.

2. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to -1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{5+x}}{\sqrt[3]{1+2x} + 1}$$
; 6) $\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt[3]{7-6x} - \sqrt[5]{16-15x}}{\sqrt[6]{9-8x} - 1}$; B) $\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x+1} - 2\sqrt{x} + \sqrt{x-1})$;

$$\Gamma) \lim_{x \to -\infty} (\sqrt{2x^2 + x + 1} - \sqrt{2x^2 - x + 1}); \qquad \qquad \text{д) } \lim_{x \to +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2}).$$

3. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{\sin 2x + \sin 4x};$$

$$6) \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} 3x + 2\sin x}{3\sin 2x - \operatorname{tg} x};$$

$$B^*) \lim_{x\to 0} \frac{\sin 2x \cdot \arcsin 6x}{\operatorname{tg}^2(3x)};$$

$$\Gamma^*) \lim_{x \to 0} \frac{2\sin 5x - 3\operatorname{arctg} 2x}{\operatorname{arctg} 6x}; \qquad \pi^*) \lim_{x \to 0} \frac{2^{3x} - 3^{2x}}{2^{3x} + 3^{2x} - 2}; \qquad \qquad e^*) \lim_{x \to 0} \frac{e^{\sin 2x} - 1}{\operatorname{tg} 6x}.$$

$$\mathbf{A}^*) \lim_{x\to 0} \frac{2^{3x}-3^{2x}}{2^{3x}+3^{2x}-2};$$

$$e^*) \lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin 2x} - 1}{\tan 6x}$$

В₁ **4.** Вычислите предел:

$$a^*$$
) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 4x}{\sin^2(2x)}$;

$$\operatorname{B}^*) \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + 2\sin 3x)}{e^{5x} - e^{3x}};$$

$$\Gamma^*) \lim_{x\to 0} \frac{\ln(\cos 6x)}{\ln(\cos 3x)};$$

$$\exists \lim_{x\to\infty} \left(\frac{2x+3}{2x-1}\right)^{x+4};$$

e)
$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1+\sin x}{1+\sin 2x} \right)^{\frac{1}{x}};$$

$$\mathbf{w}^*) \lim_{x\to 0} \left(\frac{\cos 2x}{\cos x}\right)^{\frac{1}{x^2}};$$

3*)
$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1+x\cdot 3^x}{1+x\cdot 5^x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

5. Вычислите односторонние пред

a)
$$\lim_{\substack{x \to -1 \\ x < -1}} \frac{x}{(x+1)(x-2)};$$
 6) $\lim_{\substack{x \to 1 \\ x > 1}} \frac{|1-x|}{\sqrt{x^2-1}};$

6)
$$\lim_{\substack{x \to 1 \\ x \to 1}} \frac{|1-x|}{\sqrt{x^2-1}}$$

B)
$$\lim_{\substack{x\to 2\\y>2}} \frac{1}{2}$$
;

$$\Gamma$$
) $\lim_{\substack{x\to 0\\x=0}} \frac{1}{1-2^x}$;

$$\exists \lim_{x\to 0} \frac{x-2}{\ln(1+x)};$$

e)
$$\lim_{\substack{x \to -1 \\ x > -1}} \frac{1}{3 - 3^{\frac{1 + |x|}{1 - x^2}}}$$
.

С₁ **6.** *Исследуйте!* Найдите значения параметра $a \in \mathbb{R}$, при которых существует предел $\lim_{x \to x_0} f(x)$: a) $f(x) = \begin{cases} 4x^2 + a, \text{ если } x \le 1 \\ \sqrt{5x + 4} + 2a^2, \text{ если } x > 1, \end{cases}$ $x_0 = 1$;

предел
$$\lim_{x \to x_0} f(x)$$
:

a)
$$f(x) = \begin{cases} 4x^2 + a, & \text{если } x \le 1\\ \sqrt{5x + 4} + 2a^2, & \text{если } x > 1, \end{cases}$$
 $x_0 = 1$

б)
$$f(x) = \begin{cases} a^2 + 3x + 2, & \text{если } x < 0 \\ 5\sqrt{a^2 + x^2} - 2, & \text{если } x \ge 0, \end{cases}$$
 $x_0 = 0;$

в)
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sqrt{3a+1} + ax + a, \text{ если } x \le -1 \\ x^2 - x\sqrt{a+4}, \text{ если } x > -1, \end{cases}$$
 $x_0 = -1;$

г)
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{a^2 x^2 + 1}, \text{ если } x < 1 \\ 1 + 2ax, \text{ если } x \ge 1, \end{cases}$$
 $x_0 = 1.$

7. Исследуйте! Найдите значения параметров $a,b\in\mathbb{R}$ зная, что:

a)
$$\lim_{x\to 1} \frac{\sin(x^2 + ax + b)}{2x^2 - 3x + 1} = 3$$
, если $a + b = -1$;

6)
$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x^2 - x + 3}{x - 2} + ax + b \right) = 6;$$
 B^*) $\lim_{x \to 0} \frac{2e^{ax} - ae^{bx}}{x} = -4.$

$$B^*) \lim_{x \to 0} \frac{2e^{ax} - ae^{bx}}{x} = -4$$

8. Работайте в парах! Вертикальное сечение рельефа гористой местности задано

функцией
$$f: \left[-6, \frac{11}{2}\right] \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1 - 6x - x^2, \text{ если } x \in [-6, -1), \\ 0.1x + 2.1, \text{ если } x \in [-1, 1], \\ -0.45x^2 + 2.7x - 0.05, \text{ если } x \in \left[1, \frac{11}{2}\right], \end{cases}$$

масштаб 1:100 м для осей координат. Между двумя горами, на плоскогорье, соответствующем значению абсцисс $x \in [-1, 1]$, расположена деревушка.

- а) Постройте график функции f и определите абсциссы вершин гор.
- б) Найдите разность между вершинами гор.
- в) Найдите высоту вертикальной стены горы, соответствующей абсциссе x = -1.
- г) Вычислите угол наклона плоскогорья, на котором расположена деревушка.
- д) Какова минимальная глубина колодца деревушки, если ось Ox является уровнем поверхности подземных вод?

Поверхности подземных вод:

9. Работайте в парах!

График функции
$$f: [-10,2;52] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} \frac{1}{200}x^2 - \frac{1}{50}, \text{ если } x \in [-10,2;2], \\ \frac{1}{5000}(x-2)^2 + \frac{1}{1000}, \text{ если } x \in (2;52], \end{cases}$$

представляет рельеф морского дна, масштаб 1:10000 м. Поверхность воды моря соответствует горизонтальной прямой y = 0.5.

- а) Постройте график функции f и определите максимальную глубину моря.
- б) Какова ширина моря, если она соответствует горизонтальной прямой y = 0.5?
- в) Найдите высоту трещины тектонической плиты в точке с абсциссой x = 2.

Итоговый тест

Время выполнения работы: 45 минут

5

(5)

4

2

(5)

(3)

(2)

(5)

(5)

Реальный профиль

1. Вычислите предел:

a)
$$\lim_{x \to 2} \frac{\sqrt{10 - 3x} - \sqrt{2 + x}}{x - 2}$$
;

$$6) \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{2}\sin 5x - 3\sin \frac{x}{2}}{\sin 2x}.$$

- **2.** Задана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} 4 \sqrt{4 2x}, \text{ если } x \le 0, \\ 2 + 3x x^2, \text{ если } x > 0 \end{cases}$
 - а) Вычислите односторонние пределы функции f в точке x = 0.
 - б) Определите и обоснуйте истинностное значение высказывания:

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 2. \qquad \qquad \mathbf{M} \qquad \mathbf{J}$$

- $\lim_{x \to 0} f(x) = 2. \qquad \mathbf{M} \qquad \mathbf{J}$ 3. Пусть $l_1 = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 + 2x 3}{x^2 1}, \ l_2 = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 3x + 2}{x^2 + 2x 3}, \ l_3 = \lim_{x \to 1} \frac{x^2 + x 2}{x^2 3x + 2}.$
 - а) Вычислите l_1 и l_3 .
 - б) Не вычисляя предел l_2 , найдите значение $l = l_1 l_2 l_3$.
 - в) Используя результат, полученный в б), найдите значение предела l_2 .
 - г) Решите на множестве \mathbb{R} уравнение $\log_{l_2^2}(x-l_1^2) + \log_{l_2^2}(l_3^2-x) = \log_{l_2^2}9 2\log_{l_2^2}l$.
- 4. Определите букву, соответствующую верному варианту.


$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^2+2x}{x+3}+ax+b\right) = 1, \ a,b\in\mathbb{R}, \ \text{если}$$
 A $a=0,\ b=4$. **B** $a=-1,\ b\in\mathbb{R}$. **C** $a=-1,\ b=2$. **D** $a\in\{0,\ 1\},\ b\in\mathbb{R}$.

A
$$a = 0$$
, $b = 4$. **B** $a = -1$, $b \in \mathbb{R}$. Обоснуйте ответ.

C
$$a = -1$$
, $b = 2$.

Схема оценивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	36–35	34–31	30–27	26–22	21–16	15-11	10–7	6–4	3–2	1-0



Операции над пределами функций

- 2. $\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \to x_0} f(x) \pm \lim_{x \to x_0} g(x)$ 1. $\lim_{\substack{x \to x_0 \\ x \to x_0}} [cf(x)] = c \cdot \lim_{\substack{x \to x_0 \\ x \to x_0}} f(x), c - \text{const.}$
- 3. $\lim_{x \to x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim_{x \to x_0} g(x)$
- **4.** $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{\lim_{x \to x_0} g(x)}, \quad \lim_{x \to x_0} g(x) \neq 0$
- **5.** $\lim_{x \to x_0} [f(x)]^{g(x)} = [\lim_{x \to x_0} f(x)]^{\lim_{x \to x_0}}$

Неопределенности в операциях над пределами функций 0|0

$\stackrel{\infty}{\longrightarrow}$; $\infty - \infty$; $0 \cdot \infty$; 1^{∞} ; 0^0 ; ∞^0 .

Раскрытие неопределенностей

🕿 — вынесением за скобки функций, дающих наибольший рост на бесконечности. ** методом разложения на множители или используя известные пределы.

 $0 \cdot \infty - 3$ квивалентными преобразованиями произведения в частное двух функций. на сопряженные выражения.

 $[", 0", \infty" -$ применением замечательных пределов, относящихся к числу e, или

применением основного логарифмического тождества.

Замечательные пределы

 $\mathbf{0} \lim_{x \to x_0} \frac{\sin x}{x} = 1$

2° Если предел функции в точке меньше (больше) предела другой функции в соответствующей точке, то в окрестности этой точки

и первая функция меньше (больше) второй функции.

1° Если функция имеет предел в точке, то этот предел единственный.

Свойства пределов функции в точке

 $\Theta \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

- то в окрестности этой точки функция сохраняет свой знак, то есть она положительна (отрицательна). Если предел функции в точке положительный (отрицательный), 30
 - Если функция имеет конечный предел в точке, то в окрестности этой точки она ограничена.
 - В неравенстве функций можно перейти к пределу, сохранив при этом знак неравенства 00
- Если f элементарная функция, то $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, где x_0 произвольная точка, принадлежащая 6° Композиция функций, имеющих предел в точке, есть функция, имеющая предел в этой точке. зе области определения. 2

функций на бесконечности Порядок роста некоторых

"Самой медленной" является логарифмическая функция:

$$f: \mathbb{R}_{+}^{*} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \log_{a} x, \ a \in \mathbb{R}_{+}^{*}, \ a \neq 1.$$

"Быстрой" является степенная функция:
$$f\colon \mathbb{R}^*_+ \to \mathbb{R}^*_+, \ f(x) = x^a, \ \alpha \in \mathbb{R}^*_-$$

તં

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+^*, \ f(x) = a^x, \ a \in \mathbb{R}_+^*, \ a \neq 1.$$

Модуль



Непрерывные функции

Цели

- ⇒ *установление *непрерывности*, нахождение *точек разрыва* на основании аналитических формул или по графикам заданных функций;
- ⇒ *применение понятий непрерывная функция, односторонняя непрерывная функция, разрывная функция в точке или на множестве в различных контекстах;
- *использование свойств функций, непрерывных на промежутке в различных контекстах;

 *применение понятия предела функции при определении асимптот графика функции;

 *распознавание и определениие асимптот графика функции.

Дана функция $f: E \to \mathbb{R}$ ($E \subseteq \mathbb{R}$). В модуле 2 было изучено поведение функции f в окрестности предельной точки x_0 множества E, причем условие принадлежности точки x_0 множеству E не было существенным, а в случае, когда точка x_0 принадлежала множеству E, значение функции f в точке x_0 не принималось во внимание.

В этом модуле мы изучим поведение функции f не только в окрестности точки x_0 , но и в самой точке x_0 , а именно: мы сравним значение функции f в x_0 с ее значениями в точках из окрестности x_0 . Для этого необходимо, чтобы функция f была определена в точке x_0 , то есть, чтобы точка x_0 принадлежала множеству E.

§1 Функции, непрерывные в точке. Функции, непрерывные на множестве

С понятием *предела функции* тесно связано другое важное понятие математического анализа – *непрерывность функции*. Это понятие было четко сформулировано математиками Б. Больцано 1 и О. Л. Коши.



Бернард Больцано

1.1. Понятие непрерывности


Интуитивно, утверждения *кривая непрерывна* и *кривая не имеет разрывов*, то есть она может быть проведена, не отрывая карандаша от бумаги, являются эквивалентными.

Понятия непрерывная функция, разрывная функция (в точке или на множестве) легче понять, рассмотрев графики некоторых функций.

Бернард Больцано (1781–1848) – чешский философ, логик и математик итальянского происхождения.

Примеры


1. Предположим, что по числовой оси равномерно движется материальная точка, которая в момент времени t = 0 находится в начале отсчета. Если скорость точки постоянна и равна v, то, обозначив через s(t) расстояние, пройденное точкой за время t, получим уравнение s(t) = vt, $t \ge 0$. График функции $s: [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, s(t) = vt, изображен на рисунке 3.1.





2. Рассмотрим функции $f, g, h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, \text{ если } x \le 1, \\ 1, \text{ если } x > 1, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x, \text{ если } x < 1, \\ 2, \text{ если } x = 1, \\ 1, \text{ если } x > 1, \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} x, \text{ если } x \le 1, \\ 1 + x, \text{ если } x > 1. \end{cases}$$

Графики этих функций изображены на рис. 3.2.







Графики функций s (рис. 3.1) и f (рис. 3.2 а)) могут быть проведены не отрывая карандаша от бумаги, а графики функций g и h (рис. 3.2 б), в)) разрываются в точке с абсциссой $x_0 = 1$.

Чтобы выделить различия в поведении функций f,g и h в точке x_0 = 1, сравним их односторонние пределы в x_0 = 1 с их соответствующими значениями в этой точке:

$$f(1-0) = \lim_{x \to 1-0} f(x) = \lim_{x \to 1-0} x = 1, \ f(1+0) = \lim_{x \to 1+0} f(x) = \lim_{x \to 1+0} 1 = 1, \ f(1) = 1;$$

$$g(1-0) = \lim_{x \to 1-0} g(x) = \lim_{x \to 1-0} x = 1, \ g(1+0) = \lim_{x \to 1+0} g(x) = \lim_{x \to 1+0} 1 = 1, \ g(1) = 2;$$

$$h(1-0) = \lim_{x \to 1-0} h(x) = \lim_{x \to 1-0} x = 1, \ h(1+0) = \lim_{x \to 1+0} h(x) = \lim_{x \to 1+0} (1+x) = 2, \ h(1) = 1.$$

Предел функций f и g в точке $x_0=1$ равен 1, то есть $\lim_{x\to 1} f(x)=1$ и $\lim_{x\to 1} g(x)=1$. Отметим, что f(1)=1, g(1)=2. График функции g разрывается в точке с абсциссой $x_0=1$, так как $\lim_{x\to 1} g(x)=1$, а g(1)=2. График функции g разрывается в точке с абсциссой g0 = 1, так как ее односторонние пределы в этой точке различны (функция g0 не имеет предела в точке g0 = 1). Таким образом, можно сделать вывод, что график функции g1 не разрывается в точке с абсциссой g0 = 1 по двум причинам:

1) существует $\lim_{x\to 1} f(x)$; 2) этот предел равен значению функции f в точке $x_0=1$. На основании этих рассуждений, сформулируем следующее определение.

Определение. Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ – некоторая функция и точка $x_0 \in E$ предельная точка множества E. Говорят, что функция f непрерывна в точке x_0 , если она имеет предел в этой точке, и этот предел равен значению функции в точке x_0 : $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Замечание. Если x_0 не является предельной точкой, то есть это изолированная точка, то по определению функция **непрерывна** в такого рода точке.

Учитывая это замечание, далее рассмотрим вопрос о непрерывности функции *только* в предельных точках ее области определения.

Определение непрерывности функции f в точке x_0 основано на понятии предела функции f в этой точке x_0 . Поэтому многие из свойств пределов функций верны и для непрерывных функций. Применив определения предела функции в точке, получим характеристики непрерывности.

Теорема 1. Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ – некоторая функция и $x_0 \in E$.

- **1.** Функция f непрерывна в точке $x_0 \Leftrightarrow \text{для любого } \varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех $x \in E$ из неравенства $|x x_0| < \delta$ следует, что $|f(x) f(x_0)| < \varepsilon$.
- **2.** Функция f непрерывна в точке $x_0 \Leftrightarrow$ для любой последовательности $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n \in E$, из того, что $x_n \to x_0$ при $n \to \infty$ следует, что соответствующая последовательность $(f(x_n))_{n\geq 1}$ стремится к $f(x_0)$, то есть $f(x_n) \to f(x_0)$ при $n \to \infty$.
- 3. Функция f непрерывна в точке $x_0 \Leftrightarrow$ существуют односторонние пределы $(x_0$ внутренняя точка множества E):

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = f(x_0 - 0), \quad \lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = f(x_0 + 0) \text{ if } f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0).$$

Высказывания 1–3 означают существование предела функции в точке x_0 и $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Если функция f непрерывна в точке $x_0 \in E$, то x_0 называется **точкой иепрерывности** функции f. Если функция f не является непрерывной в точке $x_0 \in E$, она называется **разрывной в точке** x_0 , а x_0 называется **точкой разрыва** функции f.

Функция f, непрерывная в любой точке множества $A \subseteq E$, называется непрерывной на множестве A.

В случае когда A = E, вместо того чтобы говорить, что функция f непрерывна на всей области определения или по определению, можно просто говорить, что функция f *иепрерывна* (не указывая на каком множестве).

Замечание. Было доказано, что предел элементарных функций в любой точке x_0 , принадлежащей их области определения, вычисляется прямой заменой x на x_0 , то есть $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Значит, элементарные функции (рациональные, показательные и др.) непрерывны на любом промежутке, на котором они определены.

Вывод. Элементарные функции непрерывны в любой точке, принадлежащей их области определения.

Примеры

- **1.** Функция f (рис. 3.2 а)) непрерывна в точке $x_0 = 1$, а функции g, h (рис. 3.2 б), в)) разрывны в этой точке.
- **2.** Функции $f, g, h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 + 2x^3 1$, $g(x) = \cos x$, $h(x) = 3^x$, элементарные, поэтому они непрерывны на множестве \mathbb{R} , а функция $\varphi: (-\infty, 0] \to \mathbb{R}$, $\varphi(x) = \sqrt{1-3^x}$, непрерывна на промежутке $(-\infty, 0]$ из тех же соображений.

Задание с решением

Умерической из исследуем на непрерывность функцию $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x^2, \text{ если } x \in (0, 1], \\ \frac{x+1}{2}, \text{ если } x \in (1, +\infty). \end{cases}$

Исследование на непрерывность функции, без указания определенной точки, подразумевает исследование функции на всей ее области определения.

На промежутке (0, 1] функция f задана формулой $f(x) = x^2$, а на интервале $(1, +\infty)$ – формулой $f(x) = \frac{x+1}{2}$ и f непрерывна на этих промежутках (рис. 3.3). Далее


$$f(x) = x^2$$
, а на интервале $(1, +\infty)$ – формулой $f(x) = \frac{x+1}{2}$ и f непрерывна на этих промежутках (рис. 3.3). Далее исследуем на непрерывность функцию f в точке $x_0 = 1$.

Имеем:
$$f(1-0) = \lim_{x \to 1-0} f(x) = \lim_{x \to 1-0} x^2 = 1$$
,
 $f(1+0) = \lim_{x \to 1+0} f(x) = \lim_{x \to 1+0} \frac{x+1}{2} = 1$ и $f(1) = 1$.

$$f(1+0) = \lim_{x \to 1+0} f(x) = \lim_{x \to 1+0} \frac{x+1}{2} = 1$$
 и $f(1) = 1$

Следовательно, f(1-0) = f(1+0) = f(1). По теореме 1 (высказывание 3), функция f непрерывна и в точке $x_0 = 1$.

Ответ: Функция f непрерывна на интервале (0, +∞).



1.2. Точки разрыва

Точки разрыва функции делятся на две категории (два рода).

Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ $(E \subseteq \mathbb{R})$ – некоторая функция и точка $x_0 \in E$ $(x_0$ – внутренняя точка множества E).

Определение. Точка разрыва x_0 называется точкой разрыва первого рода функции f, если односторонние пределы функции f в точке x_0 существуют и конечны, однако $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$ или $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) \neq f(x_0)$.

Задания с решением

5. Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, \text{ если } x < 0, \\ 2, \text{ если } x \ge 0. \end{cases}$

Исследуем на непрерывность функцию f в точке $x_0 = 0$.


$$f(-0) = \lim_{x \to -0} \frac{\sin x}{x} = 1$$
, $f(+0) = \lim_{x \to +0} f(x) = 2$.

Так как $f(-0) \neq f(+0)$, значит, точка $x_0 = 0$ является точкой разрыва первого рода функции f.

\$\text{\$\text{\$\delta}\$ 2. Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, \ \text{если } x < 1, \\ 1, \ \text{если } x = 1, \\ 2, \ \text{если } x > 1. \end{cases}$

Исследуем на непрерывность функцию f на множестве \mathbb{R} . Решение:

Функция f непрерывна на множестве $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, а в точке $x_0 = 1$ имеем f(1-0) = f(1+0) = 2 и f(1) = 1 (рис. 3.4).



Значит, функция f не является непрерывной в точке $x_0 = 1$, имея в этой точке разрыв первого рода.

Определение. Точка разрыва x_0 называется точкой разрыва второго рода функции f, если она не является точкой разрыва первого рода.

Из определения следует, что в точке разрыва второго рода хотя бы один из односторонних пределов бесконечен (то есть равен ∞), или хотя бы один из односторонних пределов не существует.

Задания с решением

5 1. Дана функция
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, \ \text{если } x < 0, \\ 1, \ \text{если } x \ge 0. \end{cases}$$

Исследуем на непрерывность функции f (рис. 3.5) в точке $x_0 = 0$.




Рис. 3.5

Решение:

$$\lim_{x\to -0} f(x) = \lim_{x\to -0} \frac{1}{x} = -\infty$$
. Следовательно, точка $x_0 = 0$ является точкой разрыва второго рода функции f .

У 2. Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} x, \text{ если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, \text{ если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$

Покажем, что функция f непрерывна в точке $x_0 = 0$, и любая точка $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ является точкой разрыва второго рода функции f.

Решение:


Пусть $x_0=0$ и дана произвольная последовательность $(x_n)_{n\geq 1}, x_n\to 0$ при $n\to\infty$. Тогда $f(x_n)=\begin{cases} x_n, & \text{если } x_n\in\mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x_n\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}, \end{cases}$ и очевидно, что $f(x_n)\to 0=f(0)$ при $n\to\infty$. Значит, функция f непрерывна в точке $x_0=0$.

Пусть теперь x_0 – произвольная точка и $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Покажем, что не существует предела слева функции f в точке x_0 . Рассмотрим такие две последовательности $(x_n')_{n\geq 1},\ x_n'\in \mathbb{Q},\ u\ (x_n'')_{n\geq 1},\ x_n''\in \mathbb{R}\setminus \mathbb{Q},\$ что $x_n'\to x_0-0$ и $x_n''\to x_0-0$ при $n\to\infty$. Тогда согласно определению функции f следует, что $f(x_n')=x_n'\to x_0,\$ а $f(x_n'')=0\to 0$ при $n\to\infty$. Но $x_0\neq 0$. Значит, мы показали, что существуют две последовательности $(x_n')_{n\geq 1}$ и $(x_n'')_{n\geq 1}$, которые стремятся слева к x_0 , но соответствующие им последовательности $(f(x_n'))_{n\geq 1}$ и $(f(x_n''))_{n\geq 1}$ стремятся к различным пределам. Это означает, что не существует $\lim_{x\to x_0-0} f(x)$. Следовательно, x_0 является точкой разрыва второго рода функции f.

Определение. Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ $(E \subseteq \mathbb{R})$ – некоторая функция и x_0 – внутренняя точка множества E. Если существуют конечные односторонние пределы, $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 + 0)$, то разность $f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$ называется **скачком** функции f в точке x_0 .

Например, функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \operatorname{sgn} x$, в точке $x_0 = 0$ имеет скачок, равный 2 (рис. 3.6 а)).


Замечания. 1. Очевидно, что скачок функции f в точке непрерывности x_0 равен нулю, поскольку в этом случае $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$.



Например, рассмотрим функцию $f: [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } x \in [-\pi, 0), \\ 1, & \text{если } x = 0, \\ \sin x, & \text{если } x \in (0, \pi]. \end{cases}$$

Имеем f(-0) = f(+0) = 0, а f(0) = 1. Значит, функция f разрывна в точке $x_0 = 0$ и ее скачок равен нулю (рис. 3.6 б)).






Рис. 3.6

1.3. Односторонняя непрерывность

Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ $(E \subseteq \mathbb{R})$ — некоторая функция и $x_0 \in E$ — предельная точка множества $E_- = E \cap (-\infty, x_0) = \{x \mid x \in E, x < x_0\}$.

Определение. Функция f называется непрерывной слева в точке x_0 , если в x_0 существует предел слева $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 - 0) = f(x_0)$.

Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ — некоторая функция и $x_0 \in E$ — предельная точка множества $E_+ = E \cap (x_0, +\infty) = \{x | x \in E, x > x_0\}.$

Определение. Функция f называется **непрерывной справа** в точке x_0 , если в x_0 существует предел справа $f(x_0 + 0)$ и $f(x_0 + 0) = f(x_0)$.

Примеры

- **1.** Функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \leq 0, \\ -1, & \text{если } x > 0, \end{cases}$ непрерывна слева в точке $x_0 = 0$, поскольку f(-0) = 1 = f(0), и не является непрерывной справа в этой точке, так как f(+0) = -1, а f(0) = 1, то есть $f(+0) \neq f(0)$.
- **2.** Функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x < 0, \\ -1, & \text{если } x \ge 0, \end{cases}$ непрерывна справа в точке $x_0 = 0$, поскольку f(+0) = -1 = f(0), и не является непрерывной слева в этой точке, так как f(-0) = 1, а f(0) = -1, то есть $f(-0) \ne f(0)$.

Замечания. 1. Функция $f: E \to \mathbb{R}$ ($E \subseteq \mathbb{R}$) непрерывна в точке $x_0 \in E$ (x_0 — внутренняя точка множества E) тогда и только тогда, когда она непрерывна и слева, и справа в точке x_0 (сравните с теоремой 1, высказывание 3).

2. Если E = [a, b], то задача непрерывности слева в точке a и соответственно справа в точке b не имеет смысла. А также функция $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке a (соответственно b) тогда и только тогда, когда она непрерывна в точке a справа (соответственно в точке b слева).

Задания с решением

5.3.2.1.1.13 • решением **5.** • Пеневория функцию $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} e^x + a \cos x, \ \text{если} \ x < 0, \\ 1, \ \text{если} \ x = 0, \\ x^2 + b, \ \text{если} \ x > 0, \end{cases}$ где $a, b \in \mathbb{R}$.

Найдем значения действительных параметров a и b, при которых функция f:

- а) непрерывна слева в точке $x_0 = 0$;
- б) непрерывна справа в точке $x_0 = 0$;
- в) непрерывна на множестве ℝ.

Решение:

- а) $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} (e^x + a\cos x) = 1 + a$. По определению, функция f непрерывна
- слева в точке $x_0=0$ тогда и только тогда, когда $f(-0)=f(0)\Leftrightarrow 1+a=1\Leftrightarrow a=0$ и $b\in\mathbb{R}$.

 б) $\lim_{x\to +0}f(x)=\lim_{x\to +0}(x^2+b)=b$. Согласно определению, функция f непрерывна справа в точке $x_0=0$ тогда и только тогда, когда $f(+0)=f(0)\Leftrightarrow b=1$ и $a\in\mathbb{R}$.
- в) Функция f непрерывна на интервалах ($-\infty$, 0) и (0, $+\infty$) при любых значениях параметров a и b. В точке $x_0 = 0$ функция f непрерывна тогда и только тогда, когда $f(-0) = f(+0) = f(0) \Leftrightarrow a = 0$ и b = 1.

Omeem: a) $a = 0, b \in \mathbb{R}$; б) $a \in \mathbb{R}, b = 1$; в) a = 0, b = 1.

 $\$ 2. Исследуйте на непрерывность слева и справа функцию $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2, \text{ если } x \le 1, \\ x^2 + 1, \text{ если } x > 1. \end{cases}$$

Функция f – элементарная, поэтому при x < 1 и x > 1 она непрерывна. Исследуем ее на непрерывность в точке x = 1. Вычислим односторонние пределы:

 $\lim_{x \to 1-0} f(x) = \lim_{x \to 1} (3x - 2) = 1 = f(1), \quad \lim_{x \to 1+0} f(x) = \lim_{x \to 1} (x^2 + 1) = 2 \neq f(1).$ Следовательно, f непрерывна слева в точке x = 1 и не является непрерывной справа в этой точке.

1.4. Операции над непрерывными функциями (дополнительно)

Покажем, что арифметические операции над непрерывными функциями, а также их композиция сохраняют непрерывность.

Теорема 2. Если $f, g: E \to \mathbb{R}$ $(E \subseteq \mathbb{R})$ – непрерывные функции в точке $x_0 \in E$, то αf ($\alpha \in \mathbb{R}$), f+g, f-g, $f \cdot g$ являются непрерывными функциями в точке x_0 . Если к тому же $g(x_0) \neq 0$, то и $\frac{f}{g}$ – непрерывная функция в точке x_0 .

Эту теорему, сформулированную локально (для одной точки x_0), можно расширить на множество, в частности, на всю область определения E.

Примеры

- **1.** Функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2^x + \sin x + x$, непрерывна на множестве \mathbb{R} , так как является суммой трех непрерывных функций на множестве \mathbb{R} .
- **2.** Функция, заданная формулой $f(x) = \frac{x}{\sin x}$, непрерывна на множестве $E = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, поскольку является частным двух непрерывных функций на этом множестве и ее знаменатель не обращается в нуль на множестве E.
- 3. Функция, заданная формулой $f(x) = \lg x$, непрерывна на множестве $E = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, так как $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$ ($\cos x \neq 0$, $x \in E$), и синус, косинус непрерывные функции на множестве E.

Теорема 3. Пусть $g: E_1 \to E_2$, $f: E_2 \to \mathbb{R}$ $(E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R})$ — две функции и $h = f \circ g: E_1 \to \mathbb{R}$ — их композиция. Если функция g непрерывна в точке $x_0 \in E_1$ и функция f непрерывна в точке $y_0 = g(x_0) \in E_2$, то функция f непрерывна в f0.

Замечание. Из условий теоремы 3 и из определения непрерывности следует равенство: $\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = f(g(x_0)) = f(\lim_{x\to x_0} g(x))$, которое означает, что *предел* "взаимодействует" со всеми непрерывными функциями.

Примеры

- 1. $\lim_{x\to 0} e^{\sin x} = e^{\lim_{x\to 0} \sin x} = e^0 = 1$ на основании непрерывности функций $f(x) = e^x$ и $g(x) = \sin x$;
- **2.** $\lim_{x \to \pi} \operatorname{tg}(2^{\sqrt{x}}) = \operatorname{tg}(\lim_{x \to \pi} 2^{\sqrt{x}}) = \operatorname{tg}(2^{\lim_{x \to \pi} \sqrt{x}}) = \operatorname{tg}2^{\sqrt{\pi}}$ на основании непрерывности функций a^x , $\operatorname{tg} x$ и x^α в соответствующих точках.

Следствие. Если функция $g: E_1 \to E_2$ непрерывна на множестве E_1 и функция $f: E_2 \to \mathbb{R}$ непрерывна на множестве E_2 ($E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}$), то функция $h = f \circ g: E_1 \to \mathbb{R}$ непрерывна на множестве E_1 .

Итак, композиция двух непрерывных функций является непрерывной функцией, а теоремы 2 и 3 распространяются на сумму, произведение и композицию конечного числа непрерывных функций.

Задание с решением

Ч Пусть $f, g: E \to \mathbb{R}$ – непрерывные функции в точке $x_0 \in E$ (на множестве E). Покажем, что функции |f|, $\max(f, g)$, $\min(f, g)$ непрерывны в точке x_0 (соответственно непрерывны на множестве E).

Решение:

Функция |f|, то есть |f|(x) = |f(x)|, может быть представлена в виде композиции двух непрерывных функций: $|f| = \varphi \circ f$, где $\varphi \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\varphi(x) = |x|$, – функция модуль, непрерывная на множестве E. Согласно теореме 3 функция |f| непрерывна в точке x_0 (соответственно непрерывна на множестве E).

Непрерывность двух других функций следует из теоремы 2 и соотношений:

$$\max(f, g) = \frac{1}{2}((f+g)+|f-g|), \quad \min(f, g) = \frac{1}{2}((f+g)-|f-g|).$$

Упражнения и задачи

Реальный профиль

- **A**₁ 1. Покажите, что функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^2 + 2x 1$, непрерывна в точках $x_0 = 0$
 - **2.** Исследуйте! Исследуйте на непрерывность функцию f на ее области опреде-

ления: a) $f: [-1; 1] \to \mathbb{R}, f(x) = 2^x + x + \frac{x}{x+3}$;

6)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = 2x + \frac{1}{x^2 + 1};$$

B)
$$f: (-3, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{x+3} + \ln(x+4).$$

3. Определите, какие из следующих функций $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ непрерывны на множестве \mathbb{R} :

a) f(x) = |x+1|;

6)
$$f(x) = x + |x-1|$$
;

в)
$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 1, & \text{если } x = 0; \end{cases}$$

в)
$$f(x) =\begin{cases} \frac{|x|}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 1, & \text{если } x = 0; \end{cases}$$
 г) $f(x) =\begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}}, & \text{если } x > 0, \\ 2,7, & \text{если } x \leq 0. \end{cases}$

4. \mathcal{M} Исследуйте! Исследуйте на непрерывность функцию $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

а)
$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2, \text{ если } x \in \mathbb{Q}, \\ x + 1, \text{ если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}; \end{cases}$$
 б) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, \text{ если } x < 0, \\ 2, \text{ если } x = 0, \\ \frac{\sin 2x}{2}, \text{ если } x > 0. \end{cases}$

В₁ **5.** Применив неравенство $|\sin x| \le |x|$, $\forall x \in \mathbb{R}$, докажите непрерывность функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

- a) $f(x) = \sin x$; 6) $g(x) = \cos x$; B) $f(x) = \sin 2x$; Γ) $f(x) = \cos 2x$.
- **6.** а) Раскройте модудь в функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, заданной формулой


$$f(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{\cos x + |x - 1| e^{nx}}{1 + e^{nx}}.$$


- б) Исследуйте на непрерывность функцию f, полученную в a) после раскрытия модуля.
- 7. Исследуйте! Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax, \text{ если } x \le 1, \\ x^3 + a^3, \text{ если } x > 1, \end{cases}$ где $a \in \mathbb{R}$. Найдите действительные значения параметра a, при которых функция f непрерывна на множестве R.
- **8.** Найдите точки разрыва и вычислите в этих точках скачок функции $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:


a)
$$f(x) = \begin{cases} \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^n, \text{ если } x \le 1, \\ \sin(x - 1), \text{ если } x > 1; \end{cases}$$

б)
$$f(x) = \begin{cases} sgn(x+1), & ecли \ x \le 0, \\ 2, & ecлu \ x > 0. \end{cases}$$


C₁ **9.** Найдите промежутки непрерывности функции $f: [a, b] \to \mathbb{R}$, заданной графически:







- **10.** Функция $f: [-3, 5] \to \mathbb{R}$ задана графически на данном рисунке.
 - а) Укажите промежутки, на которых функция f непрерывна.
 - б) Вычислите: $f(-1) \cdot f(0)$, $f(2) \cdot f(4)$, $f(0) \cdot f(5)$.



- 11. Исследуйте на непрерывность и постройте график функции:
- а) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lim_{n \to \infty} \left\{ \frac{x}{n}, \text{ если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, \text{ если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}; \right\}$ б) $f: [-1, 1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lim_{n \to \infty} (x^{2n} + x^{2n+2})$.

 12.

 Исследуйте! Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} ax + be^x, \text{ если } x < 1, \\ 2, \text{ если } x = 1, \\ 1 ax, \text{ если } x > 1. \end{cases}$

Найдите значения параметров $a, b \in \mathbb{R}$, при которых функция f непрерывна:

- а) слева в точке $x_0=1;$ б) справа в точке $x_0=1.$ 13. Дана функция $f\colon (0,+\infty)\to \mathbb{R}, \ f(x)=\begin{cases} 4-a\ln x,\ x\geq 1,\\ 1+ax,\ x<1, \end{cases}$ $a\in \mathbb{R}.$
 - а) Найдите действительные значения параметра a, при которых функция fнепрерывна на $(0, +\infty)$.
 - б) При a=3 решите уравнение $f(x)+2f(x^2)=-3$ на промежутке $[1,+\infty)$.

Свойства непрерывных функций


Определение. Функция $f: E \to \mathbb{R}$ $(E \subseteq \mathbb{R})$ называется:

- а) **ограниченной сверху**, если ее образ $f(E) = \{f(x) | x \in E\}$ является множеством, ограниченным сверху, то есть существует $\overline{M} \in \mathbb{R}$ такое, что $f(x) \leq \overline{M}$, $\forall x \in E$.
- б) ограниченной снизу, если ее образ f(E) является множеством, ограниченным снизу, то есть существует $\overline{m} \in \mathbb{R}$ такое, что $\overline{m} \le f(x)$, $\forall x \in E$.
- в) **ограниченной**, если ее образ f(E) является ограниченным множеством, то есть существуют \overline{m} , $\overline{M} \in \mathbb{R}$ такие, что $\overline{m} \le f(x) \le \overline{M}$, $\forall x \in E$.

Числа $M = \sup_{x \in E} f(x)$ и $m = \inf_{x \in E} f(x)$ называются соответственно *точной верхией* гранью и точной нижней гранью функции f.

2.1. Свойства ограниченности

Непрерывные функции не обязательно являются ограниченными. Например, функция $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$, определенная на неограниченном промежутке, не ограничена сверху (рис. 3.7 а)). Но и непрерывная функция $g: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}, g(x) = \operatorname{tg} x$, несмотря на то что определена на ограниченном промежутке, не является ограниченной сверху (рис. 3.7 б)).



Отметим, что верным является следующий фундаментальный результат, из которого следует, что условие компактности множества E является существенным.

Теорема 4 (теорема Вейерштрасса об ограниченности).

Если $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ – непрерывная функция на отрезке, то:

- 1) f является ограниченной на этом отрезке;
- 2) f достигает на этом отрезке своих точных граней, то есть существуют $x_1, x_2 \in [a,b]$ такие, что $f(x_1) = m$ и $f(x_2) = M$, где m и M соответственно точная нижняя и точная верхняя грани функции f:

$$m = \inf_{x \in E} f(x), \ M = \sup_{x \in E} f(x).$$

Числа m и M называются соответственно наименьшим значением и наибольшим значением функции f на отрезке [a,b].


Примеры

1. Функция $f: [0,1] \to \mathbb{R}$, f(x) = x+1, непрерывна на отрезке [0,1].

Очевидно, что m = 1 = f(0) и M = 2 = f(1).

Итак, мы непосредственно проверили, что функция *f* достигает своих точных граней.

Сужение функции f на интервале (0, 1) не достигает на нем своих точных граней (рис. 3.8 а)).



- **2.** Дана функция $f: [1, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Тогда $f([1, +\infty)) = (0, 1]$ и функция f не достигает своей точной нижней грани m = 0 на промежутке $[1, +\infty)$ (рис. 3.8 б)).
 - **Замечания.** 1. Если функция $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ возрастает на отрезке [a, b], то m = f(a) и M = f(b), то есть функция f достигает своих точных граней на концах отрезка [a, b]. Аналогично, если функция f убывает на отрезке [a, b], то m = f(b) и M = f(a) (условие непрерывности функции f в этом случае не является необходимым).
 - **2.** Если функция $f:(a,b)\to \mathbb{R}$ возрастает на интервале (a,b), то $m=\lim_{x\to a+0}f(x)$, $M=\lim_{x\to b-0}f(x)$, а если функция f убывает на (a,b), то $m=\lim_{x\to b-0}f(x)$, $M=\lim_{x\to a+0}f(x)$.
 - 3. В общем возможны случаи: $m = \inf_{x \in E} f = -\infty$, $M = \sup_{x \in E} f = +\infty$.

2.2. Свойство Дарбу

Непрерывные функции, определенные на числовом промежутке, обладают следующим свойством: при переходе от одного значения функции к другому


функция проходит все промежуточные значения. Другими словами, если непрерывная функция f принимает два различных значения, то f принимает и все значения, содержащиеся между этими двумя.

Определение. Пусть I — некоторый промежуток. Будем говорить, что функция $f \colon I \to \mathbb{R}$ обладает свойством Дарбу¹ на промежутке I, если для любых точек α , β из I, $\alpha < \beta$, и любого числа λ , содержащегося между $f(\alpha)$ и $f(\beta)$, $f(\alpha) \neq f(\beta)$, существует хотя бы одна точка $c_{\lambda} \in (\alpha, \beta)$ такая, что $f(c_{\lambda}) = \lambda$.



Жан Гастон Дарбу


Геометрически это означает, что любое "промежуточное" значение λ , расположенное между $f(\alpha)$ и $f(\beta)$ по оси Oy соответствует значению функции хотя бы в одной из "промежуточных" точек c, расположенных между α и β по оси Ox. На рисунке 3.9 это показано на примере трех точек: c_1 , c_2 и c_3 .



Теорема 5 (первая теорема Больцано–Копи о прохождении функции через пуль). Пусть функция $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ непрерывна на отрезке [a,b] и принимает на его концах значения противоположных знаков: $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a,b)$ такая, что f(c) = 0.

Доказательство

Не ограничивая общности, предположим, что f(a) < 0 и f(b) > 0 (рис. 3.10). Разделим отрезок [a,b] пополам точкой $\frac{a+b}{2}$. Если $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, то теорема доказана и можно считать, что $c = \frac{a+b}{2}$. Если



$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$$
, то на концах одного из отрезков $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$, $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ функция принимает значения противоположных знаков. Обозначив этот отрезок через $\left[a_1, b_1\right]$, получим $f(a_1) < 0$, $f(b_1) > 0$.

Разделим на две равные части отрезок $[a_1, b_1]$ и опустим тот случай, когда функция f обращается в нуль в середине этого отрезка, так как в этом случае теорема доказана.

Обозначим через $[a_2,b_2]$ ту половину отрезка $[a_1,b_1]$, для которой $f(a_2) < 0$, $f(b_2) > 0$.

¹ Жан Гастон Дарбу (1842–1917) – французский математик.

Повторяем процесс деления отрезка пополам и предыдущие рассуждения.

Если после конечного числа шагов найдется точка, в которой функция f обращается в нуль, то теорема доказана. Предположим, что такой точки нет. В этом случае получим убывающую последовательность вложенных отрезков $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset ... \supset [a_n, b_n] \supset ...$, удовлетворяющих соотношениям:

$$f(a_n) < 0, f(b_n) > 0$$
 и $b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}$.

Последовательности $(a_n)_{n\geq 1}$ и $(b_n)_{n\geq 1}$ монотонны и ограничены (так как $a\leq a_1\leq a_2\leq ...\leq a_n\leq ...$, $b\geq b_1\geq b_2\geq ...\geq b_n\geq ...$) и $\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$.

Применив теорему Вейерштрасса (модуль 1, пункт 3.1), получим $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = c$, $c\in [a,b]$. Перейдя к пределу в неравенствах $f(a_n)<0$ $f(b_n)>0$ и учитывая непрерывность функции f в точке c, получим, что $f(c)=\lim_{n\to\infty} f(a_n)\leq 0$ и $f(c)=\lim_{n\to\infty} f(b_n)\geq 0$. Откуда следует, что f(c)=0.

Теорему 5 можно переформулировать следующим образом:

Теорема 5' (теорема Больцано-Коши о прохождении функции через нуль). Если функция f непрерывна на промежутке I и принимает противоположные значения в точках $a, b \in I$, то уравнение f(x) = 0 имеет хотя бы одно решение на интервале (a, b).

Теорема 6. Любая функция, непрерывная на промежутке, обладает свойством Дарбу на этом промежутке.

2.3. Применение свойств непрерывных функций при решении уравнений и неравенств

Согласно теореме 5', если функция $f: I \to \mathbb{R}$ непрерывна на отрезке $[a, b] \in I$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то уравнение f(x) = 0 имеет хотя бы одно решение $c \in (a, b)$. Если функция f еще и строго монотонна на отрезке [a, b], то решение c единственное на [a, b].

Пример

Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x} + 3x$. Покажем, что на отрезке [-1, 0] уравнение f(x) = 0 имеет единственное решение.

Решение:

Функция f непрерывна и строго возрастает на отрезке [-1,0] как сумма двух возрастающих функций. Кроме этого, $f(-1)\cdot f(0) = \left(\frac{1}{e^2} - 3\right)\cdot 1 < 0$.

Следовательно, существует единственное число $c \in (-1, 0)$ такое, что f(x) = 0.

Если $f: I \to \mathbb{R}$ $(I \subseteq \mathbb{R})$ – непрерывная функция на промежутке I и если f не обращается в нуль ни в одной точке $x \in I$ (то есть уравнение f(x) = 0 не имеет решений на промежутке I), то непременно функция f знакопостоянна на I, то есть f(x) > 0 или f(x) < 0 на этом промежутке.

Действительно, в противном случае существовали бы такие точки x_1 , x_2 из I, $x_1 < x_2$, что $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$, и тогда функция f обратилась бы в нуль в точке $c \in (x_1, x_2)$, которая принадлежит промежутку I, что противоречит условию.

В общем, чтобы определить знак функции f на некотором промежутке, необходимо решить неравенство вида f(x) > 0 (или f(x) < 0) и указать множество точек, на котором функция f принимает положительные (или отрицательные) значения.

Знак некоторых элементарных функций можно определить, применив *метод* интервалов. Предположим, что все нули непрерывной функции $f\colon I\to\mathbb{R}$ — это $x_1< x_2< ...< x_n...$, то есть $f(x_k)=0,\ k\in\mathbb{N}^*$ (их может быть бесконечное число). Тогда на каждом из интервалов $(x_1,x_2),(x_2,x_3),...,(x_{n-1},x_n),...$ функция f знакопостоянна, и, чтобы определить этот знак, достаточно из каждого интервала выбрать по одной точке и определить знак функции f в этой точке.

Задания с решением

у 1. Покажем, что любая функция-многочлен нечетной степени имеет хотя бы один нуль на множестве ℝ.

Решение:

Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = a_0 x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \ldots + a_{2n+1}, \$ и предположим, что $a_0 > 0$. Так как $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$, то существует x_1 , при котором $f(x_1) < 0$. Поскольку $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, значит, существует x_2 , $x_2 > x_1$, при котором $f(x_2) > 0$.

Поскольку $\lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$, значит, существует x_2 , $x_2 > x_1$, при котором $f(x_2) > 0$. Таким образом, функция f обращается в нуль между x_1 и x_2 , значит, существует хотя бы одна точка $c \in (x_1, x_2)$ такая, что f(c) = 0.

4. Покажем, что функция, заданная формулой $f(x) = x^5 + 7x^3 + 7$, имеет единственный нуль на отрезке [-1, 0].

Решение:

Функция f непрерывна и строго возрастает на отрезке [-1,0], так как является сум-мой двух строго возрастающих функций (заданных выражениями x^5 и $7x^3+7$) на отрезке [-1,0]. Поскольку f(-1)=-1, f(0)=1, то $f(-1)\cdot f(0)<0$. Следовательно, на отрезке [-1,0] уравнение f(x)=0 имеет единственное решение, так как данная функция строго возрастающая.

3. Покажем, что уравнение $\ln x + x = 0$ имеет единственное решение $x_0 \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$. *Решение*:

Рассмотрим функцию $f: \left[\frac{1}{e}, 1\right] \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \ln x + x$. Поскольку функция f непрерывна на отрезке $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$, то она обладает свойством Дарбу на этом отрезке. Из того, что $f\left(\frac{1}{e}\right) = \ln \frac{1}{e} + \frac{1}{e} = -1 + \frac{1}{e} < 0$ и $f(1) = \ln 1 + 1 = 1 > 0$, следует, что существует точка $x_0 \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$ такая, что $f(x_0) = 0$. Решение x_0 единственное, поскольку функция $g: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad g(x) = \ln x + x$, строго возрастает на этом отрезке, как сумма двух строго возрастающих функций.

4. На множестве \mathbb{R} решим неравенство $(x^2 - 9) \ln x > 0$.

Решение:

Нулями функции $f:(0,+\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x)=(x^2-9)\ln x$, являются 1 и 3. Функция f, будучи непрерывной на $(0, +\infty)$, знакопостоянна на каждом из интервалов $(0, 1), (1, 3), (3, +\infty)$. Пусть $\xi_1 = \frac{1}{2} \in (0, 1), \ \xi_2 = 2 \in (1, 3), \ \xi_3 = 4 \in (3, +\infty)$. Тогда

$$f(\xi_1) = \left(\frac{1}{4} - 9\right) \ln \frac{1}{2} > 0$$
, $f(\xi_2) = (4 - 9) \ln 2 < 0$, $f(\xi_3) = (16 - 9) \ln 4 > 0$.

Omsem: $S = (0, 1) \cup (3, +\infty)$.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

- **A**₁ 1. Дан промежуток I = [a, b] и функция $f: I \to \mathbb{R}$, какие из следующих случаев могут произойти?
 - а) f непрерывная, ограниченная и достигает свои точные грани.
 - б) f непрерывная и неограниченная.
 - в) f разрывная и достигает свои точные грани.
 - г) *f* разрывная, ограниченная и не достигает свои точные грани.
 - д) f разрывная, $f(a) \cdot f(b) < 0$, но уравнение f(x) = 0 не имеет решений на отрез-
 - e) f непрерывная, $f(a) \cdot f(b) > 0$ и уравнение f(x) = 0 имеет решения на отрезке [a, b].

Обоснуйте ответ, используя свойства непрерывных функций или приведя примеры.

2. Пусть функция $f: I \to \mathbb{R}$ непрерывна на промежутке I. Докажите, что функции

$$f_+ \colon I \to \mathbb{R}, \ f_+(x) = \begin{cases} f(x), \ \text{если} \ f(x) > 0, \\ 0, \ \text{если} \ f(x) \leq 0, \end{cases} \text{ и } f_- \colon I \to \mathbb{R}, \ f_-(x) = \begin{cases} f(x), \ \text{если} \ f(x) < 0, \\ 0, \ \text{если} \ f(x) \geq 0, \end{cases}$$

непрерывны на промежутке I. Постройте графики функций f_+ и f_- , если $I = \mathbb{R}$ и:

- $6) f(x) = \sin x;$
- B) $f(x) = 1 + x^2$: Γ) $f(x) = -e^x$.
- 3. $\begin{picture}(20,0) \put(0,0){\line(0,0){100}} \put(0,0){\line(0,0)$

а)
$$f(x) = \begin{cases} -1, \text{ если } x < 0, \\ \pi, \text{ если } x = 0, \\ 1, \text{ если } x > 0; \end{cases}$$
 б) $f(x) = \begin{cases} 2, \text{ если } x \neq 0, \\ \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}, \text{ если } x = 0, \end{cases}$

является разрывной и справа, и слева в точке x = 0.

Постройте график функции f.

4. Докажите, что функция f не обладает свойством Дарбу, если $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } x < 0, \\ 1 + x, & \text{если } x \ge 0; \end{cases}$$
 б) $f(x) = [x] - x;$

6)
$$f(x) = [x] - x$$
;

$$f(x) = \operatorname{sgn} x.$$

5. Функция $f: [-1,1] \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{2}{x}$, непрерывна и обладает свойством $f(-1) \cdot f(1) < 0$, и все же уравнение f(x) = 0 не имеет решений. Как это объяснить?

- **6.** Дана функция $f: [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, f непрерывная и $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1$. Покажите, что функция f ограниченная. Высказывание останется истинным, если промежуток $[0, +\infty)$ заменить на промежуток $(0, +\infty)$? Подтвердите ответ примером.
- **В**₁ 7. *Исследуйте!* Покажите, что непрерывная функция $f:(0, 2) \to \mathbb{R}$, $f(x) = 4x x^2$, ограничена на интервале (0, 2), но не достигает своих точных граней на (0, 2), а разрывная функция $g:(0, 2) \to \mathbb{R}$, g(x) = [x], достигает своих точных граней на этом интервале. Постройте графики этих функций.
 - - a) $(|x|-3)(\ln x+4)<0$;
 - 6) $(x^2 + 3x 4)(2^x 2) < 0$;
 - B) $(x^3 + 2x^2 4x + 1)(\lg x 10) > 0$.
 - **9.** Определите знак функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:
 - а) f(x) = x(x-a)(x-b)(x-c), где a, b, c константы и 0 < a < b < c;
 - 6) $f(x) = (x-1)(x^2+3x-4)(e^{x+4}-1)$.
 - 10. Определите знак функции:
 - a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3e^x 12$;
 - 6) $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = 6 3 \ln x;$
 - B) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = 5 \cdot 2^x 25;$
 - Γ) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = 2 \cdot 3^{2x} 3 \cdot 3^x + 1.$
- **C**₁ **11.** Покажите, что если $f:(a,b) \to \mathbb{R}$ ((a,b) конечный или бесконечный интервал) непрерывная функция и существуют конечные пределы $\lim_{x\to a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x\to b} f(x) = \beta$, где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то функция f ограничена на этом интервале.
 - **12.** Постройте функцию $f:(a, b) \to \mathbb{R}$, непрерывную и неограниченную на интервале (a, b).
 - **13.** Дана функция $f: [0,1] \to \mathbb{R}$

1)
$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ x - \frac{1}{2}, & \text{если } \frac{1}{2} < x \le 1; \end{cases}$$
 2) $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{если } 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ \frac{x}{3}, & \text{если } \frac{1}{2} < x \le 1. \end{cases}$

- а) Покажите, что функция f разрывна в точке $x = \frac{1}{2}$
- б) Постройте график функции f.
- в) Покажите, что функция f достигает своих точных граней и множеством ее значений является отрезок.
- **14.** *Работайте в парах!* Приведите пример непрерывной функции $f:(0,1) \to \mathbb{R}$, для которой множеством ее значений является:
 - а) отрезок;
 - б) интервал;
 - в) полуинтервал.


§3 Асимптоты функций

Пусть функция f определена на множестве E, которое является интервалом или объединением (конечным или бесконечным) интервалов. Если множество E неограничено или функция f неограничена, то ее графиком является неограниченное множество точек плоскости (то есть, не существует ни одного прямоугольника, который бы содержал полностью этот график). В этом случае говорят, что график функции f имеет неограниченные ветви.

Если одна из неограниченных ветвей графика функции f безгранично приближается к заданной прямой, то говорят, что эта прямая является асимптотой графика функции f. График функции может иметь горизонтальные, наклонные, вертикальные асимптоты.

3.1. Горизонтальные асимптоты


Рассмотрим функцию $f: E \to \mathbb{R}$, где множество E содержит интервал вида $(a, +\infty)$ или $+\infty$ является предельной точкой множества E. В этом случае, ветви графика функции f стремятся к бесконечности. Пусть l ($l \in \mathbb{R}$) — число, и рассмотрим прямую y = l (параллельную оси Ox). Для любого числа $x \in (a, +\infty)$ обозначим через P (через Q соответственно) точку с абсциссой x, принадлежащую прямой y = l (на графике функции f соответственно) (рис. 3.11).



Определение. Прямая y = l называется горизонтальной асимптотой графика функции f (функции f) при $x \to +\infty$, если длина отрезка PQ = |f(x) - l| стремится к нулю при $x \to +\infty$, то есть $\lim_{x \to +\infty} |f(x) - l| = 0$.

Это условие эквивалентно тому, что предел $\lim_{x\to +\infty} f(x)$ существует и равен $\lim_{x\to +\infty} f(x) = l$.

Аналогичное определение может быть сформулировано и для горизонтальной асимптоты графика функции f при $x \to -\infty$, если множество E содержит интервал вида $(-\infty, a)$ или $-\infty$ является предельной точкой множества E (рис. 3.12).



Если предел $\lim_{x\to +\infty} f(x)$ ($\lim_{x\to -\infty} f(x)$) не существует или равен бесконечности, то график функции f не имеет горизонтальной асимптоты при $x\to +\infty$ (при $x\to -\infty$ соответственно).

Задание с решением

 $\$ Определим горизонтальные асимптоты графика функции $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:


a)
$$f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$$
; 6) $f(x) = 2^x$; B) $f(x) = e^{x^2}$; r^*) $f(x) = x \sin x$.

Решение

- а) $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1$. Следовательно, прямая y=1 является горизонтальной асимптотой графика функции f при $x\to+\infty$ и при $x\to-\infty$.
- б) $\lim_{x\to\infty} 2^x = 0$. Значит, прямая y = 0 (ось Ox) является горизонтальной асимптотой графика функции f при $x\to-\infty$. Так как $\lim_{x\to+\infty} 2^x = +\infty$, то график функции f не имеет горизонтальной асимптоты при $x\to+\infty$.
 - в) Так как $\lim e^{x^2} = +\infty$, то график функции f не имеет горизонтальных асимптот.
- г) График функции f не имеет горизонтальной асимптоты ни при $x \to +\infty$, ни при $x \to -\infty$, так как не существуют пределы $\lim x \sin x$, $\lim x \sin x$.

3.2. Наклонные асимптоты

Даны функция $f: E \to \mathbb{R}$, где множеству E принадлежит интервал вида $(a, +\infty)$ (или $+\infty$ является предельной точкой множества E), и прямая $y = mx + n, m \neq 0$. Для любого $x \in (a, +\infty)$ обозначим через P (через Q соответственно) точку с абсциссой x, принадлежащую прямой $y = mx + n, m \neq 0$ (графику функции f соответственно) (рис. 3.13).



Определение. Прямая y = mx + n, $m \neq 0$, называется наклонной асимптотой графика функции f (функции f) при $x \to +\infty$, если длина отрезка PQ = |f(x) - (mx + n)| стремится к нулю при $x \to +\infty$, то есть $\lim_{x \to +\infty} (f(x) - (mx + n)) = 0$.

Теорема 6. Прямая y = mx + n, $m \neq 0$, является наклонной асимптотой графика функции $f: E \to \mathbb{R}$ при $x \to +\infty$ тогда и только тогда, когда $m = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad (m \neq 0)$ и $n = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - mx)$.

Пусть множеству E принадлежит интервал вида ($-\infty$, a) или $-\infty$ является предельной точкой множества E. Аналогично определяется понятие *наклонная* асимптота графика функции f при $x \to -\infty$ и доказывается теорема 6 для такого вида асимптот.

Задание с решением

🦴 Найдем наклонные асимптоты графика функции:

a)
$$f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1};$$

6)
$$f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2}{|x-1|};$$

B) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$.

Решение

a)
$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 1}{x(x+1)} = 1$$
 $M = \lim_{x \to \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \to \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x+1} - x \right) = \lim_{x \to \infty} \left($

 $=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+1-x^2-x}{x-1}=-1$. Значит, прямая y=x-1 является наклонной асимптотой графика функции f при $x\to+\infty$ и при $x\to-\infty$.

6)
$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{x(x-1)} = 1$$
 u $n = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2}{|x-1|} - x\right) = 1$


 $=\lim_{x\to +\infty} \frac{x^2-x^2+x}{x-1} = 1$. Следовательно, прямая y=x+1 является наклонной асимптотой графика функции f при $x\to +\infty$. Аналогично получим, что прямая y=-x-1 является наклонной асимптотой графика функции f при $x\to -\infty$.

в) График функции f не имеет наклонной асимптоты ни при $x \to +\infty$, ни при $x \to -\infty$, потому что $\lim_{x \to \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ и $\lim_{x \to \infty} \frac{\cos x}{x} = 0$, а также не существуют пределы $\lim_{x \to \infty} \sin x$ и $\lim_{x \to \infty} \sin x$.

3.3. Вертикальные асимптоты

Примеры

1. Рассмотрим функцию $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ (рис. 3.14). Заметим, что $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$ и, следовательно, прямая y = 0 является горизонтальной асимптотой графика функции f. При чтении графика функции f заметим, что при x, стремящемся к нулю, точка $M\left(x,\frac{1}{x}\right)$, x>0, принадлежащая графику, приближается к оси Oy. В этом случае говорят, что ось Oy, то есть прямая x=0 является вертикальной асимптотой графика функции f.




2. Пусть дана функция $f: (0,1) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{x(1-x)}$ (рис. 3.15).

Имеем
$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x(1-x)} = +\infty$$
 и $\lim_{x\to 1} f(x) = +\infty$.

Прямые x=0 и x=1 являются вертикальными асимптотами графика функции f .

Сформулируем строгое определение *вертикальной* асимптоты.

Пусть $f: E \to \mathbb{R}$ — некоторая функция и a — предельная точка множества E.




Определения. • Если предел слева $\lim_{x\to a-0} f(x)$ равен $+\infty$ или $-\infty$, будем говорить, что прямая x=a является **левой вертикальной асимптотой** графика функции f (функции f).

- Если предел справа $\lim_{x\to a+0} f(x)$ равен $+\infty$ или $-\infty$, будем говорить, что прямая x=a является **правой вертикальной асимптотой** графика функции f.
- Прямая x=a есть **вертикальная асимптота** графика функции f, если она является левой вертикальной асимптотой, правой вертикальной асимптотой или левой и правой вертикальной асимптотой.

Если прямая x = a является левой вертикальной асимптотой графика функции f, то длина отрезка PQ стремится к нулю при $x \rightarrow a - 0$, а ордината точки Q стремится к $-\infty$ (рис. 3.16 а)) или к $+\infty$ (рис. 3.16 б)).

Подобную геометрическую интерпретацию получим и для правой вертикальной асимптоты графика функции f. (Проиллюстрируйте!)



Замечание. Из определения делаем вывод, что вертикальные асимптоты графика функции $f \colon E \to \mathbb{R}$ отыскивают среди прямых $x = x_i$, где x_i – точки разрыва второго рода и/или конечные предельные точки множества E, которые не принадлежат E.

В частности, если E = (a, b) и функция f непрерывна на (a, b), то прямая x = a (x = b) является вертикальной асимптотой графика функции f тогда и только тогда, когда $\lim_{x \to b} f(x) = \infty$ (соответственно $\lim_{x \to b} f(x) = \infty$).

Задание с решением

🦫 Найдем вертикальные асимптоты графика функции:

a)
$$f: (-1, 1) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{x^2 - 1};$$

6)
$$f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}, f(x) = \operatorname{tg} x.$$

Решение:

а) Так как функция f непрерывна на интервале (-1, 1), вертикальными асимптотами графика функции f могут быть прямые x = 1 и x = -1.

Вычислим:
$$l_{\pi}(1) = \lim_{x \to 1-0} \frac{1}{x^2 - 1} = -\infty$$
, $l_{\pi}(-1) = \lim_{x \to -1+0} \frac{1}{x^2 - 1} = -\infty$.

Следовательно, прямые x = 1 и x = -1 являются вертикальными асимптотами графика функции f.

б) Мы установили (модуль 2), что


$$l_{\Pi}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2} - 0} \operatorname{tg} x = +\infty \text{ и } l_{\Pi}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2} + 0} \operatorname{tg} x = -\infty.$$


Значит, прямые $x = \frac{\pi}{2}$ и $x = -\frac{\pi}{2}$ являются вертикальными асимптотами графика функции f.


Упражнения и задачи

Реальный профиль

А. 1. Найдите асимптоты (горизонтальные, наклонные, вертикальные) графика функции $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$:







- 2. Приведите пример функции, вертикальными асимптотами графика которой являются прямые $x_k = k, k \in \mathbb{Z}$.
- В 3. (БАК, 2007). Заполните рамки, чтобы полученное высказывание было истинным. "Уравнением горизонтальной асимптоты при $x \to +\infty$ графика функции $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{7 - 9x + 8x^2}{3x^2 + 2x + 5}$, является _______.
 - **4.** Дана функция $f: \mathbb{R} \setminus \{c\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{ax^2 + bx + 3}{v c}, \ a, b, c \in \mathbb{R}.$ Найдите действительные значения параметров a, b, c такие, чтобы прямые, заданные уравнениями x = 2 и y = 3x + 1, были асимптотами графика функции f.
 - **5.** Найдите действительные значения a и b, при которых прямые x = 1 и x = 2 являются вертикальными асимптотами графика функции $f: D \to \mathbb{R}, \ D \subset \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x^2 + x + 2}{2x^2 + ax + b}$
- \mathbb{C}_1 6. Найдите асимптоты графика функции $f: D \to \mathbb{R}$, где D максимальная область определения функции:

a)
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$
;

6)
$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$
; B) $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$.

$$f(x) = e^{\frac{1}{x}}$$

7. Найдите асимптоты (горизонтальные, наклонные, вертикальные) графика функции:

a)
$$f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}};$$

 6) $f: (-2, 2) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4};$
B) $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{e^x - 1};$
 7) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}.$

6)
$$f: (-2, 2) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4};$$

B)
$$f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{e^x - 1}$$

$$\Gamma) f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}.$$

Упражнения и задачи на повторение

Реальный профиль

A₁ 1. Докажите, что функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ имеет хотя бы один нуль на указанном множестве:

a)
$$f(x) = -x^4 + 2x + 1$$
, \mathbb{R} ;

6)
$$f(x) = \operatorname{tg} x + \cos x - \frac{3}{2}$$
, $I = \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$;

B)
$$f(x) = \ln(1+x) + \sqrt{x} - 1$$
, $I = [0, 1]$.

2. Найдите точки разрыва и определите их род для функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \begin{cases} 2x+3, \text{ если } x \le 1, \\ x-1, \text{ если } x > 1, \end{cases}$$

a)
$$f(x) =\begin{cases} 2x+3, & \text{если } x \le 1, \\ x-1, & \text{если } x > 1; \end{cases}$$
 6) $f(x) =\begin{cases} \frac{1}{x-1}, & \text{если } x \ne 1, \\ 1, & \text{если } x = 1; \end{cases}$

B)
$$f(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{x^{2n} + x^3}{x^{2n} + 1}$$
;

$$\Gamma(x) = \begin{cases} e^{x^2}, & \text{если } x \le 0, \\ \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{nx} \right)^n, & \text{если } x > 0. \end{cases}$$

 $\mathbf{B_1}$ 3. Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} ae^x, \ \text{если} \ x \leq 0, \\ \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{b}}{x}, \ \text{если} \ x > 0. \end{cases}$

Найдите значения $a, b \in \mathbb{R}, b > 0$, если известно, что f непрерывна на \mathbb{R} .

4. Определите, является ли ограниченной функция $f:[0,+\infty)\to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \frac{x^2 + 5}{2x^2 + 1}$$
;

$$6) f(x) = \sin x^2;$$

$$f(x) = x + \sin x;$$

a)
$$f(x) = \frac{x^2 + 5}{2x^2 + 1}$$
; 6) $f(x) = \sin x^2$; B) $f(x) = x + \sin x$; $f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

- **5.** Даны непрерывные функции $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и $f(x) = g(x), \forall x \in \mathbb{Q}$. Докажите, что $f(x) = g(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
- **6.** $\stackrel{\circ}{\mathbb{C}}$ Работайте в парах! Найдите значения параметра $\alpha \in \mathbb{R}$, при которых функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 2\alpha x + \alpha^2}, & \text{если } x \ge 1, \\ \alpha x + 3, & \text{если } x < 1. \end{cases}$ непрерывна в точке $x_0 = 1$.
- \mathbb{C}_1 7. Функция $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x-1}$, обладает свойством $f(-2) \cdot f(2) < 0$, и все же уравнение f(x) = 0 не имеет решений. Как это объяснить?
 - **8.** Покажите, что уравнение f(x) = 0 имеет решение на указанном отрезке для функций: a) $f(x) = -x^3 + 8x + 30$, \mathbb{R} ; 6) $f(x) = x^4 - 3x + 1$, [0, 1]; B) $f(x) = (x - 2)\sin \pi x$, $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$
 - 9. Решите на множестве R неравенство:

a)
$$x^4 - 9x^2 > 0$$

6)
$$(x^2 - 16) \ln x < 0$$
;

B)
$$(|x|-1)(\ln x + 2) > 0$$
.

- **10.** Дано уравнение $x^3 + x^2 + mx 1 = 0$, $m \in \mathbb{R}$. Покажите, что для любого $m \in \mathbb{R}$ уравнение имеет одно решение на отрезке [-1, 1].
- **11.** Исследуйте! Найдите значение параметра $a, a \in \mathbb{R}$, при котором график функции $f: D \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x^2 1}{x^2 + x + a}$, где D максимальная область определения функции f, имеет одну вертикальную асимптоту.

- **12.** Проверьте, имеет ли график функции асимптоты, и дополните места, указанные пунктиром.
 - а) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$. Так как $\lim_{x \to x_0} f(x) = \limsup_{x \to x_0} x = \sin x_0$, $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, и $\nexists \lim_{x \to \infty} f(x)$ и $\nexists \lim_{x \to \infty} f(x)$, следует, что график функции f ..., но возможно, что график функции f имеет наклонную асимптоту. Поскольку $m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ и $n = \lim(f(x) mx) = \limsup x$ не существует, то график функции f ...
 - б) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = e^{-x}$. Так как $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} e^{-x} = e^{-x}, \ \forall x_0 \in \mathbb{R}, \ \text{следует, что прямая} \ x = x_0$... Поскольку $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} e^{-x} = +\infty$, то график функции f ... Исходя из того, что $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} e^{-x} = 0$, следует, что прямая x = 0 является ...
 - в) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \ln x, \text{ если } x > 0, \\ 1, \text{ если } x \leq 0. \end{cases}$ Так как $\lim_{x \to -0} f(x) = 1$, а $\lim_{x \to +0} f(x) = -\infty$, следует, что прямая x = 0 является ... Поскольку $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, то при $x \to +\infty$ график функции f ...

Итоговый тест

Время выполнения работы: 45 минут

Реальный профиль

- **1.** Дана непрерывная функция $f:[a,b] \to \mathbb{R}$. Найдите истинностное значение высказывания:
 - "Функция ограничена, но не достигает своих точных граней".

И/Л

- **2.** Дана функция $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} ax + b, \ \text{если} \ x < 0, \\ 1, \ \text{если} \ x = 0, \\ c \cdot \cos x + d, \ \text{если} \ x > 0, \end{cases}$ $a, b, c \in \mathbb{R}.$
 - 1) Найдите действительные значения параметров a, b, c, d, при которых:
 - а) функция f непрерывна слева в точке x = 0;

4

4

(3)

б) функция f непрерывна справа в точке x = 0;

в) функция f непрерывна в точке x = 0.

- 4
- 2) Для случаев a) и б) найдите скачок функции f в точке x = 0.
- **3.** Покажите, что уравнение $\ln x + 2x = 0$ имеет одно решение x_0 на интервале $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$
- **4.** Решите на множестве **R** неравенство:
 - a) $x^4 4x^2 < 0$;

4

6) $(x^2 - 4) \ln x > 0$.

- **4 5**
- **5.** Найдите асимптоты графика функции $f: (-1, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt{\frac{1}{x+1}}.$

Схема опенивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	36–35	34–31	30–27	26–22	21-17	16–11	10–7	6–4	3–2	1-0

Непрерывные функции

Определение непрерывности

она непрерывна в любой точке непрерывной на множестве Е, если называетя непрерывной в точке Функция $f \colon E \to \mathbb{R}$ называется $x_0 \in E$, если $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. Функция $f: E \to \mathbb{R} \ (E \subseteq \mathbb{R})$

Признаки непрерывности

рывна в точке $x_0 \in E$, если верно Функция $f: E \to \mathbb{R} \ (E \subseteq \mathbb{R})$ непреодно из высказываний:

- 1. $f(x_0 + 0) = f(x_0 0) = f(x_0)$.
- 2. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для всех $x \in E$ из $|x-x_0| < \delta$ следует, что
- 3. Для любой последовательности $(x_n)_{n\geq 1}, x_n \in E$, m3 tofo, 4to $x_n \to x_0$ CIELLYET, 4TO $f(x_n) \to f(x_0)$ IIPM $n \to \infty$ $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ (Komm).

Классы непрерывных функций

- 1. Пусть ∫ и g непрерывные функции. Тогда $\alpha f (\alpha \in \mathbb{R}), f + g, f \cdot g,$ $\frac{J}{g}$ $(g(x) \neq 0)$ – непрерывные функ-
- 2. Композиция двух непрерывных функций есть непрерывная функция.
- 3. Любая элементарная функция непрерывна на своей области определения.

3. Любая функция, непрерывная на промежутке,

обладает свойством Дарбу на этом промежутке.

Непрерывность слева (справа)

непрерывной слева (справа) в точке $x_{\scriptscriptstyle 0} \in E$, если существует ее предел слева (справа) в точке x_0 Функция $f \colon E \to \mathbb{R} \ (E \subseteq \mathbb{R})$ называется $M f(x_0 - 0) = f(x_0) (f(x_0 + 0) = f(x_0)).$

является горизонтальной асимптотой графика функции f при $x \to +\infty$ (при $x \to -\infty$).

Если $\lim f(x) = l \pmod{f(x)} = l$, то прямая y = l

_:

Асимптоты

Классификация точек разрыва

Если функция / не является непрерывной в точке $x_0 \in E$, то x_0 называется точкой разрыва этой функции.

пределы функции f в точке x_0 существуют и Гочка разрыва х₀ называется точкой разрыва первого рода функции f, если односторонние конечны, однако $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$ или

Если существуют и являются конечными

пределы

 $\bar{\circ}$

то прямая y = mx + n, $m \neq 0$, является наклонной асимптотой графика функции f при

 $x \to +\infty \text{ (IIPM } x \to -\infty).$

 $m = \lim \frac{f(x)}{(m \neq 0)} \ (m \neq 0) \ \text{if } n = \lim (f(x) - mx),$


 $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) \neq f(x_0)$

Разность $f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$ называется скачком функции в точке х₀.

Точка разрыва х₀ называется гочкой разрыва второго рода функции, если хотя бы один из односторонних пределов $f(x_0 + 0)$, $f(x_0 - 0)$ равен бесконечности или не существует.

Свойства непрерывных функций

- ке, является ограниченной на этом отрезке и $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на отрезке [a, b] и 1. Первая теорема Вейерштрасса об ограничен-2. Первая теорема Больцано-Коши о прохождении функции через нуль. Пусть функция $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда существует хотя бы одна ности. Любая функция, непрерывная на отрездостигает своих точных граней на этом отрезке. гочка $c \in (a, b)$ такая, что f(c) = 0.
- то прямая x = a является **левой** (**правой**) **вер**гикальной асимитотой графика функции f. Если $\lim_{x \to \infty} f(x) \left(\lim_{x \to \infty} f(x) \right)$ равен + ∞ или - ∞ , 0





функции функции функции функции функции формальный форм

Цели

- *применение в различных контекстах, в том числе в общении, терминологии, соответствующей понятиям *производная функции* и *дифференциал функции*;
- *применение определения производной функции при вычислении производных некоторых элементарных функций; применение полученных формул в различных контекстах; *применение правил дифференцирования функций и формул производных при решении задач;
- *вычисление дифференциалов некоторых элементарных функций и применение полученных формул в различных контекстах;
- *применение свойств дифференцируемых функций при решении задач;
- *постижение методов дифференциального исчисления, как качественно новых методов решения различных теоретических и практических проблем, распознавание и объяснение процессов и явлений, используя производную функции, дифференцируемые функции и дифференциал функции.



И. Ньютон

Для решения некоторых математических задач (исследование функции и построение ее графика, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции и др.), задач из физики (вычисление скорости и ускорения материальной точки, определение напряжения электрического тока, вычисление линейной плот-

ности массы металлического стержня и др.), задач из экономической области (задачи о стоимости и прибыли), а также задач с применением приближенных методов вычисле-

ний и многих других задач, которые приводят к нахождению разности значений функций в двух точках, применяется одно из фундаментальных понятий *математичес-кого анализа* — понятие *производная функции*. Принято считать, что это понятие одновременно ввели ученые И. Ньютон¹ и Г. В. Лейбниц².



Г. В. Лейбниц

Раздел математики, в котором изучаются производные и их применение в исследовании функций, называется дифференциальным исчислением.

¹ Исаак Ньютон (1642–1727) – английский математик, физик и астроном.

² Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) – немецкий математик и философ.

§1 Производная функции

Понятие производная функции основывается на понятиях приращение аргумента и приращение функции.

1.1. Приращение аргумента и приращение функции

Пусть функция $f: I \to \mathbb{R}$ определена на интервале $I \subseteq \mathbb{R}, \ x_0 \in I$, а x – произвольная точка некоторой окрестности точки x_0 .

Определение. Разность $x - x_0$ называется **приращением аргумента** в точке x_0 .

Обозначают: $x - x_0 = \Delta x$.

Определение. Разность $f(x) - f(x_0)$ называется приращением функции f в точке x_0 , соответствующим приращению Δx .

Обозначают: $f(x) - f(x_0) = \Delta f(x_0)$ или $f(x) - f(x_0) = \Delta f$.

Из $x - x_0 = \Delta x$ следует, что $x = x_0 + \Delta x$.

Тогда
$$f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta f(x_0)$$
.

Задание с решением

 \P Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = 2x. Найдем приращения Δx и Δf , если $x_0 = 1$ и:

a)
$$x = 1.5$$
; 6) $x = 0.9$.

Решение:

a)
$$\Delta x = x - x_0 = 1.5 - 1 = 0.5;$$


 $\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(1.5) - f(1) = 2 \cdot 1.5 - 2 \cdot 1 = 1;$

6)
$$\Delta x = x - x_0 = 0.9 - 1 = -0.1;$$

$$\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0) = 2 \cdot 0.9 - 2 \cdot 1 = -0.2.$$

Замечание. Приращения аргумента, а также приращения функции могут быть положительными, отрицательными или равными нулю.

Геометрический смысл приращений Δx и $\Delta f(x_0)$ изображен на рисунке 4.1.



1.2. Задачи, приводящие к понятию производной

Две классические задачи, одна – из геометрии (задача о касательной к кривой на плоскости) и другая – из физики (задача о мгновенной скорости материальной точки) привели к понятию *производная функции*. Эти задачи были предложены и решены Г. В. Лейбницем и И. Ньютоном соответственно.

1.2.1. Касательная к графику функции (к кривой на плоскости)


Пусть I – интервал и $f: I \to \mathbb{R}$ – непрерывная функция.

Замечание. Функция непрерывна на промежутке, если ее график на этом промежутке можно построить, не отрывая карандаш от бумаги.

Графиком $G_f = \{(x, f(x)) | x \in I\}$ функции f является кривая, заданная уравнением y = f(x) (рис. 4.2). Пусть $x_0 \in I$, точки $A(x_0, f(x_0)) \in G_f$, $B(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x)) \in G_f$ и прямая AB — секущая (графика G_f), образующая с осью Ox угол B. Когда точка B стремится по кривой G_f к точке A, то есть при $\Delta x \to 0$, секущая AB занимает различные положения $(AB_1, AB_2, ..., AT)$.

Будем говорить, что прямая AT является *касательной* к графику функции f в точке $A(x_0, f(x_0))$, если она совпадает с предельным положением (если такое существует) секущей AB при $\Delta x \to 0$ (рис. 4.2).

Касательная к графику функции f в точке $A(x_0, f(x_0))$ задана, если известен ее угловой коэффициент.



Напомним!

Угловой коэффициент т прямой y = mx + b равен тангенсу угла, образованного этой прямой с положительным направлением оси Ox.

Из ΔACB (m($\angle C$) = 90°) (рис. 4.2) находим угловой коэффициент $m(\Delta x)$ секущей AB:

$$m(\Delta x) = \operatorname{tg}\beta(\Delta x) = \frac{BC}{AC} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}.$$
 (1)

Переход к пределу в формуле (1) при $\Delta x \to 0$ приводит к исследованию предела:

$$\lim_{\Delta x \to 0} m(\Delta x) = \lim_{\Delta x \to 0} \operatorname{tg} \beta(\Delta x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$


Конечное значение этого предела (если предел существует) является угловым коэффициентом касательной к графику функции f в точке $(x_0, f(x_0))$. Следовательно,

$$\lim_{\Delta x \to 0} \operatorname{tg} \beta(\Delta x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \operatorname{tg} \alpha = m.$$
 (2)

Итак, задача о существовании касательной к графику функции f в заданной точке $A(x_0, f(x_0))$ равносильна задаче существования предела (2).

1.2.2. Мгновенная скорость материальной точки

Пусть материальная точка движется по оси lв положительном направлении, согласно закону s = s(t), где s(t) – абсцисса точки, в которой находится материальная точка в момент времени t. Другими словами, абсцисса выражает расстояние, пройденное материальной точкой за время t (рис. 4.3).



Если движение материальной точки равномерное (скорость – постоянная), то для любых моментов времени $t_0, t_1 \ (t_1 \neq t_0)$ значение отношения $\frac{s(t_1) - s(t_0)}{t_1 - t_0}$ постоян-

но и равно скорости материальной точки.

Если же движение материальной точки не равномерное, то ее скорость уже не постоянна. Пусть t_0 – заданный момент времени. Отношение $\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}$ (3) называется *средней скоростью* движения материальной точки за промежуток времени $[t_0, t]$, где $t_0 \neq t_1$.

На практике равномерных движений не бывает, но при малых промежутках времени движение почти равномерно. Другими словами, при $t \to t_0$, где $t \neq t_0$, соответствующее значение средней скорости стремится к некоторому определенному значению, которое в физике и называют меновенной скоростью материальной точки в момент времени t_0 .

Итак, определяем мгновенную скорость $v(t_0)$ материальной точки в момент времени t_0 как предел (если таковой существует), к которому стремится отношение (3) при $t \to t_0$, то есть: $v(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}.$

(4)

Аналогично, если v(t) – мгновенная скорость материальной точки в любой момент времени t, мгновенное ускорение $a(t_0)$ материальной точки в момент времени t_0 определяется как предел (если таковой существует), к которому стремится (4) при $t \to t_0$, то есть: $a(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{v(t) - v(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}.$

(5)

Эти примеры доказывают значимость предела отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю, то есть предела

 $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$ (6)

1.3. Понятие производной функции в точке

Определение. Пусть интервал $I \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in I$ и $f: I \to \mathbb{R}$. $f: I \to \mathbb{R}$ некоторая функция. Будем говорить, что функция f имеет производную в **точке** x_0 , если существует предел $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

Этот предел называется *производной функции* f g *точке* x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Если, кроме этого, предел конечен, то функция f называется дифференцируемой в точке x_0 .

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \text{или} \quad f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \tag{7}$$

Обозначение $f'(x_0)$ читается: Эф штрих в точке x_0 .

Замечания. 1. Если предел (7) существует и бесконечен или не существует, то функция f не дифференцируема в точке x_0 .

- 2. При исследовании дифференцируемости функции в некоторой точке рассматриваются только те значения функции, которые соответствуют точкам, принадлежащим некоторой окрестности этой точки. Исходя из этого, говорят, что *дифференцируемость функции*, аналогично пределу функции и *непрерывности функции, является локальным свойством этой функции.
- 3. В дальнейшем будем рассматривать производную функции на интервале I(если не указывается что-либо другое).

Внимание! 1. Относительно примеров из физики (формулы (4) и (5)), делаем вывод, что:

- а) $v(t_0) = s'(t_0)$ мгновенная скорость материальной точки в момент времени t_0 равна значению производной от расстояния в t_0 ;
- б) $a(t_0) = v'(t_0)$ мгновенное ускорение материальной точки в момент времени t_0 равно значению производной от скорости в t_0 .
- **2.** Формулы v(t) = s'(t) и a(t) = v'(t) выражают механический (физический) смысл производной: производная от расстояния (пути) s по времени t есть скорость v, а производная от скорости v по времени t есть ускорение a материальной точки.

Определения. • Будем говорить, что функция $f: I \to \mathbb{R}$ $(I \subseteq \mathbb{R})$ диффе**ренцируема на множестве** M ($M \subseteq I$), если она дифференцируема в любой точке множества M.

- В данном случае функция $f': M \to \mathbb{R}$, которая ставит в соответствие каждой точке $x \in M$ действительное число f'(x), называется производной функции fна множестве М.
- Нахождение производной функции f называется д**ифференцированием**.

Замечание. Производная функции f обозначается: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ (f), y', f', где y = f(x).

Задание с решением

 \P Покажем, что функция $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ дифференцируема на множестве \mathbb{R} , и найдем ее производную, если:

a)
$$f(x) = 2x$$
; 6) $f(x) = x^2$.

$$f(x) = x^2$$

Решение:

- а) Функция, заданная формулой f(x) = 2x, дифференцируема в любой точке множества \mathbb{R} , поскольку предел $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2(x_0 + \Delta x) - 2x_0}{\Delta x} = 2$ существует для любого $x_0 \in \mathbb{R}$. Значит, f'(x) = (2x)' = 2 для любого $x \in \mathbb{R}$
- б) Функция, заданная формулой $f(x) = x^2$, дифференцируема в любой точке множества \mathbb{R} , так как предел $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x}$ $=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0 \text{ существует для любого } x_0 \in \mathbb{R}. \text{ Значит,}$ $(x^2)' = 2x$ для любого $x \in \mathbb{R}$.

Исходя из определения производной, сформулируем следующий алгоритм нахождения производной функции $f: I \to \mathbb{R}$ в точке и на множестве:

- ① Выбираем произвольное приращение Δx аргумента x в точке x_0 так, что $x_0 + \Delta x \in I$.
- 2 Находим приращение функции f в точке x_0 : $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) f(x_0)$.
- $\Delta f = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) f(x_0)}{\Delta x}$
- **④** Вычисляем предел этого отношения: $\lim_{\Lambda_{\nu}\to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) f(x_0)}{\Lambda_{\nu}} = f'(x_0)$.
- © Исследуем функцию f на дифференцируемость на интервале I.

Определение. Пусть $f: I \to \mathbb{R}$ – некоторая функция. Множество точек, в которых функция f дифференцируема, называется областью дифференцируемости функции f.

Обозначают: $D_{t'}$. Очевидно, что $D_{t'} \subseteq I$.

3амечание. В случаях, когда для функции f не указана ее область определения, будем считать, что речь идет о ее максимальной области определения.

1.4. Дифференцируемость и непрерывность

Теорема 1 (необходимое условие существования производной функции в точке). Если функция дифференцируема в данной точке, то она непрерывна в этой точке.


Доказательство

Пусть $f: D \to \mathbb{R}$ и $x_0 \in D$, где x_0 – точка, в которой функция f дифференцируе-

ма, то есть существует предел (6) и этот предел конечен. Из соотношения $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot \Delta x$, $\Delta x \neq 0$, $x \in D$, следует, что $\lim_{\Delta x \to 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x = f'(x_0) \cdot 0 = 0.$ Значит, $\lim_{\Delta x \to 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$, то есть $\lim_{\Delta x \to 0} f(x) = f(x_0)$, откуда следует, что функция f непрерывна в точке x_0 .

Обратное утверждение неверно. Например, функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = |x|$, непрерывна в точке $x_0 = 0$, но не дифференцируема в этой точке (рис. 4.4).

ференцируема в этои точке (рис. 4.4). Чтобы доказать это утверждение, найдем предел отношения $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{|x|}{x}$ в точке $x_0=0$. Вычислим односторонние пределы функции f в точке x_0 :



$$\lim_{x \to x_0 - 0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to x_0 - 0} \frac{-x}{x} = -1, \quad \lim_{x \to x_0 + 0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \to x_0 + 0} \frac{x}{x} = 1.$$

Так как $\lim_{x \to x_0 - 0} \frac{|x|}{x} \neq \lim_{x \to x_0 + 0} \frac{|x|}{x}$, следует, что предел отношения $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ в точ-

ке $x_0 = 0$ не существует. Значит, функция f непрерывна в $x_0 = 0$, но не дифференцируема в этой точке.

1.5. Односторонние производные функции

В некоторых случаях целесообразно рассматривать односторонние пределы отношения $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

Определение. Пусть $f: I \to \mathbb{R}$ (I – интервал) и $x_0 \in I$. Предел $\lim_{x \to x_0 = 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ (если таковой существует), конечный или бесконечный, называется левой производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'_{\pi}(x_0)$.

Basicho 3hamb:
$$f'_{\pi}(x_0) = \lim_{x \to x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$
. (8)

Определение. Пусть $f: I \to \mathbb{R}$ (I– интервал) и $x_0 \in I$. Предел $\lim_{x \to x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ (если таковой существует), конечный или бесконечный, называется правой производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'_n(x_0)$.

Важно знать:
$$f'_{n}(x_{0}) = \lim_{x \to x_{0}+0} \frac{f(x) - f(x_{0})}{x - x_{0}}$$
. (9)

Определение. Функция $f: I \to \mathbb{R}$ называется дифференцируемой слева (соответственно дифференцируемой справа) в точке $x_0 \in I$, если предел (8) (соответственно предел (9)) существует и конечен.

Итак, функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = |x|, дифференцируема слева и справа в точке $x_0 = 0$: $f'_n(0) = -1$, $f'_n(0) = 1$.

Напомним, что один из критериев существования предела функции в точке – это равенство односторонних пределов этой функции в данной точке.

Подобный критерий есть и для исследования дифференцируемости функции в данной точке.

Теорема 2. Пусть $I \subseteq \mathbb{R}, \ x_0 \in I$. Функция $f \colon I \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда она дифференцируема слева и справа в точке x_0 и $f_n'(x_0) = f_n'(x_0)$. В этом случае $f_n'(x_0) = f_n'(x_0) = f'(x_0)$.

Доказательство теоремы 2 следует непосредственно из теоремы 2 модуля 2, раздела 1.3.

Замечание. Пусть $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ — некоторая функция. В точке a речь идет только о производной справа, а в точке b — только о производной слева. Не имеет смысла говорить о производной слева в точке a и — справа в точке b.

Примеры

- **1.** Для функции f(x) = |x| имеем $f'_{\pi}(0) = -1$ и $f'_{\pi}(0) = 1$. Так как $f'_{\pi}(0) \neq f'_{\pi}(0)$, то функция f не дифференцируема в точке $x_0 = 0$.
- **2.** Функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{2|x-1|}$, не дифференцируема в точке $x_0 = 1$, так как ее производные слева и справа в этой точке существуют, но бесконечны. Проверьте!
- **3.** Пусть функция $f: [0,1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x, \text{ если } 0 \le x < 1, \\ 0, \text{ если } x = 1. \end{cases}$ Существует $f'_{\pi}(0) = 1$, но не существует $f'_{\pi}(1)$, поскольку функция f даже не является непрерывной в точке x = 1.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

A₁ **1.** Найдите приращение аргумента и приращение функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^2$, в точке $x_0 = \frac{1}{2}$, если: а) x = 2; б) x = 0,7; в) $x = -\sqrt{3}$; г) x = -4,2.

2. Найдите производную $D_{t'}$ функции:

a)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
, $f(x) = -\frac{1}{2}$;

6)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = 3x - 1;$$

B)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = 3x^2$$
;

$$\Gamma) f: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{x}.$$

- **3.** Вычислите, используя определение производной, f'(-1), f'(0), $f'\left(\frac{1}{2}\right)$, f'(10), если: a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = 0.5x;$ б) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = -2x + 3.$
- 4. *Работайте в парах!* Постройте прямые, проходящие через точку (1, 3) и имеющие угловые коэффициенты:

a)
$$-1$$
 и $\sqrt{3}$;

б) 1 и
$$-\sqrt{3}$$
;

в) 0 и
$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$
.

В каждом случае определите, какой тип угла образуют эти прямые с положительным направлением оси абсцисс.

В₁ **5.** Исследуйте на дифференцируемость функцию $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = |x-2|$$
, B $x_0 = 2$;

6)
$$f(x) = |x^2 - 4|$$
, B $x_0 = -2$, $x_1 = 2$;

B)
$$f(x) = \sqrt{x-1}$$
, B $x_0 = 1$.

6. Вычислите односторонние производные функции $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x + |x|$$
, $x_0 = 0$, $x_1 = -2$

a)
$$f(x) = x + |x|$$
, $x_0 = 0$, $x_1 = -2$; 6) $f(x) = x - \frac{1}{x}$, $x_0 = -1$, $x_1 = 1$;

B)
$$f(x) = \sqrt{2x-1}$$
, $x_0 = 0.5$, $x_1 = 1$; r) $f(x) = 1 - \sqrt{x}$, $x_0 = -1$, $x_1 = 0$.

$$f(x) = 1 - \sqrt{x}, \quad x_0 = -1, \quad x_1 = 0.$$

7. Исследуйте! Исследуйте, в точке $x_0 = 0$, на непрерывность и дифференцируемость функцию $f: D \to \mathbb{R}$: a) $f(x) = |\sin x|$; б) $f(x) = |\cos x|$;

в)
$$f(x) = \frac{2}{|x+1|}$$
; г) $f(x) = \begin{cases} x^2, \text{ если } x \le 0, \\ 2x^2 + x, \text{ если } x > 0. \end{cases}$

- **С**₁ **8.** Найдите:
 - Найдите: а) $m \in \mathbb{N}^*$, при котором функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ дифференцируема в) $x_0 = 0$; б) $n \in \mathbb{N}^*$, при котором функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^n \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ дифференцируема в) $x_0 = 0$.


 - **9.** Найдите $m, n \in \mathbb{R}$, при которых функция $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 2 \ln x, \text{ если } 0 < x \le e, \\ mx + n. \text{ если } x > e \end{cases}$ дифференцируема в любой точке $x \in (0, +\infty)$.
 - 10. Найдите значения действительных параметров a, b и c, при которых функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} e^x, \text{ если } x < 0, \\ ax^2 + bx + c, \text{ если } x > 0 \end{cases}$ дифференцируема в точке $x_0 = 0$.

Геометрический смысл производной

Пусть $f: I \to \mathbb{R}$ $(I \subseteq \mathbb{R})$ – дифференцируемая функция в точке $x_0 \in I$ и G_f – ее график $f(x_0 + \Delta x)$ (рис. 4.5).

Рассмотрим без доказательств две теоремы.

Теорема 3. Если функция f дифференцируема в точке x_0 , то к ее графику можно провести (невертикальную) касательную в точке $(x_0, f(x_0))$, причем угловой коэффициент этой касательной равен $f'(x_0)$.



Теорема 4. Если в точке $(x_0, f(x_0))$ графика функции f можно провести невертикальную касательную, то функция f дифференцируема в точке x_0 , и угловой коэффициент т этой касательной равен значению производной функции f в точке x_0 ($m = f'(x_0)$).

Геометрический смысл производной функции f, дифференцируемой в точке x_0 , следует из теорем 3 и 4: существование конечной производной функции f в точке x_0 равносильно существованию касательной (невертикальной) в точке $(x_0, f(x_0))$ графика функции f, причем угловой коэффициент этой касательной равен $f'(x_0)$.

Важно знать: Касательная к графику дифференцируемой в точке x_0 функции f есть прямая, проходящая через точку $(x_0, f(x_0))$, угловой коэффициент m которой равен $f'(x_0)$, то есть $m = f'(x_0) = \lg \alpha$.

Запишем теперь уравнение касательной к графику дифференцируемой функции f в точке $(x_0, f(x_0))$. Зная, что уравнение прямой, имеющей угловой коэффициент $f'(x_0)$, имеет вид: $y = f'(x_0) \cdot x + b$, найдем коэффициент b. Так как касательная проходит через точку $(x_0, f(x_0))$, то $f(x_0) = f'(x_0) \cdot x_0 + b$, откуда $b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$. Таким образом, **касательная** к графику дифференцируемой в точке x_0 функции f есть **прямая**, уравнение которой имеет вид:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$
 (*)

Задания с решением


5. 1. Запишем уравнение касательной к графику функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^2$, в точке с абсциссой $x_0 = 2$.

Решение:


 $f'(x) = (x^2)' = 2x$. Тогда $f'(x_0) = 2 \cdot 2 = 4$, а $f(x_0) = 2^2 = 4$. Подставив эти значения в (*), получим $y = 4 + 4 \cdot (x - 2) \Leftrightarrow y = 4x - 4$ – искомое уравнение касательной.

Замечание. Если $f'(x_0) = \infty$ ($f'(x_0) = +\infty$ или $f'(x_0) = -\infty$), то касательная в точке $(x_0, f(x_0))$ графика G_f непрерывной в точке x_0 функции f параллельна оси Oy, то есть уравнение касательной имеет вид: $x = x_0$.

Если $f'(x_0) = +\infty$, то в окрестности точки $A(x_0, f(x_0))$ график G_f имеет форму, указанную на рисунке 4.6:



Если $f'(x_0) = -\infty$, то в окрестности точки $A(x_0, f(x_0))$ график G_f имеет форму, указанную на рисунке 4.7:



5. Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Найдем величину угла, образованного касательной к графику G_f в точке с абсциссой x_0 и положительным направлением оси Ox, если: a) $x_0 = 0$; б) $x_0 = \frac{1}{2}$.

Решение:


Поскольку угловой коэффициент касательной есть $m = \operatorname{tg} \alpha = f'(x_0)$, где α – величина угла, образованного касательной к графику G_f в точке с абсциссой x_0 и положительным направлением оси Ox, получим:


а)
$$\lg \alpha = f'(0) = 2 \cdot 0 = 0$$
, значит, $\alpha = 0$; б) $\lg \alpha = f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, значит, $\alpha = \frac{\pi}{4}$.


${f y}$ пражнения и задачи

Реальный профиль

А₁ 1. Диследуйте! Используя геометрический смысл производной функции, определите, дифференцируема ли функция f в точках, указанных на рисунке:







- 2. Работайте в парах! Постройте график непрерывной функции, не дифференцируемой в точках $x_0 = 3$ и $x_1 = 5$.
- 3. Используя определение производной (или соответствующую формулу), запишите уравнение касательной к графику функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^3$$
, $x_0 = 1$

6)
$$f(x) = 2x^2 - 1$$
, $x_0 = 0$

4. Найдите величину угла, образованного касательной к графику функции f в точке с абсциссой x_0 и положительным направлением оси Ox:

a)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^3, \ x_0 = 0;$$

6)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}x^2, \ x_0 = 1.$$

5. Работайте в парах! Постройте график функции при условии, что касательная к этому графику в точке с абсциссой $x_0 = -1$ задана уравнением:

a)
$$y = 0$$
;

6)
$$y = 2$$
.

 ${\bf B}_1$ 6. Исследуйте на дифференцируемость функцию f в указанных точках и изобразите графически полученный результат:

a)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
, $f(x) = |x^2 - 9|$, $x_0 = -3$, $x_1 = 3$;

6)
$$f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = |\lg x - 1|, x_0 = 10.$$

7. Используя определение производной, напишите уравнение касательной к графику функции:

a)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
, $f(x) = x^2 + 2x + 1$, B: 1) $x_0 = -0.5$, 2) $x_0 = 2$, 3) $x_0 = -5$;

6)
$$f: \mathbb{R} \to [-1, 1], \ f(x) = \sin x, \ \text{B:} \ 1) \ x_0 = \frac{\pi}{4}, \quad 2) \ x_0 = \frac{\pi}{3}, \quad 3) \ x_0 = -\frac{\pi}{6}.$$

8. $\begin{cases} \ragged Pa6omaŭme в парах! \end{cases}$ а) Найдите для каждой из функций f,g,h: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x^2, \text{ если } x \ge 0, \\ 2x^2 - x, \text{ если } x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, \text{ если } x \ge 0, \\ x^2, \text{ если } x < 0, \end{cases} \quad h(x) = |x^2 - 9|:$$

- 1) множество точек, на котором функция непрерывна;
- 2) множество точек, на котором функция дифференцируема.
- б) Постройте графики этих функций.
- **9.** К графику функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = -2x^2 + 8x 9$, проведена касательная, параллельная оси абсцисс. Найдите координаты точки касания.
- 10. Найдите координаты точки, в которой касательная, проведенная к графику функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, параллельна прямой 4x - y + 1 = 0.

- 11. Найдите величину угла пересечения касательных, проведенных к графикам функций $f \colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt{x}, \ \text{и} \ g \colon \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{x}.$
- **12.** Найдите точки, принадлежащие графику функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = 3x^3 4x^2$, такие, что касательные, проведенные в эти точки, пересекают ось Ox под углом $\frac{\pi}{4}$.
- **13.** Запишите уравнение касательной к графику функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 13,$ если касательная проходит через точку A(2, 8).
- **C**₁ **14.** Найдите коэффициенты $b, c \in \mathbb{R}$, если известно, что в точке (-1, -2) парабола $f(x) = x^2 + bx + c$ имеет касательную y = 2x.
 - **15.** Даны функции $f: \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \ f(x) = \operatorname{arctg} x, \ \text{и} \ g: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \ g(x) = \frac{\pi + 2 \ln x}{4}.$
 - а) Докажите, что графики функций f и g имеют точки касания.
 - б) Запишите уравнение общей касательной графиков функций f и g.
 - **16.** *Исследуйте!* Приведите примеры функций, дифференцируемых на интервале: а) за исключением одной точки; б) за исключением двух точек.

§3 Производные некоторых элементарных функций

Задание. Дана функция $f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^{\sqrt{x}} \cdot \lg 5x$. Найдите производную функции f.

Для отыскания производной функции f, а также производных других функций, важно знать формулы нахождения производных элементарных функций.

3.1. Постоянная функция

Теорема 5. Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = c, \ c \in \mathbb{R}.$ Функция f дифференцируема на множестве \mathbb{R} и $f'(x) = 0, \ \forall x \in \mathbb{R}.$

Доказательство

Пусть x_0 – произвольная точка множества \mathbb{R} .

Имеем
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{c - c}{\Delta x} = 0.$$

Поскольку точка x_0 была выбрана произвольно, функция f дифференцируема на множестве \mathbb{R} и f'(x) = 0, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Вамено знать:
$$c' = 0$$
, $\forall x \in \mathbb{R}$. (1)

Пример

Для функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = 2\,020, \$ получаем $\ (2\,020)' = 0.$

Замечание. Следует различать числа $f'(x_0)$ и $(f(x_0))'$, второе число есть 0, так как производная постоянной функции равна нулю.

3.2. Идентичная функция

Теорема 6. Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x$. Функция f дифференцируема на множестве \mathbb{R} и $f'(x) = 1, \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Доказательство

Пусть x_0 – произвольная точка множества \mathbb{R} .

Имеем
$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1.$$

Поскольку точка x_0 была выбрана произвольно, функция f дифференцируема на множестве \mathbb{R} и $f'(x) = 1, \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Вамсно знать:
$$x'=1$$
. (2)

3.3. Степенная функция с действительным показателем

Теорема 7. Пусть $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^{\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Функция f дифференцируема на интервале $(0, +\infty)$ и $f'(x) = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$, $\forall x \in (0, +\infty)$.

Важно знать:
$$(x^{\alpha})' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}, \ \forall x \in (0, +\infty);$$
 (3)
 $f'(x) = \alpha \cdot x^{\alpha-1}, \ \alpha \ge 1, \ \forall x \in [0, +\infty).$ (3')

Замечания. 1. При $\alpha \ge 1$ функция $f: [0, +∞) \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^{\alpha},$ дифференцируема и в $x_0 = 0$.

- **2.** Функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^n, \ n \in \mathbb{N}, \ n \ge 2, \ дифференцируема на множестве <math>\mathbb{R}$ и $f'(x) = nx^{n-1}, \ \forall x \in \mathbb{R}.$
- 3. Применив формулу (3), получим:

$$(\sqrt[n]{x})' = (x^{\frac{1}{n}})' = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n-1}} = \frac{1}{n} x^{\frac{1-n}{n}} = \frac{1}{n} x^{-\left(\frac{n-1}{n}\right)} = \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}}}, \ \forall x \in (0, +\infty).$$

- 4. $(\sqrt[2n+1]{x})' = \frac{1}{(2n+1)^{2n+1}\sqrt{x^{2n}}}, \ \forall x \in \mathbb{R}^*.$
- **5.** Функция, заданная формулой $f(x) = \sqrt[n]{x}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \ge 2$, не дифференцируема в точке $x_0 = 0$ (так как ее односторонние производные в точке 0 бесконечны).

Задание с решением

- **Ч** Найдем:
 - a) $(x^{-\sqrt{2}})';$ 6) $(\sqrt{x})';$ B) $(\sqrt[3]{x})'$

Решение:

a)
$$(x^{-\sqrt{2}})' = -\sqrt{2}x^{-\sqrt{2}-1};$$
 6) $(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \ \forall x \in (0, +\infty);$

B)
$$(\sqrt[3]{x})' = (x^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3} \cdot x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}, \ \forall x \in (0, +\infty).$$

Соотношение $(\sqrt[3]{x})' = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}$ справедливо и для любого $x \in (-\infty, 0)$.

Важно знать:
$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \ \forall x \in (0, +\infty).$$
 (4)

Для функции радикал $f: D \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt[n]{x}, \ n \in \mathbb{N}, \ n \ge 2,$ получим:

$$(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}}}, \ \forall x \in D \setminus \{0\}$$
 (5)

3.4. Функция синус

Теорема 8. Пусть $f: \mathbb{R} \to [-1,1], \ f(x) = \sin x$. Функция f дифференцируема на множестве \mathbb{R} и $f'(x) = (\sin x)' = \cos x, \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Доказательство

Пусть x_0 – произвольная точка множества \mathbb{R} . Тогда $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sin(x_0 + \Delta x) - \sin x_0}{\Delta x} =$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2\sin\frac{\Delta x}{2} \cdot \cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right) = \cos x_0.$$

Поскольку точка x_0 была выбрана произвольно, функция f дифференцируема на множестве \mathbb{R} и $f'(x) = \cos x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Вамсно знать:
$$(\sin x)' = \cos x, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$
 (6)

3.5. Функция косинус

Теорема 9. Пусть $f: \mathbb{R} \to [-1,1], \ f(x) = \cos x$. Функция косинус дифференцируема на множестве \mathbb{R} и $(\cos x)' = -\sin x, \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Вамено знать:
$$(\cos x)' = -\sin x, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$
 (7)

Задание. Докажите теорему 9.

3.6. Показательная функция

Теорема 10. Пусть $f: \mathbb{R} \to (0, +\infty), \ f(x) = a^x, \ a > 0, \ a \neq 1.$ Функция f дифференцируема на множестве \mathbb{R} и $(a^x)' = a^x \cdot \ln a, \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Вамсно знать:
$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a, \ a > 0, \ a \neq 1, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$
 (8)

Следствие. Используя формулу (8), получим $(e^x)' = e^x \cdot \ln e = e^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Важно знать:
$$(e^x)' = e^x$$
, $\forall x \in \mathbb{R}$. (8')

Например: a) $(2^x)' = 2^x \ln 2$; б) $((0,3)^x)' = (0,3)^x \ln 0,3$.

3.7. Логарифмическая функция

Теорема 11. Пусть $f:(0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$. Функция f дифференцируема на интервале $(0, +\infty)$ и $(\ln x)' = \frac{1}{r}, \ \forall x \in (0, +\infty).$

Важно знать:
$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \ \forall x \in (0, +\infty).$$
 (9)

Задание. Докажите теорему 11.

Теорема 12. Пусть $f: (0, +∞) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \log_a x$, a > 0, $a \ne 1$. Функция f дифференцируема на интервале $(0, +\infty)$ и $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}, \ a > 0, \ a \neq 1, \ \forall x \in (0, +\infty).$

Важно знать:
$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}, \ a > 0, \ a \neq 1, \ \forall x \in (0, +\infty).$$
 (10)

Задание. Докажите теорему 12.

Указание. Примените определение производной, формулу $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ и формулу (9).

Например: a) $(\log_2 x)' = \frac{1}{x \ln 2}$; б) $(\lg x)' = \frac{1}{x \ln 10}$.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

 $\mathbf{A_1}$ 1. Найдите производную функции f и область дифференцируемости $D_{f'}$:

a)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^8;$$

6)
$$f: \mathbb{R}_{+}^{*} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^{-7};$$

B)
$$f: \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt[4]{x}$$
;

$$\Gamma) f: \mathbb{R} \to (0, +\infty), f(x) = 3^x;$$

a)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^{8};$$
 6) $f: \mathbb{R}_{+}^{*} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^{-7};$ B) $f: \mathbb{R}_{+} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt[4]{x};$ c) $f: \mathbb{R} \to (0, +\infty), \ f(x) = 3^{x};$ d) $f: \mathbb{R} \to (0, +\infty), \ f(x) = \log_{3} x;$

e)
$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_3 x;$$

ж)
$$f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x;$$
 3) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt[5]{x}.$

3)
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt[5]{x}.$$

2. Вычислите значение производной функции $f: D \to \mathbb{R}$ в точке с абсциссой x_0 :

a)
$$f(x) = \log_7 x$$
, $x_0 = 7$;

B)
$$f(x) = x^2$$
, $x_0 = 60$

г)
$$f(x) = \sqrt{x}$$
, $x_0 = 49$; д) $f(x) = 2^x$, $x_0 = 5$; e) $f(x) = 25$, $x_0 = -64$.

д)
$$f(x) = 2^x$$
, $x_0 = 5$

e)
$$f(x) = 25$$
, $x_0 = -64$.

- 3. Работайте в парах! Напишите уравнение касательной к графику функции $f: D \to \mathbb{R}$ в точке с абсциссой x_0 :
 - a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 1$;
- 6) $f(x) = 2^x$, $x_0 = 0$;
- B) $f(x) = \log_8 x$, $x_0 = 2$;
- $f(x) = x^5, x_0 = -1$
- **4.** Найдите f'(0) и $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$, если:
 - a) $f: \mathbb{R} \to [-1, 1], f(x) = \sin x$:
- 6) $f: \mathbb{R} \to [-1, 1], f(x) = \cos x$
- $\mathbf{B_1}$ 5. Найдите производную функции f и область дифференцируемости $D_{f'}$:
 - a) $f: [0, +\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = x\sqrt{x};$
- 6) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 \cdot \sqrt[5]{x^2}$
- **6.** Найдите производную функции f и область дифференцируемости $D_{f'}$, если $f: D \to \mathbb{R}$:
 - a) $f(x) = \sqrt[7]{x}$:

6) $f(x) = \sqrt{|x|}$:

B) $f(x) = \log_{0.4}(x^2)$;

- $f(x) = 2^{|x|}$
- 7. Вычислите односторонние производные функции $f: D \to \mathbb{R}$:
 - a) $f(x) = |\cos x|$, B $x_0 = \frac{\pi}{2}$;
 - 6) f(x) = |2x|, |x| = 0;
 - c) $f(x) = \begin{cases} 3x, \text{ если } x \le 0, \\ -2x, \text{ если } x > 0. \end{cases}$ в $x_0 = 0$.
- **8.** Запишите уравнение касательной к графику функции $f: D \to \mathbb{R}$ в точке с абсциссой x_0 :
 - a) $f(x) = 7x^2$, $x_0 = -3$;
- 6) $f(x) = \sin x$, $x_0 = \frac{\pi}{2}$;
- B) $f(x) = \log_{27}(x^3)$, $x_0 = 27$; Γ) $f(x) = 2.5^x$, $x_0 = 1$.
- **C**₁ **9.** Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} mx + n, & \text{если } x < 0, \\ \sin x, & \text{если } x \ge 0. \end{cases}$ Найдите значения действительных параметров m и n, при которых функция f дифференцируема в точке $x_0 = 0$.
 - **10.** *Исследуйте!* Найдите значения действительных параметров m и n, при которых функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} me^{2x} + n, \ \text{если} \ x \in (-\infty, 0), \\ \sin 2x + n \cos 2x, \ \text{если} \ x \in (0, +\infty) \end{cases}$:
 - а) непрерывна на множестве R;
 - б) дифференцируема на множестве R.
 - 11. (БАК, 2007). Найдите действительные значения a, при которых касательная к графику функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x + 2$, в точке $x_0 = a$ пересекает ось абсцисс в одной из точек промежутка [0, 1].

Техника дифференцирования **§4**

4.1. Производная суммы, произведения и частного

Задание. Даны функции $f,g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^3, \ g(x) = e^x, \ c \in \mathbb{R}.$ Найдите:

a)
$$(f + g)'$$
;

б)
$$(c \cdot f)'$$

б)
$$(c \cdot f)'$$
; в) $(f - g)'$;

$$\Gamma$$
) $(f \cdot g)'$;

д)
$$\left(\frac{f}{g}\right)$$
;

e)
$$((f \circ g))'$$
.

Выполнение этого задания требует знания правил нахождения производных.

Теорема 13. Если функции $f, g: I \to \mathbb{R}$ $(I \subseteq \mathbb{R})$ дифференцируемы в точке $x_0 \in I$, то функция f + g дифференцируема в точке x_0 и

$$(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

Доказательство

Имеем
$$(f+g)'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(f+g)(x_0 + \Delta x) - (f+g)(x_0)}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) + g'(x_0).$$

Следствие. Если функции f и g дифференцируемы на интервале I, то функция f + g дифференцируема на этом интервале и (f + g)' = f' + g'.

Пример

Для функции $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, h(x) = f(x) + g(x) = x^3 + e^x$, согласно формуле (1), получим:

$$(x^3 + e^x)' = (x^3)' + (e^x)' = 3x^2 + e^x$$
.

Замечание. Методом математической индукции можно доказать, что сумма $f_{\scriptscriptstyle 1} + f_{\scriptscriptstyle 2} + \ldots + f_{\scriptscriptstyle n}$ дифференцируемых на интервале I функций есть дифференцируемая на этом интервале функция и

$$\left(\sum_{k=1}^{n} f_{k}\right)' = \sum_{k=1}^{n} f_{k}'. \tag{1'}$$

Задание. Выведите формулу (1').

Теорема 14. Если функция $f: I \to \mathbb{R} \ (I \subseteq \mathbb{R})$ дифференцируема в точке $x_0 \in I$ и $c \in \mathbb{R}$, то функция $c \cdot f$ дифференцируема в точке x_0 и $(c \cdot f)'(x_0) = c \cdot f'(x_0)$.

Задание. Докажите теорему 14.

Следствия. 1. Если функция f дифференцируема на интервале I и $c \in \mathbb{R}$, то функция $c \cdot f$ дифференцируема на этом интервале и $(c \cdot f)' = c \cdot f'$.

Пример

Для функции $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ h(x) = \sqrt{3} \cdot e^x, \$ получим $(\sqrt{3} \cdot e^x)' = \sqrt{3} \cdot (e^x)' = \sqrt{3}e^x.$

- **2.** При c = -1 получим (-f)' = -f'.
- 3. Если функции f, g дифференцируемы на интервале I, то функция f-g-1 дифференцируемая функция на этом интервале и (f-g)'=f'-g' . (3)

Пример

Для функции $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ h(x) = x^3 - e^x$, получим:

$$(x^3 - e^x)' = (x^3)' - (e^x)' = 3x^2 - e^x$$
.

Теорема 15. Если функции $f, g: I \to \mathbb{R}$ $(I \subseteq \mathbb{R})$ дифференцируемы в точке $x_0 \in I$, то функция $f \cdot g: I \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x_0 и $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$.

Доказательство

Пусть $x_0 \in I$. Так как функция g дифференцируема в x_0 , она непрерывна в x_0 , то есть $\lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0)$.

Тогда
$$(f \cdot g)'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x) + f(x_0)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot g(x_0 + \Delta x) + f(x_0) \cdot \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} \right) =$$

$$= f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0).$$

Следствие. Если функции f и g дифференцируемы на интервале I, то функция $f \cdot g$ дифференцируема на этом интервале и

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad . \tag{4}$$

Пример

Для функции $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ h(x) = f(x) \cdot g(x) = x^3 \cdot e^x$, получим:

$$(x^3 \cdot e^x)' = (x^3)' \cdot e^x + x^3 \cdot (e^x)' = 3x^2 e^x + x^3 e^x = x^2 e^x (3+x).$$

Замечание. Методом математической индукции можно доказать, что произведение $f_1 \cdot f_2 \cdot ... \cdot f_n$ n дифференцируемых на интервале I функций есть дифференцируемая на этом интервале функция и

$$(f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n)' = f_1' \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n + f_1 \cdot f_2' \cdot \dots \cdot f_n + \dots + f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n'$$

Теорема 16. Если функции $f,g:I\to\mathbb{R}$ $(I\subseteq\mathbb{R})$ дифференцируемы в точке $x_0\in I$ и $g(x_0)\neq 0$, то функция $\frac{f}{g}$ дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0)\cdot g(x_0)=f(x_0)\cdot g'(x_0)$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Локазательство

Поскольку функция g непрерывна и $g(x_0) \neq 0$, существует окрестность $V(x_0)$, в которой $g(x) \neq 0$ для любого $x \in V(x_0)$. Пусть Δx такое, что $x_0 + \Delta x \in V(x_0)$.

To that
$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x_0 + \Delta x) - \left(\frac{f}{g}\right)(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x)}{g(x_0 + \Delta x)g(x_0)\Delta x} = \\
= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{g(x_0 + \Delta x) \cdot g(x_0)} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x}\right) = \\
= \frac{1}{g^2(x_0)} \cdot (f'(x_0)g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

 $(\lim_{\Delta x \to 0} g(x_0 + \Delta x) = g(x_0)$, так как функция g непрерывна в точке x_0).

Следствия. 1. Если функции f, g дифференцируемы на интервале I и $g(x) \neq 0$ для любого $x \in I$, то функция $\frac{f}{g}$ дифференцируема на этом интервале и

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} \quad . \tag{5}$$

2. При f = 1 по формуле (5) получим: $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$. (6)

Задание с решением

♦ Найдем производную функции $h: D \to \mathbb{R}, \ h(x) = \frac{x^3}{e^x}$.

$$h'(x) = \left(\frac{x^3}{e^x}\right)' = \frac{(x^3)' \cdot e^x - x^3 \cdot (e^x)'}{e^{2x}} = \frac{3x^2 e^x - x^3 \cdot e^x}{e^{2x}} = \frac{x^2 e^x (3-x)}{e^{2x}} = \frac{x^2 (3-x)}{e^x}.$$

4.2. Производные функций тангенс и котангенс

Теорема 17. Пусть $f: \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \operatorname{tg} x.$ Функция f дифференцируема на множестве $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ и $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}, \ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Доказательство

$$f'(x) = (\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - \sin x \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}, \ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Basicho 3 Hamb:
$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$
 (7)

Теорема 18. Пусть $f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \operatorname{ctg} x.$ Функция f дифференцируема на множестве $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ и $f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}, \ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$

Важно знать:
$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}, \ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$
 (8)

Задание. Докажите теорему 18.

4.3. Производная сложной функции

Теорема 19. Пусть функции $f: I_1 \to I_2$, $g: I_2 \to \mathbb{R}$, где I_1, I_2 — интервалы. Если функция f дифференцируема в $x_0 \in I_1$, а функция g дифференцируема в $y_0 = f(x_0) \in I_2$, то сложная функция $h = g \circ f: I_1 \to \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \in I_1$ и $h'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$.

Запомните формулу дифференцирования сложной функции:

$$(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x), \ \forall x \in I$$
 (9)

Следствие. Если функции $f\colon I_1\to I_2,\ g\colon I_2\to I_3,\ h\colon I_3\to \mathbb{R}$ дифференцируемы, то сложная функция $p(x)\colon I_1\to \mathbb{R}$, $p(x)=(h\circ g\circ f)(x)$ дифференцируема в любой точке $x\in I_1$ и

$$p'(x) = h'(g(f(x))) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x) \qquad . \tag{10}$$

Задание с решением

🔖 Найдем производные функции:

- a) $h: D \to \mathbb{R}, \ h(x) = 2^{3x};$
- 6) $p: D \to \mathbb{R}$, $p(x) = \log_2 \cos 2x$.

Решение:

a)
$$(2^{3x})' = 2^{3x} \cdot \ln 2 \cdot (3x)' = \ln 8 \cdot 2^{3x}$$
.

6)
$$(\log_2 \cos 2x)' = \log_2' (\cos 2x) \cdot \cos'(2x) \cdot (2x)' =$$

 $= \frac{1}{\cos 2x \cdot \ln 2} \cdot (-\sin 2x) \cdot 2 = -\frac{2\sin 2x}{\cos 2x \ln 2} = -\frac{2 \operatorname{tg} 2x}{\ln 2}.$

4.4. Производная обратной функции

Теорема 20. Пусть $f: I \to J$ $(I, J \subseteq \mathbb{R})$ – непрерывная и биективная функция. Если функция f дифференцируема в точке $x_0 \in I$ и $f'(x_0) \neq 0$, то обратная функция f^{-1} : $J \to I$, где J = f(I), дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$ и $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$.

Замечание. Пусть функция $f \colon I \to J$ строго монотонна и дифференцируема на интервале I, тогда $f'(x) \neq 0$, $\forall x \in I$. Следовательно, обратная функция f^{-1} : $J \rightarrow I$ дифференцируема на интервале J и

$$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(x)}, \ \forall y \in J, \ \text{где } y = f(x)$$
 (11)

Задания с решением

🦫 1. Производная функции арксинус

Дана функция $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1], f(x) = \sin x$. Найдем $(f^{-1})'$.

Решение:

В любой точке $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ имеем $(\sin)'(x_0) = \cos x_0 \neq 0$ и выполняются условия теоремы 20. Итак, функция $f^{-1} = \arcsin$ дифференцируема в любой точке $y_0 \in (-1, 1)$.

Обозначим
$$y_0 = \sin x_0$$
. Тогда $\arcsin y_0 = x_0$. По формуле (11) получим: $(\arcsin)'(y_0) = \frac{1}{\cos x_0} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 x_0}} = \frac{1}{\sqrt{1-y_0^2}}, \ \forall y_0 \in (-1,1).$

Возвращаясь к обычным обозначениям, получим формулу:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \ \forall x \in (-1,1)$$
 (12)

🔖 2. Производная функции арккосинус

Дана функция $f: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1], f(x) = \cos x$. Найдем $(f^{-1})'$.

Решение:

Рассуждая аналогично предыдущему заданию или применив соотношение $\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2}$, получим формулу:

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \ \forall x \in (-1,1)$$
 (13)

🔖 3. Производная функции арктангенс

Дана функция $f:\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\to\mathbb{R},\ f(x)=\operatorname{tg} x.$ Найдем $(f^{-1})'.$

В любой точке $x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ имеем $(tg)'(x_0) = \frac{1}{\cos^2 x_0} \neq 0$ и согласно теореме 20 функция $f^{-1}=\operatorname{arctg}$ дифференцируема в любой точке $y_0\in\mathbb{R},\$ где $y_0=\operatorname{tg} x_0.$

Тогда (arctg)'(
$$y_0$$
) = $\frac{1}{f'(x_0)}$ = $\frac{1}{\frac{1}{\cos^2 x_0}}$ = $\cos^2 x_0$ = $\frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x_0}$ = $\frac{1}{1 + y_0^2}$.

Возвращаясь к обычным обозначениям, получим формулу:

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, \ \forall x \in \mathbb{R}$$
 (14)

🔖 4. Производная функции арккотангенс

Дана функция $f:(0,\pi)\to\mathbb{R},\ f(x)=\operatorname{ctg} x.$ Найдем $(f^{-1})'.$

Решение:

Рассуждая аналогично предыдущему заданию или применив соотношение $\arctan x + \arctan x = \frac{\pi}{2}$, получим формулу:

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, \ \forall x \in \mathbb{R}$$
 (15)

4.5. Дифференцирование функций вида $f(x) = u(x)^{r(x)}$, где u(x) > 0

Рассмотрим функцию $f: I \to \mathbb{R}$, $f(x) = u(x)^{v(x)}$, где u(x) > 0, $\forall x \in I$, $I \subseteq \mathbb{R}$. В общем случае эта функция не является ни показательной, ни степенной, тем самым для отыскания ее производной нельзя пользоваться формулами (3), (8) из § 3. В таких случаях применяется основное логарифмическое тождество:

$$f(x) = u(x)^{v(x)} = e^{\ln u(x)^{v(x)}} = e^{v(x)\ln u(x)}$$

Функция $f: D \to \mathbb{R}$, $f(x) = e^{v(x)\ln u(x)}$ – сложная функция. Находим ее производную: $f'(x) = (e^{v(x)\ln u(x)})' = e^{v(x)\ln u(x)} \cdot (v(x)\ln u(x))' = u(x)^{v(x)} \cdot (v(x)\ln u(x))' = f(x) \cdot (\ln f(x))'$. (16) Отсюда следует формула для нахождения производной функций вида $f(x) = u(x)^{v(x)}$, где u(x) > 0:

 $(u^{\nu})' = u^{\nu} \cdot \left(\nu' \cdot \ln u + \nu \cdot \frac{u'}{u} \right) . \tag{17}$

Задание с решением

🦫 Найдем производную функции:

а) $f: \mathbb{R}_{+}^{*} \to \mathbb{R}_{+}^{*}$, $f(x) = x^{x}$; б) $f: \mathbb{R}_{+}^{*} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^{\sqrt{x}} \lg 5x$ (см. задание в начале §3).

Решение:

а) По формуле (16) имеем $f'(x) = f(x) \cdot (\ln f(x))'$.

Значит, $(x^x)' = x^x \cdot (\ln x^x)' = x^x (x \ln x)' = x^x (\ln x + 1)$.

б) $f'(x) = (x^{\sqrt{x}} \lg 5x)' = (x^{\sqrt{x}})' \cdot \lg 5x + x^{\sqrt{x}} \cdot (\lg 5x)'$. Найдем сначала производную функции $g: D \to \mathbb{R}, \ g(x) = x^{\sqrt{x}}$.

По формулам (17) и $(\ln u^{\nu})' = (\nu \ln u)' = \nu' \cdot \ln u + \nu \cdot \frac{u'}{u}$ получим

$$(\ln x^{\sqrt{x}})' = \frac{1}{x^{\sqrt{x}}} \cdot (x^{\sqrt{x}})'$$
, или $(x^{\sqrt{x}})' = \frac{(2 + \ln x) \cdot x^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$. Тогда

$$f'(x) = \frac{(2 + \ln x) \cdot x^{\sqrt{x}} \cdot \lg 5x}{2\sqrt{x}} + \frac{x^{\sqrt{x}}}{x \ln 10} = 0.5(2 + \ln x) \cdot x^{\sqrt{x} - 0.5} \cdot \lg 5x + x^{\sqrt{x} - 1} \lg e.$$

4.6. Производные высших порядков

Пусть $f: I \to \mathbb{R}$ – дифференцируемая на интервале I функция. Значения f'(x) зависят, в общем, от x, то есть производная функции f является, в свою очередь, функцией от x. Следовательно, можно ставить вопрос о существовании и нахождении производной функции f'.

Задание с решением

Чайдем производную от производной функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2 e^x$. *Решение*:

$$f'(x) = (x^2 e^x)' = 2xe^x + x^2 e^x$$
.
Тогда $(f'(x))' = (2xe^x + x^2 e^x)' = 2e^x + 2xe^x + 2xe^x + x^2 e^x = e^x(x^2 + 4x + 2)$.

Определение. Пусть $f: I \to \mathbb{R}$. Будем говорить, что функция f дифференцируема дважды в точке $x_0 \in I$, если функция f дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0 и функция f' дифференцируема в точке x_0 .

В этом случае производная функции f' в x_0 называется производной второго порядка (или второй производной) функции f в точке x_0 и обозначается $f''(x_0)$.

Итак,
$$f''(x_0) = (f')'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x}$$
.

Замечание. Если функция f дифференцируема дважды в любой точке интервала I, будем говорить, что функция f дифференцируема дважды на интервале I.

Примеры

- **1.** Для функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^3 3x^2 + 5,$ имеем: $f'(x) = 3x^2 6x,$ f''(x) = 6x 6.
 - **2.** Для функции $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ g(x) = \cos x, \$ получаем: $g'(x) = -\sin x, \ g''(x) = -\cos x.$

Аналогично определяется производная третьего порядка (или третья производная) функции f в точке x_0 . Обозначают: $f'''(x_0)$.

По аналогии определяется *производная п-го порядка*, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \ge 2$, *функции f в точке х*₀. Обозначают: $f^{(n)}(x_0) = (f^{(n-1)})'(x_0)$. Иногда $f^{(n)}(x)$ обозначают $\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d} x^n}$.

- **Замечания.** 1. Число, обозначающее порядок производной, записывается в скобках, чтобы не путать это число с показателем степени (кроме случаев, когда порядок производной записывается римскими цифрами).
- **2.** Принято считать, что производная нулевого порядка функции f есть сама функция f, то есть $f^{(0)} = f$.

Примеры

1. Для функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sin x, \ \text{получим:} \ f'(x) = \cos x, \ f''(x) = -\sin x,$ $f'''(x) = -\cos x, \ f''(x) = \sin x.$ Методом математической индукции можно доказать

формулу:
$$\sin(x)^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi n}{2}), n \in \mathbb{N}$$
 . (Дополнительно.)

2*. Аналогично получаем формулу:
$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right), n \in \mathbb{N}$$

(Дополнительно.)

3. Для функции $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ g(x) = e^x$, имеем: $g'(x) = e^x$, $g''(x) = e^x$, $g'''(x) = e^x$.

Важно знать: $(e^x)^{(n)} = e^x$, $\forall n \in \mathbb{N}$. (Дополнительно.)

Упражнения и задачи

Реальный профиль

- **A**₁ **1.** Найдите: 1) f'; 2) f''; 3) f''', функции $f: D \to \mathbb{R}$:
- a) $f(x) = 5x^6$; b) $f(x) = \pi e^x$; b) $f(x) = -0.5 \log_{\frac{1}{3}} x$; c) $f(x) = x^3 5x^2$; d) $f(x) = 7x^2 3x + 2$; e) $f(x) = 2\log_5 x + 2020$.

- **2.** Найдите область определения D_f , производную f' и определите область дифференцируемости $D_{f'}$ функции $f: D_f \to \mathbb{R}$:

- a) $f(x) = x + \sqrt{x}$; 6) $f(x) = \log_3 x + x^5$; B) $f(x) = xe^x$; $f(x) = \sqrt{x} \ln x$;

- д) $f(x) = \sqrt[3]{x} \log_{\frac{1}{5}} x;$ e) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x 1};$ ж) $f(x) = \frac{x}{x^3 + 2x};$ з) $f(x) = \frac{x}{\ln x};$ и) $f(x) = \frac{e^x}{x 3};$ к) $f(x) = \sqrt{2x^2 x};$ л) $f(x) = -4\log_2\sqrt{2}x.$

- **3.** Вычислите f' в точке x_0 , если:
 - a) $f: \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$, $x_0 = \sqrt{2}$; b) $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x} \log_5 2x$, $x_0 = 0.25$.
- **4.** Материальная точка движется согласно закону $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + 7t$, где s расстояние, измеряемое в метрах, и t – время, измеряемое в секундах. Найдите:
 - а) формулу для вычисления скорости материальной точки;
 - б) скорость материальной точки при t = 2 с;
 - в) через сколько секунд материальная точка остановится.
- 5. Работайте в парах! Из одного пункта одновременно отправляются две материальные точки, которые движутся согласно законам $s_1(t) = 6t^2 + 4t$ и $s_2(t) = t^3 + 3t^2 + 6t$, где s – расстояние, измеряемое в метрах, и t – время, измеряемое в секундах.
 - а) Определите моменты времени, когда материальные точки встретятся.
 - б) Найдите формулы для вычисления скоростей и ускорений этих точек.
 - в) Найдите скорости и ускорения материальных точек в моменты их встречи.
 - г) Определите моменты времени, в которых скорости этих точек и соответственно их ускорения равны.
- \mathbf{B}_1 **6.** Найдите f' функции $f: D \to \mathbb{R}$:

 - a) $f(x) = x^{25} \sqrt{x} + \cos x$; 6) $f(x) = \sin x + \log_{0.3} x \sqrt[5]{x}$; B) $f(x) = 5 \ln x + \sqrt{3x} \frac{5}{x^2}$;
 - г) $f(x) = \sqrt[6]{2x} + 7e^x \frac{1}{3}x^{-9}$; д) $f(x) = \sqrt{5}\cos x 7\sin x 4\ln x$; e) $f(x) = 5\sqrt[4]{x} \cdot \sin x$;

 - 3) $f(x) = 6 0.6x^{-5} \log_3 x$; u) $f(x) = 5 \ln(x^2 3x)$;
 - ж) $f(x) = 8x^3 \ln x$:
- к) $f(x) = \sqrt{2} \log_5^3 \operatorname{tg} x$; л) $f(x) = 6^{3x} \sin^2 4x$; м) $f(x) = \frac{\cos(3x^2 1)}{\ln^2 x}$

7. Напишите уравнение касательной к графику функции $f: D \to \mathbb{R}$ в точке с абсциссой x_0 :

a) $f(x) = \cos^2 2x$, $x_0 = \frac{\pi}{2}$; 6) $f(x) = \lg^2(3x - 1)$, $x_0 = \frac{2}{3}$; B) $f(x) = x^{\sqrt{x+2}}$, $x_0 = 1$.

8. \bigcap Работайте в парах! Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} e^{2x}, \ \text{если } x \in (-\infty, 0), \\ ax^2 + bx + c, \ \text{если } x \in [0, +\infty). \end{cases}$

Найдите значения действительных параметров a, b и c, при которых функция fдифференцируема в точке $x_0 = 0$.

9. Напишите хотя бы одну функцию $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, производная которой равна:

a) $f'(x) = 2 - \cos x$;

6) $f'(x) = -2e^{2x}$:

B) $f'(x) = 2\sin 2x$.

10. Решите на множестве \mathbb{R} уравнение f'(x) = 0, если:

a) $f(x) = 2\sin^2 x + \sqrt{2}x$;

6) $f(x) = \cos 2x - \sqrt{3}x$.

11. Решите на множестве \mathbb{R} неравенство f'(x) > 0, если:

a) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 3x$;

6) $f(x) = 3x + \cos(6x - \pi)$.

12. Найдите f'' функции $f: D \to \mathbb{R}$:

г) $f(x) = \sqrt{3 - x^2}$; д) $f(x) = \ln x$; e) $f(x) = \arccos \frac{x}{3}$; ж) $f(x) = \frac{x - 1}{x + 1}$; 3) $f(x) = \frac{3^{2x}}{(x - 1)^2}$; и) $f(x) = (\sqrt{x})^{x - 1}$.

- **13.** Найдите f''(x) 5f'(x) + 3f(x), если $f: \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $f(x) = \operatorname{arctg} x$.
- **14.** Найдите f''' функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

 $f(x) = \frac{1}{x^2}$;

д) f(x) = arctg 2x; e) $f(x) = \ln(-5x)$.

- **15.** *Работайте в парах!* Материальная точка движется согласно закону $s(t) = \sqrt{t}$. Докажите, что ускорение материальной точки пропорционально кубу ее скорости.
- **16.** Найдите силу F, действующую на материальную точку массой m, которая движется по закону $s(t) = 4t^3 - t^2$, где *m* измеряется в килограммах, расстояние sв метрах и время t – в секундах.
- 17. Закон движения материальной точки задается формулой $S(t) = 5t^2 2t + 1$ (масса m измеряется в килограммах, расстояние S – в метрах, время t – в секундах).
 - а) Найдите скорость материальной точки при t = 3 с.
 - б) Найдите ускорение этой материальной точки при t = 5 с.
 - в) Найдите кинетическую энергию материальной точки при t = 10 с.
- 18. Работайте в парах! Тело запускается вертикально в воздух с начальной скоростью 100 м/с.
 - а) Найдите время восхождения тела.
 - б) Найдите высоту, на которую поднимется тело.
 - в) Найдите время падения тела.
 - г) Найдите скорость движения тела в момент достижения земли.

- **19.** Дана функция $f: D \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x}$. Покажите, что $f''(x) + 2f(x) \cdot f'(x) = 0$.
- **20.** Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = e^{-2x}(\cos x + \sin x)$. Покажите, что f''(x) + 4f'(x) + 5f(x) = 0.
- **C**₁ **21.** (БАК, 2018) Дана функция $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^2 x$. Найдите действительные значения x, при которых $f'(x) = 2\sqrt{3}f(x)$.
 - **22.** Вычислите f'''(0), если $f(x) = e^{2x} \cdot x^3$.
 - **23.** *Исследуйте!* Найдите действительные значения параметров m и n, при которых функция $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} mx + n, & \text{если } x \in (-\infty, 0], \\ \frac{x-1}{x^2+1}, & \text{если } x \in (0, +\infty), \end{cases}$ дифференцируема в \mathbb{R} .

§5 Дифференциал функции

Пусть $f:I\to \mathbb{R}$ $(I\subseteq \mathbb{R})$ — дифференцируемая функция на интервале I и $x_0\in I$. Тогда, согласно определению производной, имеем

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$
 (1)

Из соотношения (1) и определения предела функции в точке следует, что

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x), \tag{2}$$

где $\lim_{\Delta x \to 0} \alpha(\Delta x) = 0$. Из соотношения (2) получаем, что

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x, \quad \text{или}$$

$$\Delta f(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x. \tag{3}$$

Из (3) следует, что приращение $\Delta f(x_0)$ дифференцируемой функции f в точке x_0 состоит из двух слагаемых: слагаемое $f'(x_0) \cdot \Delta x$, которое пропорционально приращению аргумента, и слагаемое $\alpha(\Delta x) \cdot \Delta x$, где $\alpha(\Delta x) \to 0$ при $\Delta x \to 0$.

Определение. Линейная функция $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ g(\Delta x) = f'(x_0) \cdot \Delta x$, называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $\mathrm{d} f(x_0)$.

Следовательно,
$$df(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x$$
 . (4)

Задание с решением

 $\$ Найдем дифференциал функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x$.

Решение:

Так как $f'(x_0) = 1$, то $dx = \Delta x$. В силу соотношения (4), $df(x_0) = f'(x_0) \cdot dx$.

Следствие. Если функция f дифференцируема в любой точке интервала I, то:

$$df(x) = f'(x) \cdot dx, \ \forall x \in I$$
 (5)

Примеры

1. Для функции $f: \mathbb{R} \to [-1, 1], f(x) = \sin x$, имеем:

$$df(x) = d(\sin x) = (\sin x)'dx = \cos x dx.$$

2. Для функции $g: (0, +∞) \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \log_8 x$, получаем:


$$dg(x) = d(\log_8 x) = \frac{1}{x \ln 8} dx = \frac{dx}{x \ln 8}.$$

Геометрический смысл дифференциала функции f, дифференцируемой в точке x_0 , отображен на рисунке 4.8. Проводим касательную в точке $A(x_0, f(x_0))$ графика G_f . Имеем $\Delta x = AB$, $\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0) = \frac{BC}{AB}$ (см. ΔABC , у которого $\operatorname{m}(\angle B) = 90^\circ$). Тогда $BC = f'(x_0) \cdot AB$, или $BC = f'(x_0) \Delta x = \operatorname{d} f(x_0)$.

Геометрический смысл дифференциала функции f в точке x_0 следующий: $\Delta f(x_0)$ есть приращение ординаты функции f в точке $(x_0, f(x_0))$, соответствующее приращению Δx ее аргумента, а $\mathrm{d}f(x_0)$ – приращение ординаты касательной в точке $(x_0, f(x_0))$ графика G_f , соответствующее тому же приращению Δx аргумента функции f (рис. 4.8).

Из формул (3) и (4) следует приближенное соотношение:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx \mathrm{d}f(x_0), \tag{6}$$
 или $BD \approx BC$.



Из соотношения (6) следует:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x. \tag{7}$$

Для достаточно малых (т. е. достаточно близких к нулю) Δx имеем $f(x_0 + \Delta x) \approx y$. Иными словами, в окрестности точки A, на достаточно малом участке графика функции f, кривая практически сливается с отрезком касательной в точке A графика G_f .

Формула (7) применяется при вычислении приближенного значения функции в заданной точке.

Замечания. 1. Применив формулу (7), можно вывести следующие формулы:

1)
$$\sqrt{1+\Delta x} \approx 1 + \frac{1}{2}\Delta x$$
. (8)

2)
$$(1+\Delta x)^n \approx 1 + n \cdot \Delta x, \ n \in \mathbb{N}^*.$$
 (9)

2. Формулы (7)–(9) целесообразно применять при относительно малых значениях Δx .

Из определения дифференциала функции следует, что аналогично производным элементарных функций для дифференциалов этих же функций имеем:

$$d(c) = 0, c \in \mathbb{R};$$

$$d(x^{\alpha}) = \alpha x^{\alpha - 1} dx, \alpha \in \mathbb{R};$$

$$d(\sqrt{x}) = \frac{dx}{2\sqrt{x}};$$

$$d(e^{x}) = e^{x} dx;$$

$$d(\ln x) = \frac{dx}{x};$$

$$d(\ln x) = \frac{dx}{x};$$

$$d(\log_{a} x) = \frac{dx}{x \ln a};$$

$$d(\log_{a} x) = -\sin x dx;$$

$$d(\operatorname{tg} x) = \frac{dx}{\cos^{2} x};$$

$$d(\operatorname{ctg} x) = -\frac{dx}{\sin^{2} x};$$

$$d(\operatorname{arccs} x) = -\frac{dx}{\sqrt{1 - x^{2}}};$$

$$d(\operatorname{arcctg} x) = -\frac{dx}{1 + x^{2}};$$

Правилам нахождения производных (см. понятийную карту к модулю 4) соответствуют аналогичные правила нахождения дифференциалов.

Примеры

- 1. $d(e^x \cdot x^3) = e^x \cdot x^3 \cdot dx + 3x^2 \cdot e^x \cdot dx = x^2 e^x (x+3) dx$
- 2. $d(\sin 3x) = 3\cos 3x dx$.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

A₁ **1.** Найдите дифференциал функции $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^3 + 2x$$
;

$$6) f(x) = \frac{x}{1-x};$$

$$B) f(x) = \sin(x+1);$$

$$\Gamma) f(x) = 2^{3x};$$

$$\mu$$
д) $f(x) = \cos 2x$.

2. Найдите дифференциал функции $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x \cdot \log_2 x$$
;

$$6) f(x) = x^2 \cdot e^{4x};$$

B)
$$f(x) = x \cdot \operatorname{ctg}(x+5) - \ln 5x$$
;

$$\Gamma) f(x) = 3\ln\frac{x}{3} + 5.$$

3. Найдите дифференциал функции $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$$
, B $x_0 = -2$;

a)
$$f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$$
, B $x_0 = -2$; 6) $f(x) = \sin x - \cos x$, B $x_0 = \frac{\pi}{3}$;

B)
$$f(x) = \log_2(x^2 + 3)$$
, B $x_0 = 1$;

B)
$$f(x) = \log_2(x^2 + 3)$$
, B $x_0 = 1$; $f(x) = (x - 1)^3 - \ln x$, B $x_0 = 2$.

В₁ **4.** Найдите дифференциал функции $f: D \rightarrow \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \sqrt{x} + 5x^4 - x^{-7}$$
;

6)
$$f(x) = 2 \cdot 3^{-x} - \ln(x^2 - 1) + 7$$
;

B)
$$f(x) = tg^2 x - \sqrt[5]{x^2 - x}$$
.

5. Найдите дифференциал функции $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \sin 2x - \cos^3 x + 5$$
, B $x_0 = \frac{\pi}{6}$;

6)
$$f(x) = \arctan 3x + 5 \arccos x$$
, B $x_0 = 1$;

B)
$$f(x) = -\sqrt{5} \cdot 7^{x^2} + \arcsin \frac{x}{3}$$
, B $x_0 = 0$;

$$f(x) = x^3 e^{2x}$$
, $f(x) = 2$.

- **6.** Работайте в парах! Даны функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2 4$ и $g:(1,+\infty)\to\mathbb{R},\ g(x)=\ln(x-1).$ Найдите дифференциал функции:

б) g(f(x)).

7. Найдите дифференциал функции $f: D \to \mathbb{R}$:

$$a) f(x) = \sin^2(x^4)$$

a)
$$f(x) = \sin^2(x^4)$$
; 6) $f(x) = \arctan\left(\ln\frac{1}{x}\right)$; B) $f(x) = 5^{\operatorname{ctg}\frac{2}{x}}$.

$$B) f(x) = 5^{\operatorname{ctg}_3^2}$$

 \mathbb{C}_1 8. Найдите дифференциал функции $f: D \to \mathbb{R}$:

- a) $f(x) = x^{\sin x}$;
- 6) $f(x) = x^{\ln x}$;
- B) $f(x) = (x-1)^{3x}$.
- 9. Дисследуйте! Дана функция:
 - a) $f: D \to \mathbb{R}, \ f(x) = e^{-|x-1|};$
- 6) $f: D \to \mathbb{R}, \quad f(x) = |x+1|e^{-|x|}.$
- 1) Исследуйте функцию f на непрерывность и дифференцируемость.
- 2) Найдите дифференциал функции f.

Основные свойства дифференцируемых функций **§6**

Рассмотрим основные свойства дифференцируемых функций. Следующие теоремы являются фундаментальными теоремами математического анализа.

6.1. Теорема Ферма

Вспомним!

Точки локального максимума (локального минимума) функции называются точками локального экстремума этой функции.

Теорема 21 (теорема Ферма¹). Пусть $f: I \to \mathbb{R}$ – дифференцируемая функция на интервале I и $x_0 \in I$. Если x_0 – точка локального экстремума функции f, то $f'(x_0) = 0$.



Пьер Ферма

Доказательство

Предположим, что x_0 – точка локального максимума функции f. Тогда существует окрестность $V(x_0)$ точки x_0 ($V(x_0) \subset I$) такая, что $f(x) \leq f(x_0)$, $\forall x \in V(x_0)$. Для $x \in V(x_0)$, $x < x_0$, имеем $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x} \ge 0$, а для $x \in V(x_0)$, $x > x_0$, получим $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \le 0$.

¹ Пьер Ферма (1601–1665) – французский математик.

Из того, что функция f дифференцируема в точке x_0 , следует, что $f'(x_0) = f'_{\pi}(x_0) = f'_{\pi}(x_0) = f'_{\pi}(x_0)$, где $f'_{\pi}(x_0) = \lim_{\substack{x \to x_0 \\ x < 0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \ge 0$, $f'_{\pi}(x_0) = \lim_{\substack{x \to x_0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \le 0$.

Значит, $f'(x_0) \ge 0$ и $f'(x_0) \le 0$, откуда следует, что $f'(x_0) = 0$.

Аналогично доказывается теорема, если x_0 — точка локального минимума функции f. Для этого случая теорема также может быть доказана, подставив в приведенном доказательстве -f вместо f.

Геометрический смысл. При выполнении условий теоремы Ферма, касательная к графику функции f в точке $(x_0, f(x_0))$ параллельна оси Ox (рис. 4.9).




Рис. 4.9

Замечание. Теорема Ферма выражает лишь *необходимое условие* существования для дифференцируемой функции f локального экстремума в точке x_0 . Из того, что производная функции обращается в нуль в точке x_0 , не обязательно следует, что в этой точке функция f имеет локальный экстремум.

Например, производная функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^3$, обращается в нуль в точке $x_0 = 0$, но $x_0 = 0$ не является точкой локального экстремума функции f (рис. 4.10).

Этот пример доказывает, что обратное утверждение теоремы Ферма ложное.




Рис. 4.10

6.2. Теорема Ролля

Следующая теорема, полезная в приложениях производной, является следствием теоремы Ферма и свойств непрерывных функций.

Теорема 22 (теорема Ролля¹). Если функция $f: [a, b] \to \mathbb{R}$

- 1) непрерывна на отрезке [a, b],
- 2) дифференцируема на интервале (a, b) и
- 3) f(a) = f(b),

то существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что f'(c) = 0.



Мишель Ролль

Доказательство

Так как функция f непрерывна на отрезке [a, b], то по второй теореме Вейерштрасса (модуль 3, раздел 2.1), она ограничена и достигает на этом отрезке своих точных верхней и нижней граней.

Пусть
$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$
, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, $m, M \in \mathbb{R}$.


Возможны следующие случаи: m = M; m < M.

¹ Мишель Ролль (1652–1719) – фрацузский математик.

- 1) Пусть m = M. Тогда функция f постоянна на отрезке [a, b]. Следовательно, f'(c) = 0 для любого $c \in (a, b)$.
- 2) Пусть m < M. Тогда функция f уже не является постоянной на отрезке [a, b]. Так как f(a) = f(b), то хотя бы одно из двух значений, *m* или *M*, не достигается на концах отрезка [a, b], то есть существует точка $c \in (a, b)$ такая, что f(c) = mили f(c) = M. Так как c является точкой локального экстремума, то, по теореме Ферма, f'(c) = 0.

Замечание. Любая функция, обладающая свойствами 1) и 2), называется функцией Ролля.

Геометрический смысл. Если отрезок, заданный точками (a, f(a)) и (b, f(b)), параллелен оси Ox, то существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что касательная к графику дифференцируемой функции f в точке (c, f(c)) параллельна оси Ox (рис. 4.11).



Пример

Функция $f: [-1, 0] \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^3 - 2x + 1$, удовлетворяет следующим условиям:

- 1) непрерывна на отрезке [-1, 0],
- 2) дифференцируема на интервале (-1, 0),
- 3) f(-1) = f(0) = 1.

Тогда, согласно теореме Ролля, существует точка $c \in (-1, 0)$ такая, что f'(c) = 0. Найдем эту точку c.

Имеем $f'(x) = 6x^2 - 2 = 0$, где $x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} \notin (-1, 0)$, $x_2 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \in (-1, 0)$. Значит, $c = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

3амечания. 1. Точка c из теоремы Ролля не всегда является единственной точкой для заданной функции.

2. Все три условия теоремы Ролля существенны. Невыполнение хотя бы одного из них приводит к ложному выводу.

Задание. Дана функция $f: I \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \begin{cases} 2x, \text{ если } x \in (0, 1], \\ 2, \text{ если } x = 0; \end{cases}$$
 $I = [0, 1];$ 6) $f(x) = 2x, I = [0, 1];$

6)
$$f(x) = 2x$$
, $I = [0, 1]$;

B)
$$f(x) = |x|, I = [-1, 1].$$

Определите, какие из условий теоремы Ролля не выполняются, и убедитесь в том, что в этом случае заключение теоремы Ролля ложно.

Следствия из теоремы Ролля

1. Между двумя нулями дифференцируемой на интервале функции всегда содержится хотя бы один нуль ее производной (рис. 4.12).





Рис. 4.12

2. Между двумя последовательными нулями производной дифференцируемой на интервале функции содержится не более одного нуля этой функции (рис. 4.13).



6.3. Теорема Лагранжа

Теорема 23 (теорема Лагранжа¹). Пусть $f:[a,b] \to \mathbb{R}$. Если функция f непрерывна на отрезке [a,b] и дифференцируема на интервале (a,b), то существует хотя бы одна точка $c \in (a,b)$ такая, что $f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b-a)$.



Жозеф Луи Лагранж

Доказательство

Рассмотрим вспомогательную функцию $F:[a,b]\to \mathbb{R},$ F(x)=f(x)-mx, $m\in \mathbb{R}.$ Функция F непрерывна на отрез-

ке [a,b] и дифференцируема на интервале (a,b). Найдем постоянную $m \in \mathbb{R}$ такую, что F(a) = F(b), то есть $m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Так как функция F удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля, то существует хотя бы одна точка $c \in (a,b)$ такая, что F'(c) = 0.

Из соотношений F'(x) = f'(x) - m и F'(c) = 0 следует, что f'(c) = m.

Следовательно,
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$
, или $f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$ (1).

Геометрический смысл. График функции f имеет касательную в любой точке $x \in (a,b)$. Угловой коэффициент прямой, проходящей через точки A(a,f(a)) и B(b,f(b)), равен $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=m_1$, а угловой коэффициент касательной к графику функции f в точке (c,f(c)) равен $f'(c)=m_2$. Поскольку $m_1=m_2$, то эти прямые параллельны.

Таким образом, из теоремы Лагранжа следует, что существует, хотя бы одна точка графика G_f , в которой касательная параллельна секущей AB (рис. 4.14).




Рис. 4.14

Задание с решением

७ Применим теорему Лагранжа к функции $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 6 - 2x^2, & x \in [0, 1], \\ \frac{4}{x}, & x \in (1, 2], \end{cases}$$
 и найдем точку c .

¹ Жозеф Луи Лагранж (1736–1813) – французский математик и механик.

Решение:

Функция f непрерывна и дифференцируема на каждом из промежутков [0,1) и (1,2]. Поскольку f(1-0)=f(1)=f(1+0)=4, функция f непрерывна в точке $x_0=1$ и, значит, непрерывна на отрезке [0,2].

Тогда
$$f'(x) = \begin{cases} -4x, & \text{если } x \in [0, 1), \\ -\frac{4}{x^2}, & \text{если } x \in (1, 2]. \end{cases}$$

Используя определения односторонних производных, получаем $f_{\pi}'(1) = f_{\pi}'(1) = -4$. Тогда f'(1) = -4. Значит, функция f дифференцируема на (0, 2). Тогда по теореме Лагранжа существует точка $c \in (0, 2)$ такая, что $f(2) - f(0) = f'(c) \cdot (2 - 0)$, то есть f'(c) = -2. Учитывая формулы производных функций f на каждом из указанных промежутков, получаем уравнения -4c = -2 при $c \in (0, 1)$ и $-\frac{4}{c^2} = -2$ при $c \in (1, 2)$, решения которых $c_1 = 0.5$ и $c_2 = \sqrt{2}$ соответственно. Итак, получили две точки: c_1 и c_2 .

Ombem: $c_1 = 0.5$; $c_2 = \sqrt{2}$.

Замечания. 1. Формула (1) называется формулой Лагранжа, или формулой конечных приращений.

- **2.** Аналогично теореме Ролля, точка c не всегда является единственной для заданной функции.
- 3. Теорема Лагранжа является обобщением теоремы Ролля. Действительно, если теорему Лагранжа дополнить еще условием f(a) = f(b), тогда из формулы (1) следует, что f'(c) = 0, то есть получаем заключение теоремы Ролля.
- **4.** Следствие из теоремы Лагранжа относительно монотонности функции будет рассмотрено в модуле 5 (теорема 2, §1, раздел 1.1).

Следствия из теоремы Лагранжа

- **1.** Если функция $f: I \to \mathbb{R}$ дифференцируема и f'(x) = 0, $\forall x \in I$, то функция f постоянна на интервале I.
- **2.** Если функции $f, g: I \to \mathbb{R}$ дифференцируемы на интервале I и f' = g', то функция g f постоянна на интервале I.
- **3.** Пусть функция f определена в окрестности V точки x_0 , дифференцируема на $V \setminus \{x_0\}$ и непрерывна в точке x_0 . Если существует $\lambda = \lim_{x \to x_0} f'(x_0)$, $\lambda \in \mathbb{R}$, то существует $f'(x_0)$ и $f'(x_0) = \lambda$.

Замечание. Следствие **3** представляет собой достаточное условие дифференцируемости функции f в точке x_0 . Однако это условие не является и необходимым.

Например, функция $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}, \ \text{если} \ x \neq 0, \\ 0, \ \text{если} \ x = 0, \end{cases}$ непрерывна и дифференцируема в $x_0 = 0$, но $\lim_{x \to 0} f'(x)$ не существует.

6.4. Правила Лопиталя

Некоторые пределы функций могут быть вычислены при помощи производных. Применение следующих двух теорем, названных правилами Лопиталя , дает возможность вычислить пределы вида $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, при условии, что $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$ или что эти пределы бесконечны.



6.4.1. Правило Лопиталя для неопределенности вида

Теорема 24. Пусть I – интервал ($I \subseteq \mathbb{R}$), $x_0 \in I$ и $f, g: I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ – две функции. Если: 1) $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$, 2) функции f и g дифференцируемы на множестве $I\setminus\{x_0\}$,

- 3) $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in V(x_0) \cap I$,
- 4) существует предел (конечный или бесконечный) $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$,

то существует предел $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ и $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

6.4.2. Правило Лопиталя для неопределенности вида

Теорема 25. Пусть I – интервал, $x_0 \in I$ и $f, g: I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$ – две функции.

Если 1) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \infty$,

- 2) функции f и g дифференцируемы на множестве $I \setminus \{x_0\}$,
- 3) $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in V(x_0) \cap I$,
- 4) существует предел (конечный или бесконечный) $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$,

то существует предел $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ и $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Замечания. 1. Теоремы 24 и 25 верны и для односторонних пределов в указанной точке.

- **2.** Правила Лопиталя верны и при $x \rightarrow \infty$.
- 3. Теоремы 24 и 25 представляют собой достаточные условия раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.
- 4. Если и $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, и $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ содержат неопределенности вида $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$ и если f, g, f', g', а также оба указанных предела удовлетворяют условиям соответствующего правила Лопиталя, то $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f''(x)}{g''(x)}$. В этом случае будем говорить, что было применено дважды последовательно правило Лопиталя.

Гийом Лопиталь (1661–1704) – французский математик.

Задание с решением

Вычислим: a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{2x}$; б) $\lim_{x\to +\infty} \frac{2x}{e^x}$.

Решение:

a)
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{2x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 0} \frac{(\sin 3x)'}{(2x)'} = \lim_{x \to 0} \frac{3\cos 3x}{2} = \frac{3}{2}.$$

6)
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x}{e^x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{(2x)'}{(e^x)'} = \lim_{x \to +\infty} \frac{2}{e^x} = 0.$$

Замечание. При необходимости, если это возможно, правило Лопиталя применяется последовательно три или более раз.

6.4.3. Неопределенности вида $0\cdot\infty, \infty-\infty, 1^{\infty}, \infty^{0}, 0^{0}$

Неопределенности вида $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^{\infty}, \infty^{0}, 0^{0}$ можно свести к неопределенности вида $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$ при помощи методов, предложенных в модуле 2.

Задания с решением

5 1. Вычислим: a)
$$\lim_{x \to +0} (x^2 \cdot \ln x)$$
; б) $\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{\operatorname{tg} x} - \frac{1}{x} \right)$; в) $\lim_{x \to +\infty} x^x$; г) $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2x}$.

а) Имеем неопределенность вида $0 \cdot \infty$. Преобразуем $x^2 \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\frac{1}{2}}$.

Тогда
$$f(x) = \ln x$$
, $g(x) = \frac{1}{x^2}$, и $f,g: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $\lim_{x \to +0} \ln x = -\infty$, $\lim_{x \to +0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

Функции f и g дифференцируемые: $f'(x) = \frac{1}{x} \neq 0$ и $g'(x) = -\frac{2}{x^3} \neq 0$, $\forall x \in (0, +\infty)$.

Тогда
$$\lim_{x \to +0} (x^2 \ln x) = \lim_{x \to +0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to +0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \to +0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = \lim_{x \to +0} \left(-\frac{x^2}{2}\right) = 0.$$

Omeem: $\lim_{x \to +0} (x^2 \cdot \ln x) = 0.$

б) Имеем неопределенность вида $\infty - \infty$. Поскольку $\frac{1}{\lg x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \lg x}{x \lg x}$, получаем неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Тогда

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{\lg x} - \frac{1}{x} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \to 0} \frac{(x - \lg x)'}{(x \lg x)'} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \to 0} \frac{\left(1 - \frac{1}{\cos^2 x} \right)}{\lg x + \frac{x}{\cos^2 x}} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x \lg x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x \lg x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x \lg x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x \lg x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x \lg x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x - 1} = \lim_{x \to 0$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos x \cdot \sin x + x} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{\frac{1}{2} \sin 2x + x} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to 0} \frac{(\cos^2 x - 1)'}{\left(\frac{1}{2} \sin 2x + x\right)'} = \lim_{x \to 0} \frac{-2 \cos x \sin x}{\cos 2x + 1} = 0.$$

Omeem: $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\operatorname{tg} x} - \frac{1}{x} \right) = 0.$

Замечание. В ходе решения примера б) мы дважды применили правило Лопиталя, так как после первого применения мы снова получили неопределенность вида $\frac{0}{0}$.

в) Имеем неопределенность вида 0° . Пусть $f(x) = x^{x}$.

Тогда
$$\ln f(x) = x \cdot \ln x$$
, $f(x) = e^{x \ln x}$.

Так как
$$\lim_{x \to +0} (x \ln x) = \lim_{x \to +0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \to +0} \frac{(\ln x)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x \to +0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = 0$$
, то

$$\lim_{x \to +0} x^{x} = \lim_{x \to +0} f(x) = \lim_{x \to +0} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \to +0} (x \ln x)} = e^{0} = 1.$$

Omeem:
$$\lim_{x \to +0} x^x = 1$$
.

г) Имеем неопределенность вида 1° .

Пусть
$$f: D \to \mathbb{R}, \ f(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2x}, \$$
тогда $\ln f(x) = 2x \cdot \ln \frac{x-1}{x+1}.$

Следовательно,
$$\lim_{x \to +\infty} \ln f(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln \frac{x-1}{x+1}}{\frac{1}{2x}} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{\frac{2}{x^2-1}}{-\frac{1}{2x^2}} = -4.$$

Omsem:
$$\lim_{x \to \infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2x} = e^{-4}$$
.

Упражнение г) можно решить и применяя формулу $u^v = e^{v \ln u}$

- Замечание. Правила Лопиталя применимы и при вычислении некоторых пределов последовательностей.
- $\stackrel{\lim}{\smile}$ 2. Вычислим $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$.

Решение:

Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}, f(x) = x^{\frac{1}{x}},$ и найдем $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

Имеем неопределенность вида ∞^0

При логарифмировании f(x) неопределенность принимает вид $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\ln f(x) = \frac{1}{x} \ln x, \quad a \quad \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Следовательно,
$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$
. Тогда $\lim_{n\to \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n\to \infty} e^{\frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1$

Omeem:
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$
.

$^{"}$ 3. Вычислим $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^2}$.

Решение

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^2} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)'}{(x^2)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2x^2} = 0.$$


Omeem:
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^2}=0.$$


Замечание. При вычислении пределов функций рекомендуется сочетать применение элементарных (обычных) методов вычисления с правилами Лопиталя.


Упражнения и задачи


Реальный профиль


A₁ 1. *Работайте в парах!* Определите, в каких из указанных точек выполнены условия теоремы Ферма для функции f, заданной графически:














- **2.** Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$: a) $f(x) = 2x^2 x + 3$;
- 6) $f(x) = -x^2 + 2x 3$.
- 1) Решите уравнение f'(x) = 0 и определите, выполняются ли условия теоремы Ферма в точке x_0 , где x_0 – решение данного уравнения.
- 2) Постройте график функции f и представьте геометрически теорему Ферма в
- **3.** Определите, выполняются ли в точке $x_0 = 1$ условия теоремы Ферма для функции a) $f(x) = (x-1)^2$; 6) $f(x) = (x-1)^3$.
- **4.** Начертите график функции, чтобы в точках $x_0 = -1$, $x_1 = 2$ выполнялись условия теоремы Ферма.
- В₁ 5. Исследуйте! Приведите примеры функций, для которых конечное количество точек соответствующего интервала являются точками локального экстремума, но в этих точках не выполняются условия теоремы Ферма.
 - **6.** Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x x^3$.
 - а) Покажите, что функция f удовлетворяет условиям теоремы Ролля на замкнутых промежутках $-1 \le x \le 0$ и $0 \le x \le 1$.
 - б) Найдите соответствующие точки c.
 - 7. Mccnedyŭme! Примените теорему Ролля к функции f и найдите соответствующую точку c:
 - a) $f: [-1, 3] \to \mathbb{R}$, f(x) = (x+1)(x-3); 6) $f: [0, 4] \to \mathbb{R}$, f(x) = |x-2|;
- - а) Найдите действительные параметры a, b, d, при которых функция f удовлетворяет условиям теоремы Ролля на отрезке [-1, 1].
 - б) Примените теорему Ролля к функции f, полученной в п. а), и найдите соответствующую точку c.

- 9. Работайте в парах! Дана функция:
 - a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)$: 6) $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, g(x) = (x^2 - 9)(x^2 - 16).$ Докажите, что производная функции имеет только действительные нули.
- **10.** Докажите, что уравнение $2^{x}(1+x\ln 2)-20x^{9}=0$ имеет хотя бы одно решение на интервале (0, 1).
- **11.** Пусть $f: [0, 2\pi] \to \mathbb{R}, \ f(x) = x \sin x \cos x 1$. Докажите, что существует хотя бы одна точка $c \in (0, 2\pi)$, при которой f''(c) = 0.
- **12.** Примените теорему Лагранжа к функции f и найдите соответствующую точку c:
 - a) $f: [-3, 2] \to \mathbb{R}, f(x) = 3x^2 x + 2;$
- 6) $f: [1, 3] \to \mathbb{R}, \ f(x) = x \ln x;$
- в) $f: [0,3] \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} 2x^2, \ \text{если} \ x \in [0,2], \\ 5x-2, \ \text{если} \ x \in (2,3]; \end{cases}$ г) $f: [-1,4] \to \mathbb{R}, \ f(x) = x + e^x.$
- 13. Приведите пример функции $f: [0, 8] \to \mathbb{R}$, удовлетворяющей условиям теоремы Лагранжа, для которой промежуточная точка $c \in (0, 8)$ не единственная.
- **14.** Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 2x^3 + x, & \text{если } x \le 1, \\ 4\ln x + 3x, & \text{если } x > 1. \end{cases}$ Найдите f'(1).
- **15.** Исследуйте! Покажите, что функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2 + |x|$, может иметь экстремум в точке $x_{\scriptscriptstyle 0}$, но не иметь производной в точке $x_{\scriptscriptstyle 0}$.
- **16.** Исследуйте на дифференцируемость функцию $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x^2, \text{ если } x \leq 1, \\ \ln x + x, \text{ если } x > 1, \end{cases}$ в точке $x_0 = 1$, применив следствие 3 из теоремы Лагранжа.
- 17. Используя правила Лопиталя, вычислите предел:
- a) $\lim_{x\to 0} \frac{3x^3 2x}{x^3 2x^2 + x}$; 6) $\lim_{x\to -1} \frac{\sqrt{x+1}}{3x^2 + 3x}$; b) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x} 1}{2x^2 x}$; r) $\lim_{x\to 1} \frac{\ln(2x-1)}{x^3 x}$;

- $\text{д) } \lim_{x \to +\infty} \frac{x^n}{e^x}, \ n \in \mathbb{N}^*; \qquad \text{e) } \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^n}, \ n \in \mathbb{N}^*; \qquad \text{ж) } \lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x}\right)^{\frac{1}{2x}}; \qquad \text{3) } \lim_{x \to \pi} \frac{1+\cos x}{\sin 2x}.$

- 18. Вычислите предел:
- a) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\lg x}$; 6) $\lim_{x \to 0} (\lg x)^{\sin 2x}$; B) $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 2} \right)^{x^2}$, x > 0.
- 19. Используя соответствующее правило Лопиталя, вычислите предел последовательности:

 - a) $\lim_{n \to \infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1}$; 6) $\lim_{n \to \infty} \frac{\ln^3 n}{50 1}$; B) $\lim_{n \to \infty} \frac{n^3}{101^n}$.
- \mathbb{C}_1 20. Дана функция $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$. Применив теорему Лагранжа, докажите, что:
 - а) последовательность $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^n}$, заданная формулой $a_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}$, является расходящейся;
 - б) последовательность $(b_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, заданная формулой $b_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n} \ln n$ является сходящейся.
 - **21.** Докажите, применив следствие 1 из теоремы Лагранжа, что $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ для любых $x \in \mathbb{R}$.

Упражнения и задачи на повторение

Реальный профиль

В заданиях 1, 2 определите букву, соответствующую верному варианту.

A₁ **1.** Производной функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3$, является $\mathbf{B} \quad f'(x) = 6x^2 - 2x.$

A
$$f'(x) = 2x^2 - 2x$$
.

B
$$f'(x) = 6x^2 - 2x$$

C
$$f'(x) = 6x^2 - 2x + 3$$
.

D
$$f'(x) = 3x^2 - 2x$$

2. Дана функция $f: D \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt{2x-2}$. Тогда

A
$$f'(1) = 0$$
.

B
$$f'(1) = 2$$
.

C
$$f'(1) = \frac{1}{2}$$
.

 \mathbf{D} f'(1) не существует.

3. Исследуйте! Даны функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$, и $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ g(x) = x^3 + x^2 + 1.$

- а) Найдите значение истинности высказывания " $D_{f'} \subseteq D_{g'}$ ".
- б) Запишите уравнение касательной к графику G_{ℓ} в точке $x_0 = 1$.
- в) Решите на множестве \mathbb{R} неравенство f'(x) < g'(x).
- г) Постройте в одной системе координат графики функций f' и g'.
- д) Найдите координаты точек пересечения графиков функций f' и g'.

4. Решите на множестве \mathbb{R} уравнение f'(x) = 0, где f – функция, заданная формулой:

a)
$$f(x) = x^3 - 2x^2$$
;

6)
$$f(x) = 2x \ln x$$
; B) $f(x) = (x-1)e^x$.

B)
$$f(x) = (x-1)e^x$$

- 5. $\ \ \, \bigcap \ \ \, Pаботайте в парах! Решите на множестве <math>\mathbb R$ неравенство $f'(x) \geq 0$, где fфункция, заданная формулой $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.
- 6. Из одного пункта одновременно отправляются две материальные точки: первая точка с начальной скоростью 8 м/с и ускорением 4 м/с², а вторая точка – с равномерным движением со скоростью 16 м/с.
 - а) Найдите моменты времени, когда материальные точки встретятся, если известно, что $x(t) = v_0 t + \frac{at^2}{2}$ – уравнение равномерного ускоренного движения, а x(t) = vt – уравнение равномерного движения.
 - б) Найдите момент времени t, в котором скорость первой точки будет в два раза больше скорости второй точки.

 B_1 7. Найдите дифференциал функции f, заданной формулой:

a)
$$f(x) = \cos(\sin x)$$
;

$$f(x) = \ln(\ln x)$$

8. Решите на множестве \mathbb{R} уравнение f'(x) = 0, где $f - \phi$ ункция, заданная формулой:

a)
$$f(x) = \sin x + \cos x$$
;

$$f(x) = \sqrt{2}\sin x - \sqrt{2}\cos x;$$

B)
$$f(x) = e^{3x} + e^{-3x}$$

- **9.** а) Вычислите односторонние производные функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ в указанных точках:
 - 1) $f(x) = x^2 + x \cdot |x|, x_0 = 0$;
 - 2) $f(x) = x + |x 3|, x_0 = 3$;
 - 3) $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \le 0, \\ x^2, & x > 0, \end{cases}$ $x_0 = 0.$
 - б) Постройте график каждой из функций f.
- 10. Работайте в парах! Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = e^{|x-3|}$.
 - а) Докажите, что функция f непрерывна в точке $x_0 = 3$, но не дифференцируема в этой точке.
 - б) Постройте график функции f.
- 11. Дана функция многочлен $P: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Докажите, что если все корни многочлена P действительны и различные, то P' имеет это же свойство.
- **12.** *Исследуйте!* Исследуйте на непрерывность и дифференцируемость функцию $f: [1, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt{x 2\sqrt{x 1}} + \sqrt{x + 2\sqrt{x 1}}.$
- **13.** Докажите, что хотя $\lim_{x \to +\infty} \frac{x \sin x}{x + \cos x}$ существует, нельзя применить правила Лопиталя для его вычисления.
- **14.** Проверьте, справедлива ли формула Лагранжа для функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x x^2$, на отрезке [0, 1], и найдите соответствующую точку c.
- **15.** Проверьте, удовлетворяет ли функция $f: D \to \mathbb{R}$ условиям теоремы Ролля на указанном отрезке:
 - a) $f(x) = \cos^2 x$, $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]$;
 - 6) $f(x) = \sin^2 x$, $[0, \pi]$;
 - B) f(x) = (x-3)(x-4)(x-5), [3, 5].
- **16.** Пользуясь правилами Лопиталя, вычислите предел $\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(1+e^{2x})}{\ln(1+e^{3x})}$.
- **С**₁ **17.** Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{1+x^2}}$. Докажите, что функция f удовлетворяет равенству $(1+x^2)^2 \cdot f''(x) + 2x(1+x^2) \cdot f'(x) + f(x) = 0$.
 - **18.** Решите на множестве \mathbb{R} уравнение $4^x 2^x = 8^x 6^x$, применив теорему Лагранжа.
 - **19.** Материальная точка движется согласно закону $s(t) = e^{mt} \cos 2t$.
 - а) Найдите постоянную m, если известно, что s''(t) + 2s'(t) + 5s(t) = 0.
 - б) Вычислите скорость и ускорение материальной точки при t = 0 и $t = \frac{\pi}{4}$.
 - **20.** (БАК, 2019) Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{a^2 1}{3} x^3 + \frac{a + 1}{2} x^2 + 2x 1$. Найдите действительные значения a, при которых график функции f содержит единственную точку, в которой касательная, проведенная к графику функции f, параллельна оси Ox.

Итоговый тест

Время выполнения работы: 45 минут

Реальный профиль

- 1. Даны функции $f: D_f \to \mathbb{R}, \ f(x) = \operatorname{tg}\left(3x \frac{\pi}{4}\right), \ g: D_g \to \mathbb{R}, \ g(x) = 6x + 1.$
 - а) Найдите истинностное значение высказывания: " $D_{f'} \subset D_{g'}$ ".

И/Л 2

б) Решите на множестве \mathbb{R} уравнение f'(x) = g'(x).

- **⑤**
- в) Запишите уравнение касательной к графику функции f в точке с абсциссой $x_0 = \pi$.
- g(f(x)).
- **2.** Пользуясь правилами Лопиталя, вычислите предел $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.
- 6
- 3. Дана функция $f: [-1, 1] \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + d, \ \text{если} \ x \in [-1, 0], \\ 1 + \ln(x^2 + 1), \ \text{если} \ x \in (0, 1]. \end{cases}$
 - а) Найдите $a, b, d \in \mathbb{R}$, при которых функция f удовлетворяет условиям теоремы Ролля.
- 64

б) Примените теорему Ролля к функции f , полученной в п. а).

- (5)
- **4.** Материальная точка движется прямолинейно согласно закону $s(t) = 3t^2 + 9 \ln t + 18$ (*s* расстояние, измеряемое в сантиметрах, и *t* время, измеряемое в секундах). Найдите момент времени *t*, когда ускорение равно 2 см/ c^2 .

Схема опенивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	36–35	34–31	30-27	26–22	21–16	15-11	10-7	6–4	3–2	1-0

Производная и дифференциал функции

Диффере	функі	$\mathrm{d}f(x) = j$
1		\longrightarrow
я функции	$f(x) - f(x_c)$	$\min f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x_0)}{x - x_0}$
Поизводна	$f(x_2 + \Delta x) - f(x_3)$	$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f'(x_0) - f'(x_0)}{\Delta x}$
V		

 $f(x) - f(x_0)$

 $f_n'(x_0) = \lim_{x \to \infty}$

Односторонние производные $f(x) - f(x_0)$

 $x-x_0$

 $x-x_0$

 $f_{\rm u}'(x_0) = \lim_{x \to x_0 + 0} -\frac{1}{x}$

Правила вычисления

производных

1. (f+g)'=f'+g'

2. $(c \cdot f)' = c \cdot$

3. (f-g)'=g

(функци	$\mathrm{d}f(x) = f'($	A America
		\longrightarrow	
и функции	f(x) = f(x)	$\lim_{x \to x_0} \frac{1}{x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{1}{x_0} \frac{1}{x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{1}{x$	Togania monancina mandanapan n amina anna anna anna anna anna anna
поизводная функции	$f(x_{c} + \Delta x) - f$	$f(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0)}{\Delta x} = \frac{f(x_0)}{\Delta x}$	E

			Гес	фий			$f(x_0+\Delta)$	$\Delta f(x_0)$)(x)	,	
Лифференциял	функции	df(x) = f'(x)dx	ых функций	fp	0	$n \cdot x^{n-1} dx$	$\alpha \cdot x^{\alpha-1} \mathrm{d} x$	$-\frac{1}{x^2}dx$	$\frac{1}{2n \cdot \sqrt[2n]{x^{2n-1}}} dx$	$\frac{1}{(2n+1)\cdot {^{2n+1}\sqrt{x^{2n}}}} dx$	
		→ (0x)	элементарн	$D_{f'}$	껕	≅	(0, +∞)	<u>*</u>	(0, +∞)	<u>*</u>	
Поизводная функции	f(x) = f(x)	• $\min f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0}$	Таблица производных и дифференциалов элементарных функций	, <i>f</i> ,	0	$n \cdot x^{n-1}$	$lpha \cdot x^{lpha - 1}$	$\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{2n \cdot \sqrt[2n]{x^{2n-1}}}$	$\frac{1}{(2n+1)^{-2n+1}\sqrt{x^{2n}}}$	_
	f(x) = f(x)	$\frac{1}{\Delta x} \frac{(x_0)}{(x_0)}$ HIII	производных	D_f	깥	≅	(0, +∞)	*	$[0, +\infty)$	ĸ	
	$V + \lambda J f$	$(a_{x}) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\int (x_{0} + \Delta x) \int (x_{0})}{\Delta x}$	Таблица	f	(постоянная)	$n', n \in \mathbb{N}^*$	$\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^*$	d s	\sqrt{x} , $n \in \mathbb{N}^*$	$n+1/x$, $n \in \mathbb{N}^*$	L

оференциала функции ометрический смысл производной и

(¥

 $x_0 + \Delta x \times$

(F	0	$n \cdot x^{n-1} dx$	$\alpha \cdot x^{\alpha-1} \mathrm{d}x$	$-\frac{1}{x^2}dx$	$\frac{1}{2n \cdot \sqrt[2n]{x^{2n-1}}} dx$	$(2n+1)^{-2n+\sqrt{x^{2n}}}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}} dx$	$a^x \ln a dx$	$e^x dx$	$\frac{1}{x}dx$	$\frac{1}{x \ln a} dx$	$\cos x dx$	$-\sin x dx$	$\mathbf{E}\left[\mathbf{Z}\right] = \frac{1}{\cos^2 x} \mathrm{d}x$	$-\frac{1}{\sin^2 x} dx$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$	$\frac{1}{x^2+1} dx$	
			(0, +∞)		۳	* *	(0, +∞)	~		(0, +∞)		ĸ	≅	$\mathbb{R}\setminus\{2k+1)\frac{\pi}{2} k\in\mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$	(-1, 1)	(-1, 1)	Œ	
,	0	$n \cdot x^{n-1}$	$\alpha \cdot x^{\alpha - 1}$	$\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{2n \cdot \sqrt[2n]{x^{2n-1}}}$	$\frac{1}{(2n+1)\cdot ^{2n+1}\sqrt[3]{x^{2n}}}$	$\frac{1}{2}$	$a^x \cdot \ln a$	e^x	×	$\frac{1}{x \ln a}$	cosx					$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{x^2+1}$	
					[0, +∞)	ĸ	$[0, +\infty)$	ĸ	≅	(0, +∞)	≠1 (0, +∞)	ピ	坐	$\mathbb{R}\setminus\{2k+1)\frac{\pi}{2} k\in\mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}\setminus\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$	[-1, 1]	[-1, 1]	œ	
6	1. с (постоянная)	2. $x^n, n \in \mathbb{N}^*$	3. x^{α} , $\alpha \in \mathbb{R}^*$	4. 	5. $\sqrt[2\eta]{x}$, $n \in \mathbb{N}^*$	6. $^{2n+1}\sqrt{x}$, $n \in \mathbb{N}^*$	7. \sqrt{x}	8. a^x , $a > 0$, $a \ne 1$	9.	10. $\ln x$	11. $\log_a x, a > 0, a$	12. $\sin x$			15. $\operatorname{ctg} x$	16. arcsinx	17. $\arccos x$	18. $arctgx$	

			_
	Правила вычисления дифференциалов	1. $d(f+g) = df + dg$ 2. $d(c \cdot f) = c \cdot df$ 3. $d(f-g) = df - dg$ 4. $d(f \cdot g) = g \cdot df + f \cdot dg$ 5. $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot df - f \cdot dg}{g^2}$ 6. $df(g) = f'(g)dg$ Of the CBOÜCTBA AND ADDITING	
(2n+1). " $(x$ ""	$\frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ $a^{x} \ln a dx$	$e^{x} dx$ $\frac{1}{x} dx$ $\frac{1}{x} dx$ $\frac{1}{x \ln a} dx$ $\cos x dx$ $-\sin x dx$ $-\sin x dx$ $\frac{1}{\cos x} dx$ $\frac{1}{\cos x} dx$ $\frac{1}{\sin^{2} x} dx$ $\frac{1}{\sqrt{1 - x^{2}}} dx$ $\frac{1}{\sqrt{1 - x^{2}}} dx$ $\frac{1}{\sqrt{1 - x^{2}}} dx$	$-\frac{1}{x^2+1}dx$
	(0, +∞) R	$ k \in \overline{Z} $ $\in \mathbb{Z}^{\frac{1}{2}}$	쫀
$(7n+1)$. \sqrt{x}	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$ $a^{x} \cdot \ln a$	e^{x} $\frac{1}{x}$ $\frac{1}{x}$ $\frac{1}{x \ln a}$ $\cos x$ $-\sin x$ $\frac{1}{\cos^{2} x}$ $\sin^{2} x$ $\sin^{2} x$ $\frac{1}{1}$ $\sqrt{1-x^{2}}$ $\sqrt{1-x^{2}}$	$-\frac{1}{x^2+1}$
-		$k \in \mathbb{Z}$	

пределов (правила Лопиталя)

Вычисление некоторых 5. Исследование функций

Применение в приближенных

 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

3. Нахождение биномиальных

вычислениях

коэффициентов

к графику функции в точке

с абсциссой x_0 :

1. Уравнение касательной

Некоторые приложения

производных

 $f'' = (f')'; f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$

8. Производная высших

порядков:

 $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{4}$

функции:

7. Производная обратной

 $(g \circ f)'(x) = (g(f(x)))' =$

 $= g'(f(x)) \cdot f'(x)$

6. Производная сложной

функции:

|| |-

f + g. $\cdot g - g$.

4. $(f \cdot g)' = .$

Модуль

5

йондовекодп кинежолидП

Цели

- *применение производной для нахождения промежутков монотонности и экстремумов функции;
- распознавание и применение в различных контекстах понятий: *критические точки, точки экстремума, экстремумы функции*;
- *нахождение при помощи производной точек перегиба, интервалов выпуклости графика функции;
- *применение методов, использующих производную, как качественно новых в исследовании функции, а также при решении теоретических и практических задач;
- приложение производных при решении задач на максимум и минимум из геометрии, физики, экономики;
- *применение производных для распознавания и объяснения процессов, явлений из различных областей.

В данном модуле рассмотрим приложения производных первого и второго порядков при исследовании поведения функций, а также при решении различных задач из геометрии, физики и других областей, задач, которые в большинстве случаев не могут быть решены элементарными методами.

§1 Роль первой производной в исследовании функций

1.1. Промежутки монотонности функции

При исследовании поведения функции важно знать, при каких условиях функция постоянна или монотонна на заданном промежутке. Ранее было установлено, что производная постоянной функции на заданном промежутке равна нулю. Полезным будет и обратное утверждение.

Теорема 1. Пусть $f \colon E \to \mathbb{R}$ ($E \subseteq \mathbb{R}$) – дифференцируемая функция. Если производная функции f равна нулю на каком-то промежутке $I \subseteq E$, то функция f постоянна на этом промежутке.

Доказательство

Пусть f'(x) = 0, $\forall x \in I$. Фиксируем на промежутке I точку x_0 и пусть $x \in I$, $x \neq x_0$. На отрезке $[x_0, x]$ (или $[x, x_0]$) функция f удовлетворяет условиям теоремы Лагранжа (см. модуль 4, §6, п. 6.3). Согласно этой теореме, существует такая точка c, расположенная между x_0 и x, что $f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0)$. Так как f'(c) = 0, то из условия следует, что $f(x) = f(x_0)$. Следовательно, в любой точке $x \in I$ функция f принимает значение $f(x_0)$, то есть функция f постоянна на промежутке I.

Следствие. Если f и g – дифференцируемые функции и f' = g' на промежутке I, то функции f и g отличаются на этом промежутке на постоянную: f(x) = g(x) + C, $\forall x \in I$, $C \in \mathbb{R}$.

Доказательство

Рассмотрим функцию $\varphi = f - g$. Тогда $\varphi'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$, $\forall x \in I$. Значит, функция φ постоянна на промежутке Iи, следовательно, f(x) = g(x) + C, $\forall x \in I$, $C \in \mathbb{R}$.

Задание с решением

Ч Найдем интервалы, на которых функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan x$, и $g: \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{1}{2} \arctan \frac{2x}{1-x^2}$, отличаются на постоянную, и найдем эту постоянную.

Решение:

На каждом из интервалов $I_1=(-\infty,-1),\ I_2=(-1,1)$ и $I_3=(1,+\infty)$ производные функций f и g равны между собой: $f'(x)=g'(x)=\frac{1}{1+x^2}$. Значит, на каждом из этих интервалов данные функции отличаются на постоянную: $f(x)-g(x)=C_1$, $\forall x\in I_1;\ f(x)-g(x)=C_2,\ \forall x\in I_2;\ f(x)-g(x)=C_3,\ \forall x\in I_3$. Для интервала I_2 получим $C_2=0$ (при x=0), а для интервалов I_1 и I_3 соответственно имеем $C_1=-\frac{\pi}{2}$ и $C_3=\frac{\pi}{2}$, если, например, x стремится к $-\infty$ и соответственно к $+\infty$.

Таким образом, мы получили: $\arctan x = \frac{1}{2}\arctan \frac{2x}{1-x^2} - \frac{\pi}{2}$, $\forall x \in (-\infty, -1)$; $\arctan x = \frac{1}{2}\arctan \frac{2x}{1-x^2}$, $\forall x \in (-1, 1)$; $\arctan x = \frac{1}{2}\arctan \frac{2x}{1-x^2} + \frac{\pi}{2}$, $\forall x \in (1, +\infty)$.

Полученные соотношения могут быть доказаны и элементарными методами, без применения понятия производной.

Замечание. На основании решенного примера делаем вывод: из того, что функция f определена на объединении двух (или более) непересекающихся промежутков $I_1, I_2, I_1 \cap I_2 = \emptyset$, и f'(x) = 0, $\forall x \in I_1 \cup I_2$, еще не следует, что она постоянна на множестве $I_1 \cup I_2$. Например, значение производной функции $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} -1, \text{ если } x \in (-\infty, 0), \\ 1, \text{ если } x \in (0, +\infty), \end{cases}$ в любой точке множества $A = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, равно нулю, однако функция f не является постоянной на этом множестве.

Теперь установим важный и эффективный критерий нахождения промежутков монотонности дифференцируемой функции.

Теорема 2. Пусть функция $f: I \to \mathbb{R}$ дифференцируема на промежутке I. Функция f возрастает (убывает) на промежутке I тогда и только тогда, когда $f'(x) \ge 0$ ($f'(x) \le 0$), $\forall x \in I$.

Доказательство

Необходимость. Предположим, что функция f возрастает на промежутке I. Тогда $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \ge 0, \ \forall x, x_0 \in I, \ x \ne x_0$. Фиксируем $x_0 \in I$, затем вычисляем предел этого отношения при $x \to x_0$ и получаем, что $f'(x_0) \ge 0, \ \forall x_0 \in I$.

Аналогичные рассуждения проводятся и в случае, когда функция f убывает на промежутке I.

Достаточность. Рассмотрим произвольные точки $x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2,$ и пусть $f'(x) \ge 0$ на промежутке I. Применив теорему Лагранжа к функции f на отрезке $[x_1, x_2]$, получим $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$, где $c \in (x_1, x_2)$ и $f'(c) \ge 0$. Так как $x_2 - x_1 > 0$, то $f(x_2) - f(x_1) \ge 0$, то есть $f(x_2) \ge f(x_1)$. Значит, функция f возрастает на промежутке I.

Аналогично, если $f'(x) \le 0$, $\forall x \in I$, то функция f убывает на промежутке I.



- **Замечания.** 1. Если f'(x) > 0, $\forall x \in I$, то функция f строго возрастает на проме-
- **2.** Если f'(x) < 0, $\forall x \in I$, то функция f строго убывает на промежутке I.
- **3.** Из того, что функция f строго возрастает (строго убывает) на промежутке I, не следует, что f' не обращается в нуль ни в одной точке промежутка I. Например, функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, строго возрастает на множестве \mathbb{R} , однако f'(0) = 0.

Покажем, что если функция $f: I \to \mathbb{R}$ дифференцируема на промежутке I и f'(x) > 0, $\forall x \in I \setminus \{x_0\}$, то она строго возрастает на I (если f'(x) < 0, $\forall x \in I \setminus \{x_0\}$, то она строго убывает на I). Действительно, из замечания 1 следует, что функция fстрого возрастает на двух промежутках, определенных точкой x_0 . Остается сравнить значение функции f в точке x_0 с остальными значениями этой функции. Согласно формуле Лагранжа имеем $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f(c_1)>0, \ \forall x\in I, \ x< x_0$ и $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f(c_2)>0, \ \forall x\in I, \ x>x_0$. Следовательно, $f(x)< f(x_0)$ при $x< x_0$, соответственно $f(x_0) < f(x)$ при $x_0 < x$. Аналогично можно показать, что если функция $f: I \to \mathbb{R}$ дифференцируема на I и f'(x) < 0, $\forall x \in I \setminus \{x_0\}$, то она строго убывающая.

Вывод. Дифференцируемая функция строго монотонна на промежутках, на которых ее производная знакопостоянна. Следовательно, чтобы найти промежутки монотонности дифференцируемой функции, надо найти промежутки знакопостоянства ее производной.

Примеры

- **1.** Функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2x$, строго возрастает на множестве \mathbb{R} , так как $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
- **2.** Функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 x + 1$, строго убывает на промежутке $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ и строго возрастает на промежутке $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right]$, поскольку f'(x) = 2x - 1 < 0, $\forall x \in \left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$ и f'(x) > 0, $\forall x \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$.
- **3.** Функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x x$, строго убывающая на \mathbb{R} , так как $f'(x) = \cos x - 1 = 0$ в точках $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, а в остальных точках f'(x) < 0.

Задание с решением

 $\begin{cases} \begin{cases} \begin{cases}$

$$f(x) = \begin{cases} (1+x)^2, & \text{если } -2 < x < -1, \\ 0, & \text{если } -1 \le x \le 1, \\ (1-x)^2, & \text{если } 1 < x < 2. \end{cases}$$

Решение:

Убедимся, что функция f дифференцируема на (-2, 2) и $f'(x) = \begin{cases} 2(1+x), & \text{если } -2 < x < -1, \\ 0, & \text{если } -1 \le x \le 1, \\ -2(1-x), & \text{если } 1 < x < 2. \end{cases}$

Так как f'(x) < 0 на интервале (-2, -1) и f'(x) > 0 на интервале (1, 2), следует, что на первом интервале функция f строго убывающая, а на втором интервале она строго возрастающая. На отрезке [-1, 1] функция f постоянна, поскольку f'(x) = 0, $\forall x \in [-1, 1]$.

1.2. Точки экстремума функции

Вспомним!

Определения. Пусть $f: I \to \mathbb{R}$ $(I \subseteq \mathbb{R})$ – некоторая функция.

- Точка $x_0 \in I$ называется точкой локального максимума функции f, если существует такая окрестность $V(x_0)$ точки x_0 , что $f(x) \le f(x_0)$, $\forall x \in V(x_0) \cap I$. В этом случае значение $f(x_0)$ называется локальным максимумом функции f в точке x_0 .
- Точка $x_0 \in I$ называется точкой локального минимума функции f, если существует такая окрестность $V(x_0)$ точки x_0 , что $f(x_0) \le f(x)$, $\forall x \in V(x_0) \cap I$. В этом случае значение $f(x_0)$ называется локальным минимумом функции f в точке x_0 .
- Точки локального максимума и локального минимума функции называются точками локального экстремума этой функции.
- Значения функции f в точках локального экстремума называются локальными экстремумами этой функции.

Определения. Пусть $f: I \to \mathbb{R}$ $(I \subseteq \mathbb{R})$ – некоторая функция.

- Точка $x_0 \in I$ называется точкой глобального максимума функции f, если $f(x) \le f(x_0)$, $\forall x \in I$, а значение $f(x_0)$ называется глобальным максимумом функции f на промежутке I.
- Точка $x_0 \in I$ называется точкой глобального минимума функции f, если $f(x_0) \le f(x)$, $\forall x \in I$, а значение $f(x_0)$ называется глобальным минимумом функции f на промежутке I.
- Точки глобального максимума и глобального минимума функции называются точками глобального экстремума этой функции.
- Значения функции f в точках глобального экстремума называются глобальными экстремумами этой функции.

Замечания. 1. Точка локального максимума (минимума) может не быть точкой глобального максимума (минимума). Точка глобального максимума (минимума) также является и точкой локального максимума (минимума).

2. В некоторых случаях локальный минимум функции может быть больше, чем локальный максимум этой же функции.

Например, у функции $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (рис. 5.1) в точке x_1 локальный минимум больше, чем ее локальный максимум в точке x_4 .

3. Если функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на отрезке [a, b], то по теореме Вейерштрасса, функция f достигает на этом отрезке своих точных граней, $M = \sup_{x \in [a,b]} f(x)$ и $m = \inf_{x \in [a,b]} f(x)$, которые являются ее глобальными экстремумами на отрезке [a, b].




Рис. 5.1

Пусть функция $f: I \to \mathbb{R}$ дифференцируема на промежутке I. Согласно теореме Ферма, если $x_0 \in I$ – точка локального экстремума функции f, то $f'(x_0) = 0$. Таким образом, из теоремы Ферма следует, что производная функции обращается в нуль в любой точке локального экстремума на промежутке І.

Выводы. Пусть функция $f: I \to \mathbb{R}$ дифференцируема на промежутке I и $f'(x_0) = 0, x_0 \in I.$

- 1. Если f'(x) > 0, $\forall x \in I$, $x < x_0$, и f'(x) < 0, $\forall x \in I$, $x > x_0$, то x_0 точка локального максимума функции f. Обозначают: $\nearrow f(x_0) \searrow$. Знак $\nearrow (\searrow)$ означает, что функция монотонно возрастает (убывает) на соответствующем промежутке.
- 2. Если f'(x) < 0, $\forall x \in I$, $x < x_0$, и f'(x) > 0, $\forall x \in I$, $x > x_0$, то x_0 точка локального минимума функции f. Обозначают: $f(x_0)$.
- 3. Если знаки производной функции справа и слева от точки x_0 одинаковы, то x_0 не является точкой локального экстремума данной функции.

Определение. Пусть функция $f: I \to \mathbb{R}$ дифференцируема на промежутке I. Точки, в которых f' равна нулю, называются критическими точками (или **стационарными**) функции f.

Замечание. Выводы 1–3 верны и в случае, когда функция f непрерывна в точке x_0 , но не дифференцируема в этой точке. Такие точки также называются критическими точками (стационарными) функции f.

Например, функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = |x|$, недифференцируема в точке $x_0 = 0$, однако 0 является точкой локального минимума этой функции.

В самом деле, $f'(x) = \begin{cases} -1, & \text{если } x \in (-\infty, 0), \\ 1, & \text{если } x \in (0, +\infty) \end{cases}$ и в точке $x_0 = 0$ производная меняет знак с "-" на "+".

Промежутки монотонности, точки локального экстремума и локальные экстремумы функции, дифференцируемой на интервале или на объединении интервалов, можно найти по следующему алгоритму:

- ① Вычисляют производную f'.
- ② Решают уравнение f'(x) = 0; решения этого уравнения (нули функции f', а также точки, в которых функция f не дифференцируема) являются предполагаемыми точками локального экстремума функции f.
- ③ Определяют знак функции f' на интервалах, в которых она не обращается в нуль.
- 4 Находят промежутки знакопостоянства функции f', которые являются промежутками монотонности функции f.
- \odot Находят точки локального экстремума и локальные экстремумы функции f.

Задания с решением

\bigcip 1. Найдем промежутки монотонности функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^3 + 9x^2.$

 $f'(x) = 3x^2 + 18x = 3x(x+6)$. Критическими точками функции f являются -6 и 0. Заметим, что:

- f'(x) > 0 на интервалах ($-\infty$, -6), $(0, +\infty)$, значит, по замечанию 1 (п. 1.1), функция f строго возрастает на промежутках $(-\infty, -6], [0, +\infty)$.
- f'(x) < 0 на интервале (-6, 0), значит, функция f строго убывает на отрезке [-6, 0].

Результаты данного исследования можно представить в так называемой таблице поведения функции. В первой строке этой таблицы указываются область определения функции и точки, в которых ее производная обращается в нуль или не существует. Во второй строке указываются знаки производной функции на промежутках, где она не обращается в нуль. В последней строке указываются возрастание (,, убывание (,,) функции, а также ее локальные экстремумы.

Составим таблицу поведения функции f: Итак, -6 – точка локального максимума функции f и f(-6) = 108 – ее локальный максимум, а 0 - точка локального мини-

Составим таолицу поведения функции
$$f$$
: $x \to -6$ $0 \to +\infty$ Итак, -6 — точка локального максимума функции f и $f(-6)=108$ — ее локальный f — f

 $^{\buildrel b}$ 2. Найдем промежутки монотонности функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{\pi}{2}, \text{ если } x < -\frac{1}{2} \\ \arcsin x + \arccos x, \text{ если } -\frac{1}{2} \le x \le \frac{\pi}{2} \\ -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{\pi}{2}, \text{ если } x > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Так как
$$f\left(-\frac{1}{2}-0\right) = f\left(-\frac{1}{2}+0\right) = \frac{\pi}{2}$$
 и $f\left(\frac{1}{2}-0\right) = f\left(\frac{1}{2}+0\right) = \frac{\pi}{2}$, следует, что функ-

ция f непрерывна на \mathbb{R} . Вычислим производную: $f'(x) = \begin{cases} 2\left(x+\frac{1}{2}\right), \text{ если } x < -\frac{1}{2}, \\ 0, \text{ если } -\frac{1}{2} \le x \le \frac{1}{2}, \\ -2\left(x-\frac{1}{2}\right), \text{ если } x > \frac{1}{2}. \end{cases}$

Следовательно, $f'(x) \le 0$ для любых $x \in \mathbb{R}$ и значит функция убывает на множестве \mathbb{R} . Можно подметить, что функция f строго убывающая на промежутках $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$ и $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$, а на промежутке $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ – постоянна.

\$\text{3.} Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = e^x - x$. Найдем промежутки монотонности, точки локального экстремума и локальные экстремумы функции f.

Решение:

Замечание. Зная таблицу поведения функции, можно записать неравенство вида $f_1(x) \ge f_2(x)$, $x \in E$. Для этого необходимо исследовать поведение функции и знак функции $f: E \to \mathbb{R}$, $f(x) = f_1(x) - f_2(x)$.

Задание с решением

७ Покажем, что для любого x > -1 верно неравенство ln(1+x) ≤ x. *Решение*:

Рассмотрим функцию f, заданную разностью выражений записанных по обе стороны неравенства: $f: (-1, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \ln(1+x) - x$. Исследуем поведение этой функции, применив производную. Имеем $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x}$.

Составим таблицу поведения функции f: $x \mid -1 \quad 0 \quad +\infty$ Так как максимума функция достигает в точке 0, то функция отрицательна на интервале $(-1, +\infty)$, $f' \mid + 0 \quad -$ то есть $\ln(1+x)-x \leq 0$.

Таким образом, $ln(1+x) \le x$ и равенство имеет место только при x = 0.

1.3. Нахождение глобальных экстремумов

Пусть функция $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ дифференцируема на интервале (a,b) и непрерывна на отрезке [a,b]. По теореме Вейерштрасса, функция f достигает на отрезке [a,b] своих точных граней, то есть существуют точки $x_1,x_2\in[a,b]$ такие, что $f(x_1)=\inf_{x\in[a,b]}f(x)=m,$ $f(x_2)=\sup_{x\in[a,b]}f(x)=M$. Если точка x_1 (x_2) расположена внутри отрезка [a,b], то, по теореме Ферма, в этой точке функция f имеет локальный минимум (максимум) и, значит, $f'(x_1)=0$ $(f'(x_2)=0)$. Однако точные грани m и M могут быть достигнуты функцией f и на концах отрезка [a,b].

Например, функция $f: \left[0, \frac{3\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}, \ f(x) = \cos x$, достигает своего наибольшего значения, M = 1, в точке 0.

Глобальные экстремумы непрерывной на отрезке функции $f:[a,b] \to \mathbb{R}$, дифференцируемой на интервале (a,b), могут быть найдены по следующему *алгоритму*:

- ① Находят значения функции f на концах отрезка [a, b], f(a) и f(b).
- ② Находят критические точки функции f, то есть находят решения уравнения f'(x) = 0, $x \in (a, b)$.
- 3 Вычисляют значения функции f в найденных критических точках и сравнивают их с ее значениями на концах отрезка: наименьшее (наибольшее) из этих значений является глобальным минимумом (максимумом) функции f на отрезке [a, b].

Задание с решением

\(\begin{align*} \begin{align*} Найдем на указанном отрезке локальные экстремумы и глобальные экстремумы функции \(f: I → \mathbb{R} : \end{align*} \)

a)
$$f(x) = x^3 + 2x - 10$$
, $I = [-1, 5]$; 6) $f(x) = x^2 - 4x + 6$, $I = [-3, 10]$.

- а) $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$, $\forall x \in [-1, 5]$. Значит, функция f строго возрастает на отрезке [-1, 5]. При этом , m = f(-1) = -13, $M = f(5) = 5^3 + 2 \cdot 5 10 = 125$.
- б) f'(x) = 2x 4, $\forall x \in [-3, 10]$. Решаем уравнение f'(x) = 0 и находим критические точки функции $f: 2x 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$. При $x_0 = 2$ функция f имеет локальный минимум, причем f(2) = 2.

Тогда, $m = \min[f(-3), f(2), f(10)] = \min[27, 2, 66] = 2,$ $M = \max[f(-3), f(2), f(10)] = \max[27, 2, 66] = 66$ являются глобальными экстремумами функции f.

Замечание. Если дифференцируемая функция f определена на интервале I=(a,b), конечном или бесконечном, то в предыдущем алгоритме значения f(a) и f(b) заменяют на $\lim_{x\to a+0} f(x)$ и $\lim_{x\to b-0} f(x)$ соответственно. Вычисляют нижнюю и верхнюю грани $m=\inf_{x\in I} f(x)$ и $M=\sup_{x\in I} f(x)$, которые, вообще говоря, не достигаются функцией f.

Задание с решением

Найдем нижнюю и верхнюю грани функции:

a)
$$f: (-\infty, 0) \to \mathbb{R}, \ f(x) = e^x - x;$$
 6) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x+1}{x^2+3}.$

a) $f'(x) = e^x - 1 < 0$, $\forall x \in (-\infty, 0)$. $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$.

Следовательно, $m = \inf_{x \in (-\infty, 0)} f(x) = 1$, $M = \sup_{x \in (-\infty, 0)} f(x) = +\infty$, и эти значения не достигаются функцией f.

б)
$$f'(x) = \frac{3 - x^2 - 2x}{x^2 + 3} = 0 \Leftrightarrow x = -3$$
 или $x = 1$.
 $f(-3) = -\frac{1}{6}$, $f(1) = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \to \infty} f(x) = 0$ и $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$.

Значит, $m = \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \min \left\{ -\frac{1}{6}, 0, \frac{1}{2} \right\} = -\frac{1}{6}, M = \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \max \left\{ -\frac{1}{6}, 0, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2},$

и эти значения достигаются функцией f.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

 \mathbf{A}_1 1. Найдите точки локального экстремума и локальные экстремумы функции $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 12$; 6) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 5$; B) $f(x) = (x^3 - 10)(x + 5)^2$;

6)
$$J(x) = x - 4x + 6x$$

$$f(x) = (x - 10)(x + 3)$$

- $f(x) = x^3 6x;$ д) $f(x) = (x-1)^2(x+2);$ e) $f(x) = 2x^3 + 2x 5.$
- 2. Работайте в парах! Найдите на указанном промежутке глобальные экстремумы функции $f: I \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9$$
, $I = [-1, 2]$;

6)
$$f(x) = x^3 - x$$
, $I = [0, 5]$.

В, 3. Найдите промежутки монотонности, точки локального экстремума, локальные экстремумы и составьте таблицу поведения функции $f \colon D \to \mathbb{R}$:


a) $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$;


- 6) $f(x) = x^2 \ln x$;

- Γ) $f(x) = \arctan x \ln x$;
- д) $f(x) = \frac{x^3}{2x^2}$;
- B) $f(x) = e^{\frac{1}{(x-3)}}$; e) $f(x) = (x+1)\sqrt{x^2-1}$.
- **4.** Исследуйте! При каких значениях действительного параметра а функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ возрастает на множестве \mathbb{R} :

a) $f(x) = ax - \ln(1 + x^2)$;

- 6) $f(x) = \arctan ax + x$;
- B) $f(x) = ax \sin x$?
- 5. (БАК, 2011) Найдите действительные значения параметра а, при которых функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{2}(a^2 - 1)x^3 + (a - 1)x^2 + 2x + 1$, возрастает на множестве \mathbb{R} .
- **6.** Используя производную, покажите, что функции f и g отличаются друг от друга на постоянную, и найдите эту постоянную:
 - a) $f,g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = 1 + 2\sin x \cos x$;
 - 6) $f,g:(-\infty,1) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \arctan x, \ g(x) = \arctan \frac{x+1}{1-x}$
 - B) $f,g:(-1,1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \arcsin x$, $g(x) = -\arccos x$.
- 7. Запишите промежутки монотонности функщии $f: [-5, 5] \to \mathbb{R}$, заданной графически.






- 8. Найдите на указанном промежутке локальные экстремумы и глобальные экстремумы функции $f: I \to \mathbb{R}$: a) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$, I = [-1, 2];
 - 6) $f(x) = \sin x + \cos^2 x$, $I = [0, \pi]$;
- B) $f(x) = x 2 \ln x$, I = (0, e].
- **9.** Найдите точки локального экстремума и локальные экстремумы функции $f \colon D \to \mathbb{R}$:
 - a) $f(x) = \frac{(2-x)^3}{(3-x)^2}$;
- 6) $f(x) = \sin^3 x + \cos^3 x$; B) $f(x) = x 2 \arctan x$;
- Γ) $f(x) = (x-1)e^{3x}$; π д) $f(x) = x^4 e^{-x^2}$;
- e) $f(x) = \frac{\ln^2 x}{x}$;
- ж) $f(x) = |x-1| \sqrt[3]{x+2}$; з) $f(x) = \begin{cases} x, \text{ если } x \le 0, \\ x \ln x, \text{ если } x > 0. \end{cases}$ и) $f(x) = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$.

- C_1 10. **Дана функция** $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}: f(x) = \sqrt[3]{x^2} \sqrt[3]{(x-1)^2}$.
 - а) Найдите f' на $\mathbb{R} \setminus \{0,1\}$.
 - б) Исследуйте на монотонность функцию f.
 - в) Сравните числа $\alpha = \sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{16}$ и $\beta = \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{25}$.
 - 11. Докажите неравенство: a) $(1+x)^{\alpha} \ge 1+\alpha x$, $\forall x \ge -1$, $\forall \alpha > 1$;
 - 6) $\ln(1+x)^2 < x, \ \forall x > 0.$
 - **12.** (БАК, 2009) Найдите глобальные экстремумы функции $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin 2x 2x$.

§2 Роль второй производной в исследовании функций

Как уже было установлено, за поведение дифференцируемой функции "отвечает" производная этой функции, а точнее нули и знаки производной. Однако тот факт, что функция f, например, строго возрастает на промежутке I, не является достаточным для того, чтобы установить вид ее графика. Например, функция $f(x) = \sqrt{x}$, определенная на промежутке $[0, +\infty)$, строго возрастает на этом промежутке, однако этой информации недостаточно для того, чтобы определить, имеет ли график функции f вид, указанный цветной кривой или черной кривой (рис. 5.2).




Вид графика функции может быть определен при помощи второй производной.

2.1. Выпуклость графика функции

Пусть функция $f: I \to \mathbb{R}$ ($I \subseteq \mathbb{R}$) дифференцируема на интервале I. Предположим, что график расположен выше (рис. 5.3а)) или ниже (рис. 5.3 б)) касательной, проведенной в любой точке этого графика.

В случае а) говорят, что график функции обращен *выпуклостью вниз*, а в случае б) – *выпуклостью вверх*.



Сформулируем строгое определение выпуклости вниз (выпуклости вверх) и покажем, что вторая производная, если она существует, дает точную информацию на этот счет.


Пусть функция $f\colon I\to \mathbb{R}$ дифференцируема на интервале I и $x_0\in I$. Уравнение касательной к графику функции f в точке $M_0(x_0,f(x_0))$ имеет вид:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Рассмотрим функцию $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$F(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Графиком функции F является касательная $M_{\scriptscriptstyle 0}T$ (рис. 5.4).



Говорят, что график функции f расположен выше касательной M_0T , если $F(x) \le f(x), \ \forall x \in I.$ (1)


Говорят, что график функции f расположен ниже касательной M_0T , если $F(x) \geq f(x), \quad \forall x \in I. \tag{2}$

Если неравенство (1) (неравенство (2)) строгое для любого $x \in I \setminus \{x_0\}$, говорят, что график функции f расположен строго выше (строго ниже) касательной M_0T .


Определения. • Функция $f: I \to \mathbb{R}$ ($I \subseteq \mathbb{R}$) называется выпуклой вниз (строго выпуклой вниз) на промежутке I, если график функции f расположен выше (строго выше) любой своей касательной.

- Функция $f: I \to \mathbb{R}$ ($I \subseteq \mathbb{R}$) называется выпуклой вверх (строго выпуклой вверх) на промежутке I, если график функции f расположен ниже (строго ниже) любой своей касательной.
- Говорят, что графиком функции f является кривая, обращенная выпуклостью вниз (строго выпуклостью вниз) или выпуклостью вверх (строго выпуклостью вверх) на некотором промежутке, если функция f обладает соответствующим свойством на этом промежутке.

Замечания. 1. Определение выпуклости вниз графика функции может быть сформулировано и так: для любой хорды AB, абсциссы которой принадлежат промежутку I, дуга AB расположена под этой хордой (рис. 5.5).



- **2.** Функция f выпукла вверх на промежутке I тогда и только тогда, когда функция -f выпукла вниз на I.
- **3.** Говорят, что график выпуклой вниз функции "держит воду" (рис. 5.6 a)), а график выпуклой вверх функции "не держит воду" (рис. 5.6 б)).



Исследование выпуклости вверх/вниз на основании определения довольно сложно даже для элементарных функций. Для любой дважды дифференцируемой функции нахождение промежутков выпуклости вверх/вниз сводится к изучению промежутков знакопостоянства второй производной.

Теорема 3. Если функция $f:(a,b)\to \mathbb{R}$ дважды дифференцируема на интервале (a,b) и $f''(x)\geq 0$ для любого $x\in (a,b)$, то функция f выпукла вниз на этом интервале.

Заменив f на -f и применив замечание 2, получим следующее следствие:

Следствие. Пусть функция $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ дважды дифференцируема на интервале (a,b). Если $f''(x)\leq 0$ для любого $x\in(a,b)$, то функция f выпукла вверх на (a,b).

Замечание. Если f''(x) > 0 (f''(x) < 0), $\forall x \in (a, b)$, то функция f строго выпукла вверх (строго выпукла вниз) на интервале (a, b).

Задание с решением

 $\$ Найдем промежутки выпуклости функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = ax^2 + bx + c$$
, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \ne 0$;

6)
$$f(x) = x^3$$
.

Решение:

- а) Функция f удовлетворяет условиям теоремы 3 и f''(x) = 2a. Следовательно, функция f строго выпукла вниз на множестве \mathbb{R} , если a > 0, и строго выпукла вверх на множестве \mathbb{R} , если a < 0.
- б) f''(x) = 6x. Значит, функция f строго выпукла вверх на интервале $(-\infty, 0)$ и строго выпукла вниз на интервале $(0, +\infty)$.

2.2. Исследование графика функции на выпуклость. Точки перегиба

Пусть функция $f\colon I\to\mathbb{R}$ дифференцируема на интервале I и $x_0\in I$ — критическая точка функции f, то есть $f'(x_0)=0$. Ранее мы установили, что если функция f' имеет разные знаки слева и справа от точки x_0 , то x_0 — точка локального экстремума функции f. Однако бывают случаи, когда сложно установить знак производной слева и справа от критических точек. Тогда применяют следующий достаточный признак для экстремумов, исключающий необходимость нахождения интервалов знакопостоянства функции f', при условии, что функция f дважды дифференцируема на интервале I.

Теорема 4. Если $x_0 \in (a,b)$ – критическая точка дважды дифференцируемой функции $f:(a,b) \to \mathbb{R}$ на интервале (a,b) и если $f''(x_0) > 0$ ($f''(x_0) < 0$), то x_0 является точкой локального минимума (локального максимума) функции f.

Задание с решением

Чайдем точки локального экстремума и локальные экстремумы функции, заданной формулой $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$.


Решение:

Найдем призводные первого и второго порядков: $f'(x) = 3x^2 + 12x + 9$ и f''(x) = 6x + 12.

Функция f' обращается в нуль в точках $x_1 = -3$ и $x_2 = -1$. Так как f''(-3) = -6 < 0 и f''(-1) = 6 > 0, то, по теореме 4, следует, что $x_1 = -3$ — точка локального максимума функции f и f(-3) = 0 — ее локальный максимум, а $x_2 = -1$ — точка локального минимума функции f и f(-1) = -4 — локальный минимум.

Если функция f дважды дифференцируема в окрестности точки x_0 , в которой $f''(x_0)=0$, и если слева от точки x_0 и справа от нее функция f'' имеет разные знаки, то функция f меняет свою выпуклость в этой точке. Например, если f''(x)>0 для $x< x_0$ и f''(x)<0 для $x> x_0$ (x принадлежит некоторой окрестности точки x_0), то функция f выпукла вниз слева от x_0 и выпукла вверх справа от x_0 .

Определение. Пусть функция $f:(a,b)\to \mathbb{R}$ дифференцируема на интервале (a,b). Точка $x_0\in (a,b)$ называется точкой перегиба функции f, если существует окрестность $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ такая, что функция f выпукла вниз на интервале $(x_0-\delta,x_0)$ и выпукла вверх на интервале $(x_0,x_0+\delta)$, или наоборот (рис. 5.7).






Рис. 5.7

Замечание. Если x_0 – точка перегиба функции f , то $M_0(x_0, f(x_0))$ называется **точкой перегиба графика** этой функции.

Теорема 5. Пусть функция $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ дважды дифференцируема в окрестности $V(x_0)$ точки $x_0\in(a,b)$ и $f''(x_0)=0$. Если $f''(x)<0, \ \forall x\in V, \ x< x_0, \$ и $f''(x)>0, \ \forall x\in V, \ x>x_0, \$ или наоборот (если $f''(x)>0, \ \forall x\in V, \ x< x_0, \$ и $f''(x)<0, \ \forall x\in V, \ x>x_0), \$ то x_0 является точкой перегиба функции f.

Заметим, что из условия $f''(x_0) = 0$ не следует, что x_0 является точкой перегиба функции f, так же, как из условия $f'(x_0) = 0$, не следует, что x_0 – точка локального экстремума функции f.

Промежутки выпуклости и точки перегиба дважды дифференцируемой на интервале функции f могут быть найдены по следующему *алгоритму*:

- ① Определяют f'', а затем находят решения уравнения f''(x) = 0, которые могут быть точками перегиба функции f).
- 2 Находят промежутки знакопостоянства функции f'', которые являются промежутками выпуклости функции f.
- $\ \ \,$ Определяют точки перегиба функции f .

Замечание. Если функция f'' в точке x_0 не существует или бесконечна, то эта точка также является возможной точкой перегиба функции f.

Задание с решением

Чайдем локальные экстремумы, точки перегиба и интервалы выпуклости функции:

- a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^3 3x^2 4;$
- 6) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = (x^2 + 4x + 6)e^{-x};$

Решение:

а) Так как f'(x) = 3x(x-2), то функция f имеет две критические точки: $x_1 = 0$ и $x_2 = 2$. Зная, что f''(x) = 6(x-1), получим: f''(0) = -6 < 0, f''(2) = 6 > 0. Значит,

 $x_1 = 0$ – точка локального максимума, а $x_2 = 2$ – точка локального минимума функции f. Интервалы знакопостоянства функции f'' ука-

заны в таблице поведения функции f:

Итак, функция f выпукла вверх на $(-\infty, 1)$ и выпукла вниз на $(1, +\infty)$, а 1точка перегиба.

б) $f'(x) = -(x^2 + 2x + 2)e^{-x}$ и $f''(x) = x^2e^{-x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Уравнение f'(x) = 0 не имеет решений на множестве \mathbb{R} . Поскольку функция f' непрерывна на множестве \mathbb{R} и f'(0) = -2, то f'(x) < 0, $\forall x \in \mathbb{R}$. Значит, функция f строго убывает на множестве \mathbb{R} . Уравнение f''(x) = 0 имеет решение $x_1 = 0$. Точка 0 не является точкой перегиба функции f, так как f''(x) > 0, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Значит, на множестве \mathbb{R} график функции f обращен выпуклостью вниз.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

A₁ **1.** Найдите промежутки выпуклости функции $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^3 + 9x^2 - x + 1$$
; 6) $f(x) = \frac{x}{1 - x^2}$; B) $f(x) = \sin x$; $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$;

6)
$$f(x) = \frac{x}{1 - x^2}$$

$$\mathbf{B}) f(x) = \sin x;$$

$$f(x) = e^x - \frac{x^2}{2};$$

д)
$$f(x) = x + \sqrt[3]{x}$$
; e) $f(x) = x^2 \ln x$; ж) $f(x) = x \sin(\ln x)$.

e)
$$f(x) = x^2 \ln x$$
;

ж)
$$f(x) = x \sin(\ln x)$$

2. Найдите точки перегиба функции $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 2x$$

5)
$$f(x) = \sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x+1}$$
;


наидите точки перегиоа функции
$$f: D \to \mathbb{R}$$
:
a) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 2x$; б) $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + \sqrt[3]{x+1}$; в) $f(x) = \frac{a^3}{a^2 + x^2}$ $(a > 0)$;
г) $f(x) = x + \sin x$; д) $f(x) = x + x^{\frac{5}{3}}$; е) $f(x) = \sqrt{1+x^2}$; ж) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$.

$$\Gamma) f(x) = x + \sin x$$


д)
$$f(x) = x + x^{\frac{3}{3}};$$


e)
$$f(x) = \sqrt{1 + x^2}$$
;


ж)
$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$$



4.







Для каждой из этих функций перечертите и заполните следующую таблицу:

. Дана дважды дифференцируемая функция
$f:[0,4] \rightarrow \mathbb{R}$. В таблице указаны знаки функ-
ций f' и f'' .

- 1) Используя эти данные, дополните последнюю строку таблицы, указав:
 - а) возрастание (/), убывание (\), выпуклость вверх (), выпуклость вниз (\frown) функции f;
 - б) точки экстремума;
 - в) точки перегиба.
- 2) Постройте график функции, для которой выполнены табличные условия.

x	0 1	1 2	. 3	4
f'	+	+	-	+
f''	+	-	-	+
f				

- **С**₁ **5.** *Исследуйте!* Покажите, что:
 - а) функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = ax + b, $a, b \in \mathbb{R}$, выпукла вверх и выпукла вниз;
 - б) функция $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ g(x) = ax^2 + bx + c, \ a, b, c \in \mathbb{R}, \ выпукла вверх при <math>a < 0$ и выпукла вниз при a > 0.
 - **6.** Исследуйте! Дана дважды дифференцируемые функции $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и $\alpha > 0$.
 - 1) Покажите, что:
 - а) если функции f и g выпуклы вверх (выпуклы вниз), то функция f+g выпукла вверх (выпукла вниз);
 - б) если функция f выпукла вверх (выпукла вниз), то функция αf выпукла вверх (выпукла вниз) для любого $\alpha > 0$.
 - 2) Приведите пример двух функций f и g выпуклых вверх (выпуклых вниз) таких, что функция f+g не будет выпукла вверх (выпукла вниз).

§3 Построение графиков функций

Изобразить графически функцию $f \colon E \to \mathbb{R}$ означает построить ее график $G_f = \{(x, f(x)) | x \in E\}$ в прямоугольной системе координат xOy. Чтобы построить график функции, необходимо поэтапно исследовать поведение функции, выявить некоторые элементы, характеризующие функцию.

І. Область определения функции. Если область определения функции f не указана, то *подразумевается*, что таковой является максимальная область определения, образованная из множества $D \subseteq \mathbb{R}$, для которой f(x), $x \in D$, имеет смысл. В задачах из физики, геометрии, экономики и т. д. могут быть дополнительные ограничения, относящиеся к области определения (исследования).

После того как была найдена область определения функции f, находят точки пересечения графика функции f с осями координат: с осью Ox (y=0) – это точки $(x_1,0), (x_2,0),..., x_1,x_2,...$ – решения уравнения f(x)=0 (если таковые существуют); с осью Oy (x=0) – это точка (0,f(0)), если $0 \in D$.

ІІ. Знак функции и возможные симметрии графика. Если $f \ge 0$ $(f \le 0)$, то график функции f расположен выше (ниже) оси Ox.

Если f – четная (нечетная) функция, то ее график симметричен относительно оси Oy (относительно начала координат), и в этом случае область исследования D может быть сужена до множества $D \cap [0, +\infty)$.

Если f — периодическая функция, то достаточно исследовать функцию на промежутке, длина которого равна основному периоду функции, а затем график функции продолжить параллельными переносами на множестве D.

III. Пределы на концах промежутков, непрерывность функции, асимп- тоты. Если множество D не ограничено, то вычисляют (если существует) предел функции f при $x \to +\infty$ (или/и при $x \to -\infty$), находят (если существуют) горизонтальные, наклонные асимптоты графика функции f.

Если D — объединение промежутков, то вычисляют односторонние пределы функции f на концах каждого из этих промежутков. Одновременно находят возможные вертикальные асимптоты. Также определяют точки множества D, в которых функция f непрерывна, а в точках разрыва вычисляют односторонние пределы.

IV. Первая производная. Находят производную f'. Определяют множество $D_{f'}$, на котором функция дифференцируема. Решив уравнение f'(x) = 0, находят критические точки функции f. Решения этого уравнения, а также и точки, в которых функция f не дифференцируема или ее производная равна бесконечности, являются возможными точками локального экстремума этой функции. Они делят множество D на конечное (или бесконечное) число промежутков. Определяют знак функции f' на каждом из полученных промежутков. Таким образом, устанавливаются промежутки монотонности, точки локального экстремума и локальные экстремумы функции f.

Если функция f дважды дифференцируема, то для более точного построения ее графика исследуют вторую производную.

- **V. Вторая производная.** Находят вторую производную f'', а затем решают уравнение f''(x) = 0. Решения этого уравнения, а также точки, в которых вторая производная не существует или бесконечна, являются возможными точками перегиба функции f. Находят интервалы знакопостоянства второй производной и знак функции f'' на этих интервалах (которые являются интервалами выпуклости функции f) и выявляют ее точки перегиба.
- $\emph{VI. Таблица поведения}$ функции f включает в себя результаты, полученные на этапах I-V.

В первой строке записывают данные, относящиеся к области определения функции f, и замечательные значения аргумента x (нули первой и второй производных, а также точки, в которых функции f' и f'' не существуют или бесконечны).

Во второй строке записывают данные, относящиеся к первой производной, полученные на этапе IV. В каждом столбце нуля производной ставят 0. Записывают знак производной на полученных интервалах.

В третьей строке записывают данные относительно второй производной, полученные на этапе V. В столбце каждого нуля второй производной ставят 0. Записывают знак второй производной на полученных интервалах.

В последней строке монотонность функции f обозначают стрелочками " \nearrow ", " \searrow ", а соответствующие символы " \searrow ", " \searrow " указывают на выпуклость вниз, соответственно на выпуклость вверх функции; буквы \overline{m} , \overline{M} или i обозначают соответственно точку локального минимума, локального максимума или точку перегиба.

VII. Построение графика. В прямоугольной системе координат xOy строят асимптоты графика функции f (если таковые существуют) и замечательные точки (x, f(x)) из таблицы поведения функции f. Замечательные точки графика функции f соединяются кривой линией, при этом учитываются четность, периодичность, монотонность, наличие асимптот и выпуклость функции f.

Замечание. Этап V может быть опущен в случае затруднений при вычислениях.

Придерживаясь этапов I–V, построим графики некоторых функций.

Задания с решением

\$ 1. Построим график функции $f: D \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$$
;
 6) $f(x) = \frac{x}{1 + x^2}$;
 8) $f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$.

6)
$$f(x) = \frac{x}{1+x^2}$$
;

$$f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$$

Решение:

а) І. Областью определения функции f является множество $\mathbb R$.

При x=0 имеем f(0)=0. $f(x)=0 \Leftrightarrow \frac{x^3}{3}-2x^2+3x=0 \Leftrightarrow x(x^2-6x+9)=0 \Leftrightarrow$ \Leftrightarrow $x \in \{0, 3\}$. Следовательно, график функции f проходит через начало координат и пересекает ось Ox в точке $x_0 = 3$.

II. Функция f не является ни четной, ни нечетной, так как $f(-x) = -\frac{x^3}{3} - 2x^2 - 3x$ и $f(-x) \neq f(x)$, $f(-x) \neq -f(x)$. Так как $f(x) = \frac{1}{3}(x^3 - 6x^2 + 9x) = \frac{1}{3}x(x-3)^2$, то $f(x) \ge 0$ при $x \ge 0$ и $f(x) \le 0$ при $x \le 0$.

III. Функция f непрерывна на множестве \mathbb{R} , значит, вертикальных асимптот нет. Вычислим пределы на концах интервала $(-\infty, +\infty)$. Имеем:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{3} x(x-3)^2 = -\infty \quad \text{if } \lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{3} x(x-3)^2 = +\infty.$$

Значит, у графика функции f нет ни наклонных, ни горизонтальных асимптот.


IV.
$$f'(x) = x^2 - 4x + 3$$
.

 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x \in \{1, 3\}$. Точки $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$ являются критическими точками.

V. Не будем находить вторую производную, так как это задание рассматривается для гуманитарного профиля.

VI. Информация о поведении функции fприведена в таблице:

Вычислим:
$$\overline{M} = f(1) = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3}$$
, $\overline{m} = f(3) = 9 - 18 + 9 = 0$.



- VII. График функции f изображен на рисунке 5.8.
- б) І. Максимальной областью определения функции f является множество \mathbb{R} . График функции f пересекает координатные оси только в начале координат.
- II. Функция f не является периодической; f нечетная, так как f(-x) = -f(x), $\forall x \in \mathbb{R}$. Значит, достаточно сузить область определения (\mathbb{R}) до множества $\mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$.

III. Функция f непрерывна на множестве \mathbb{R} . Пределы функции f на концах интервала $(-\infty, +\infty)$ равны $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$ и $\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$. Следовательно, прямая y=0 является горизонтальной асимптотой графика функции f при $x\to-\infty$ и при $x\to+\infty$.

IV. $f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Уравнение f'(x) = 0 имеет решения $x_1 = -1$ и $x_2 = 1$ (критические точки функции f). При x > 0 подходит только $x_2 = 1$.

Очевидно, что f(1) = 0.5.


V.
$$f''(x) = \frac{2x(x^2 - 3)}{(1 + x^2)^3}$$
. Решением уравнения $f''(x) = 0$ при $x > 0$ является $x_3 = \sqrt{3}$.

VI. Составим таблицу поведения функции f при $x \ge 0$:

В таблице $\overline{M}=f(1)=\frac{1}{2}$ — локальный максимум, а $x_3=\sqrt{3}$ — точка перегиба. Точка $x_2=0$ также является точкой перегиба.

VII. Построим график функции f на множестве \mathbb{R}_+ (рис. 5.9). Так как f – нечетная функция, построим относительно начала прямоугольной системы координат xOy график, симметричный графику, построенному на множестве \mathbb{R}_+ , и получим график функции f на множестве \mathbb{R} .

х	0		1		$\sqrt{3}$	+∞
f'		+	0	_	_	_
f''	0	_	_	_	0	+
f	i	\rightarrow	\overline{M}	$\overline{}$	i \	<u> </u>



в) І. $D = \mathbb{R}$. Для x = 0 получим f(0) = 0. $f(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x \in \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

График функции f пересекает ось Oy в начале координат, а ось Ox – в точках $x_k = k\pi, \ k \in \mathbb{Z}$.

- II. Функция f нечетная, периодическая с основным периодом 2π . Значит, исследуем функцию f на отрезке $[0,2\pi]$, а при построении ее графика учтем его симметричность относительно начала координат и периодичность функции f.
 - III. Функция f непрерывна, асимптот у нее нет.
- IV. Найдем $f'(x) = \frac{1+2\cos x}{(2+\cos x)^2}$. Уравнение f'(x) = 0 ре $[0, 2\pi]$ имеет два решения: $x_1 = \frac{2\pi}{3}$ и $x_2 = \frac{4\pi}{3}$.
 - V. Вторую производную не будем вычислять, ввиду сложности вычислений.
- VI. Составим таблицу поведения функции f (на отрезке $[0, 2\pi]$):

Вычислим:
$$\overline{M} = f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$
, $\overline{m} = f\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

VII. Построим график функции f на отрезке $[0, 2\pi]$, а затем параллельными переносами продолжим его на множестве \mathbb{R} периодично с периодом 2π . Часть графика функции f изображена на рисунке 5.10.




Рис. 5.10

У 2. Дана функция $f: D \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x(x+a)}$, где $a \in \mathbb{R}$. Построим график функции f, если известно, что он проходит через точку (1, 1).

I. Так как точка
$$(1, 1) \in G_f$$
, то получим: $f(1) = 1 \Leftrightarrow \frac{3}{1(1+a)} = 1 \Leftrightarrow a = 2$. Значит, $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x(x+2)}$ и множество $D = (-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, +\infty)$ является

ее максимальной областью определения.

График функции f не пересекает оси координат.

II. Функция f не является периодической; f не является ни четной, ни нечетной; $f(x) \ge 0$ тогда и только тогда, когда x(x+2) > 0 ($x \in D$), то есть $x \in (-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$, и $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-2, 0)$.

III. Функция f непрерывна на множестве D. Вычислим ее пределы на концах интервала (-2, 0):

$$l_{\pi}(-2) = \lim_{x \to -2-0} \frac{2x^2 + 1}{x(x+2)} = +\infty, \quad l_{\pi}(-2) = \lim_{x \to -2+0} \frac{2x^2 + 1}{x(x+2)} = -\infty,$$

$$l_{\pi}(0) = \lim_{x \to -0} \frac{2x^2 + 1}{x(x+2)} = -\infty, \ l_{\pi}(0) = \lim_{x \to +0} \frac{2x^2 + 1}{x(x+2)} = +\infty.$$


Следовательно, прямые x = -2 и x = 0 являются левыми и правыми вертикальными асимптотами графика функции f.

Так как $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+1}{x(x+2)} = 2$, то прямая y=2 является горизонтальной асимптотой графика функции f при $x \to -\infty$ и при $x \to +\infty$.


IV.
$$f'(x) = \frac{4x^2 - 2x - 2}{x^2(x+2)^2}$$
, $\forall x \in D$ и $f'(x) = 0$, если $x_1 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = 1$.

V. Вторую производную не будем вычислять, ввиду сложности вычислений.

VI. Составим таблицу поведения функции f: Вычислим: $\overline{m} = f(1) = 1$ и



VII. График функции f изображен на рисунке 5.11.



Упражнения и задачи

Реальный профиль

A₁ **1.** Постройте график функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = -2x^2 + x + 1$$
;

6)
$$f(x) = x^2 + 3x - 4$$
;

B)
$$f(x) = x^3 - 3x + 2$$
;

$$f(x) = x^2(x-1)^2$$
.

B₁ **2.** Постройте график функции $f: D \to \mathbb{R}$ (исследования функции с использованием второй производной можно опустить, если соответствующие вычисления громоздки):

a)
$$f(x) = x \ln x$$
;

6)
$$f(x) = \frac{x^2}{x+2}$$
;

B)
$$f(x) = x + \sqrt{1 - x^2}$$
:

$$\Gamma) f(x) = e^{-x^2};$$

д)
$$f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}$$
;

e)
$$f(x) = \frac{|1-x^2|}{x}$$
;

$$f(x) = (x-3)\sqrt{x}$$


3)
$$f(x) = \sin^4 x + \cos^4 x$$
.

3. Зная, что сумма длин катетов прямоугольного треугольника равна a:

- а) выразите площадь этого треугольника в виде функции от длины катета;
- б) постройте график полученной функции;

в) найдите наибольшую площадь этого треугольника (наибольшее значение полученной функции).

 C_1 **4.** (БАК, 2015) На рисунке изображен график дифференцируемой функции f: $[-5,6] \rightarrow \mathbb{R}$. Используя рисунок, запишите в рамки один из знаков "<", ">" или "=", чтобы полученное высказывание было истинным:




a)
$$f'(-1) \Box 0;$$

б)
$$f'(4) \square 0$$
;

B)
$$f''(-4) \Box 0;$$

$$\Gamma$$
) $f''(2) \square 0$.

5. (БАК, 2014) На рисунке изображен график функции $f: [-5, 6] \rightarrow \mathbb{R}$. Запишите в рамки множество решений неравенства:



a)
$$f'(x) > 0$$
, $S =$;

6)
$$f'(x) < 0$$
, $S =$

§4 Применение производных в физике, геометрии, экономике. Задачи на максимум и минимум

В данном параграфе рассмотрим применение теоретических результатов, полученных ранее при нахождении точек экстремума некоторых функций. В то же время приведем примеры эффективного применения методов математического анализа при решении задач по физике, геометрии, экономике и т.д., в которых необходимо найти оптимальную величину некоторой технической, экономической системы, обеспечивающую максимальную эффективность, максимальную мощность, позволяющую оптимизировать потребление энергии на длительное время с минимальными расходами. Решение такого рода задач выполняется определенным процессом, называемым оптимизацией, который состоит в выборе и применении наиболее подходящих (наилучших) решений из числа возможных, в распределении величин, соответствующих наибольшему или наименьшему значению функции. Заметим, что такие задачи не всегда могут быть решены алгебраическими методами или методами элементарной геометрии.

Для нахождения наибольшего или наименьшего значения какой-либо величины выразим значения этой величины (если это возможно) через некоторую функцию, а затем исследуем поведение полученной функции.

Задачи с решением

№ 1. Из прямоугольного листа жести размером 50 × 80 см надо изготовить открытую коробку в виде прямоугольного параллелепипеда, вырезав квадратные уголки и загнув их. Найдем высоту коробки, при которой ее объем будет максимален.




Рис. 5.12

Решение:

Обозначив через x длину стороны вырезанного квадрата, получим объем $\mathcal{V}(x)$ коробки: $\mathcal{V}(x) = x(50-2x)(80-2x) = 4x^3 - 260x^2 + 4000x$,

где значения x могут меняться в пределах отрезка $\left[0,\frac{50}{2}\right]$ = $\left[0,25\right]$. Таким образом, задача сводится к нахождению наибольшего значения функции \mathcal{V} : $\left[0,25\right] \to \mathbb{R}$, $\mathcal{V}(x) = 4x^3 - 260x^2 + 4000x$.


Найдем экстремумы функции \mathcal{V} . Имеем $\mathcal{V}'(x) = 12x^2 - 520x + 4000$. Уравнение $\mathcal{V}'(x) = 0$ на отрезке [0, 25] имеет единственное решение: $x_0 = \frac{130 - \sqrt{4900}}{6} = 10$. Так как $\mathcal{V}(0) = \mathcal{V}(25) = 0$, то в точке x_0 функция \mathcal{V} достигает наибольшего значения.

Ответ: Объем коробки максимален, если ее высота будет равна 10 см.

 $\$ 2. Из всех прямоугольников, периметр которых равен 2a, найдем прямоугольник, площадь которого максимальна.

Решение:

Обозначим через x длину стороны AB прямоугольника ABCD, AD > AB (рис. 5.13).



Тогда
$$AD = \frac{2a-2x}{2} = a-x$$
.

Площадь прямоугольника ABCD равна $\mathcal{A}(x) = x(a-x) = -x^2 + ax$.

Рассмотрим функцию $\mathcal{A}: [0, a] \to \mathbb{R}, \ \mathcal{A}(x) = -x^2 + ax$.

Тогда
$$\mathcal{A}'(x) = -2x + a$$
. $\mathcal{A}'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x + a = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{2}$.

Составим таблицу поведения функции $\mathcal{A}: [0, a] \to \mathbb{R}:$ x = 0 $\frac{a}{2} = a$ Прямоугольник ABCD достигает максимальной площади $\mathcal{A}\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4}$, если он будет квадратом со стороной $\frac{a}{2}$ $\mathcal{A}(x)$ $\mathcal{A}(x)$ $\mathcal{A}(x)$ $\mathcal{A}(x)$ роной $\frac{a}{2}$.

Ответ:
$$\mathcal{A}_{\text{max}} = \frac{a^2}{4}$$
 квадратных единиц.

Следствие. Если сумма двух положительных чисел известна, то их произведение будет максимальным при условии, что эти числа равны.

Аналогично можно доказать, что сумма двух положительных чисел, произведение которых постоянно, будет минимальной, если эти числа равны.

\$\\\$\\$ 3. Определим координаты точки графика функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 3$, удаленной на минимальное расстояние от точки M (10, 5) (рис. 5.14).

Решение:

Любая точка A графика функции f имеет абсциссу x и ординату $x^2 + 3$, $x \in \mathbb{R}$. Обозначим через $\varphi(x)$ расстояние между точками M и A.

$$\varphi(x) = \sqrt{(x-10)^2 + (x^2 + 3 - 5)^2} = \sqrt{x^4 - 3x^2 - 20x + 104}.$$

Решение задачи сводится к нахождению минимума

функции
$$\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ \varphi(x) = \sqrt{x^4 - 3x^2 - 20x + 104}.$$

Имеем:
$$\varphi'(x) = \frac{2x^3 - 3x - 10}{\sqrt{x^4 - 3x^2 - 20x + 104}} = 0 \Leftrightarrow x = 2.$$

Точка $x_0 = 2$ является точкой локального минимума функции φ , так как $\varphi' < 0$, если x < 2, и $\varphi' > 0$, если x > 2. Тогда $f(2) = 2^2 + 3 = 7$. Значит, координаты точки A равны 2 и 7.




Рис. 5.14

Ответ: Искомая точка A имеет координаты 2 и 7.

🔖 4. Земельный участок прямоугольной формы надо оградить, зная, что с одной стороны он уже огражден. Стоимость одного метра ограды, параллельной уже построенной ограде, равна 100 леям, а стоимость оставшейся ограды составляет 150 леев за метр. Найдем максимальную площадь, которую можно оградить, если мы располагаем суммой в 18000 леев.

Решение:

Пусть
$$x$$
 и y – измерения участка, тогда, по условию задачи, получим:

$$100 \cdot x + 2 \cdot 150 \cdot y = 18000 \Leftrightarrow x + 3y = 180 \Leftrightarrow y = 60 - \frac{x}{3}$$

Площадь участка равна $\mathcal{A}(x) = x \cdot y = x \left(60 - \frac{x}{3} \right)$. $\mathcal{A}'(x) = 60 - \frac{2}{3}x$.

Для $\mathcal{A}'(x) = 0$ получим $60 - \frac{2}{3}x = 0 \Leftrightarrow x = 90$.

Так как $\mathcal{A}''(x) = -\frac{2}{3} < 0$, то в точке x = 90 функция $\mathcal{A}(x)$ имеет максимум.

Значит, максимальная площадь, которую можно оградить, равна


$$\mathcal{A}_{\text{max}} = 90 \cdot \left(60 - \frac{90}{3} \right) = 2700 \, (\text{m}^2).$$

Ответ: 2700 м².

 $\begin{align*} $ \begin{align*} 5. Определите наиболее экономичный маршрут для строительства железно-дорожного пути между населенными пунктами <math>A$ и B, зная, что часть пути, длиной d, должна быть построена параллельно и близко к шоссейной дороге.

Решение:

Пусть h_1 , h_2 — расстояния между пунктами A, соответственно B, и шоссейной дорогой, a — расстояние между проекциями точек A и B на направление дороги (рис. 5.15).



Очевидно, что стоимость железнодорожного пути прямо пропорциональна длине пути L(x). Исходя из рисунка, получим:

$$L(x) = AM + MN + NB = \sqrt{x^2 + {h_1}^2} + d + \sqrt{{h_2}^2 + (a - x - d)^2}.$$

Имеем
$$L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + h_1^2}} - \frac{a - x - d}{\sqrt{h_2^2 + (a - x - d)^2}}$$

Решениями уравнения L'(x)=0 являются $x_1=\frac{(a-d)h_1}{h_1+h_2}, \quad x_2=\frac{(a-d)h_1}{h_1-h_2}.$

В точке $x_1 = \frac{(a-d)h_1}{h_1 + h_2}$, функция L(x) имеет минимум, так как $L''(x_1) > 0$.

Следовательно, $L_{\min} = L(x_1) = \sqrt{(a-d)^2 + (h_1 + h_2)^2} + d$.

6. Рыночный спрос на товар задан функцией $p(x) = 780 - 2x - 0.1x^2$, где x -количество товара, а p -цена (в леях). Средние затраты на производство товара выражены функцией $\overline{C}(x) = \frac{1000}{x} + 500 + 2x$. (Функция спроса и функция средних затрат определяются на основе статистических данных.)

Найдем цену, при которой доход (валовой) будет максимален, и величину этого дохода.

Решение:

Валовой доход выражается формулой $B(x) = p(x) \cdot x - \overline{C}(x) \cdot x =$ = $(780 - 2x - 0.1x^2)x - \left(\frac{1000}{x} + 500 + 2x\right)x = 280x - 4x^2 - 0.1x^3 - 1000.$

Первая производная равна $B'(x) = 280 - 8x - 0.3 \cdot x^2$.

Приравняв производную к нулю B'(x) = 0, получим уравнение $0.3x^2 + 8x - 280 = 0$, которое имеет решения $x_1 = 20$, $x_2 = -\frac{28}{0.6}$ (x_2 не удовлетворяет условию задачи). Так как B''(20) < 0, то x = 20 – точка максимума. Значит, максимальный доход $B(20) = 280 \cdot 20 - 4 \cdot 20^2 - 0.1 \cdot 20^3 - 1000 = 2200$ (леев) и соответствующая цена $p(20) = 780 - 2 \cdot 20 - 0.1 \cdot 20^2 = 700$ (леев).

Ответ: 2200 леев; 700 леев.

5. Грузовик должен проехать 100 км со средней скоростью v км/ч (при условии, что $40 \le v \le 70$), израсходовав при этом $\left(8 + \frac{v^2}{300}\right)$ литров бензина в час. Найдем оптимальную скорость (при которой затраты наименьшие), если известно, что водителю платят по 30 леев/ч, а литр бензина стоит 15 леев.

Решение:

Весь путь был пройден за $\frac{100}{v}$ часов, и за это время было израсходовано $\left(8 + \frac{v^2}{300}\right) \cdot \frac{100}{v} = \frac{v^2 + 2400}{3v}$ литров бензина.

В этих условиях общие затраты пробега равны

$$c(v) = 30 \cdot \frac{100}{v} + 15 \cdot \frac{v^2 + 2400}{3v} = \frac{5v^2 + 15000}{v}$$
 (леев).

Оптимальная скорость – это скорость, при которой общие затраты минимальны. Решив уравнение $c'(v) = \frac{5v^2 - 15000}{v^2} = 0$, получим, что $v_0 = \sqrt{3000} \approx 54{,}77$ (км/ч). Следовательно, для этого значения скорости общие затраты минимальны.

Ответ: $v_{\text{оптим}} \approx 54,77 \text{ (км/ч)}.$

§ 8. Работник должен переместить деталь из бронзы по железной горизонтальной поверхности с силой \overrightarrow{Q} . Масса детали равна 100 кг, а коэффициент трения бронзы по железу равен $\mu = 0,2$. Определим величину угла α , образованного направлением силы и горизонтальной поверхностью, чтобы для этого перемещения приложить минимальную силу \overrightarrow{Q} .

Решение:

Из рисунка 5.16 видно, что динамическое равновесие силы трения \overrightarrow{F} , силы тяги \overrightarrow{Q} , силы тяжести \overrightarrow{G} и силы реакции опоры \overrightarrow{N} имеет место, если:

$$\begin{cases} Q\cos\alpha - F = 0, \\ N + Q\sin\alpha - G = 0. \end{cases}$$

Из этой системы, подставив формулу силы трения $F = \mu N$, определим функцию $Q(\alpha)$, минимум которой надо найти:

$$Q(\alpha) = \frac{\mu G}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}.$$




Рис. 5.16

Таким образом, задача сводится к нахождению наименьших значений функции $Q: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}, \ \ Q(\alpha) = \frac{\mu G}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}.$

Найдем экстремумы функции Q. Имеем $Q'(\alpha) = -\frac{\mu G(\mu \cos \alpha - \sin \alpha)}{(\cos \alpha + \mu \sin \alpha)^2}$. Решение уравнения $Q'(\alpha) = 0$ равно $\alpha = \arctan \mu$. При этом значении α функция $Q(\alpha)$ имеет один минимум:

 $Q_{\min} = Q(\operatorname{arctg}\mu) = \frac{\mu G}{\sqrt{1 + \mu^2}}.$

Подставляя данные задачи, получим:

$$tg\alpha \approx 0.2$$
; $\alpha \approx 11^{\circ}20'$ и $Q = \frac{0.2 \cdot 100}{\sqrt{1 + 0.2^2}} \approx 19.6$ кг.

Ответ: ≈ 11°20′.


\$ 9. Над круглой поверхностью радиуса a висит лампа. На какую высоту следует подвесить эту лампу, чтобы освещенность поверхности была максимальна, зная, что сила света I по вертикальному направлению постоянна, а освещенность E задана формулой $E = \frac{I \cdot \cos \alpha}{r^2}$, где α — угол падения лучей на эту поверхность.

Решение:

Обозначим через x расстояние от источника света до поверхности. Исходя из рисунка 5.17, получим:

$$r^2 = a^2 + x^2$$
 и $\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}$.

Значит, функция, максимум которой надо найти, имеет вид $E=E(x)=\frac{I\cdot x}{\left(a^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}},\ x\in(0,+\infty).$



Приравняв производную к нулю, получим:

$$E'(x) = I \frac{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}} - 3x^2(a^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}}{(a^2 + x^2)^3} = 0.$$

Находим решение этого уравнения $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$. При этом значении функция E(x) имеет один максимум: $E_{\text{max}} = \frac{2I}{3\sqrt{3}a^2}$.

Omsem:
$$x = \frac{a}{\sqrt{2}}$$
.

5 10. Чему должно равняться сопротивление внешней цепи, если источник тока, электрическое напряжение которого $\varepsilon = 10 \text{ V}$, и внутреннее сопротивление $r = 20 \Omega$, расходует максимальную силу тока? Чему равно числовое значение этой силы?

¹ Единицей измерения освещенности является люкс (лк).

Решение:

Обозначим через x сопротивление внешней цепи и через P силу электрического тока. Тогда, согласно формуле силы тока, получим: $P = I^2 x$, где I – электрическое напряжение, которое можно найти по закону Ома: $I = \frac{\mathcal{E}}{x+r}$.

Итак, мы получили функцию $P(x) = \frac{\varepsilon^2 \cdot x}{(x+r)^2}$, $x \in (0,+\infty)$, производная которой

$$P'(x) = \varepsilon^2 \frac{(x+r)^2 - 2x(x+r)}{(x+r)^4} = \varepsilon^2 \frac{r-x}{(x+r)^3}$$

обращается в нуль в точке x=r. В этой точке функция P(x) имеет один максимум. Подставив данные задачи, получим $P_{\max}=P(r)=\frac{\mathcal{E}^2}{4r}=\frac{5}{4}$ W.

Omeem: x = r, $P_{\text{max}} = \frac{5}{4}$ W.

Упражнения и задачи


Реальный профиль

- **A**₁ **1.** Материальная точка движется по оси согласно закону $s(t) = 12t t^3$ (где s расстояние, выраженное в метрах, а t время, выраженное в секундах).
 - а) Какова начальная скорость материальной точки?
 - б) Через какое время, после начала движения, материальная точка остановится? Чему равно расстояние, пройденное за это время?
 - **2.** Материальная точка движется по оси согласно закону $s(t) = at^3 + bt + c$. Найдите скорость и ускорение материальной точки в момент времени t.
 - **3.** Работайте в парах! Материальная точка движется по оси согласно закону $s(t) = t^3 6t^2 + 2$. Найдите:
 - а) момент времени, в который ускорение материальной точки равно нулю;
 - б) минимальное значение скорости материальной точки.
- **В**₁ **4.** Гальванический элемент с электродвижущей силой E и с внутренним сопротивлением r вырабатывает ток силой I во внешнюю цепь с сопротивлением R. Сила тока выражается формулой $I = \frac{E}{r+R}$, а мощность гальванического элемента формулой $P(R) = RI^2 = \frac{RE^2}{(r+R)^2}$.

При каком значении R мощность P будет максимальна?

- \mathbb{C}_1 5. В треугольник со стороной a и высотой h, проведенной к этой стороне, вписан прямоугольник таким образом, что одна из его сторон содержится стороной a треугольника. Найдите максимальную площадь прямоугольника.
 - **6.** Цена товара составляет 225 леев. Затраты на производство товара выражены функцией $C(x) = 95x + x^2$, где x количество произведенного товара. Определите максимальный доход.
 - 7. Работайте в парах! Затраты на производство товара выражены функцией C(x) = 5 + 36x, а спрос функцией $p(x) = -x^2 + 18x + 3$, 9 < x < 13. Определите количество товара x, при котором доход будет максимален, и найдите сумму этого дохода.

8. (БАК, 2007) На чертеже, *АВ* – железная дорога, а C – точка, которая находится на расстоянии 8 км от железной дороги и на расстоянии $\sqrt{4964}$ км от точки А. Для перевозки грузов из точки A в точку C предполагается постро-



ить дорогу (прямолинейную) от точки C до точки M железной дороги. Известно, что стоимость перевозки тонны грузов по железной дороге составляет 30 леев (за километр), а по дороге -50 леев (за километр). Найдите расстояние AM, при котором стоимость перевозки одной тонны груза из точки A в точку C (через AMC) минимальна.

9. Проект Применение производной в экономике. (Открытие понятия эластичности.)

Упражнения и задачи на повторение

Реальный профиль

 \mathbf{A}_1 1. Найдите промежутки монотонности функции $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^3 + 6x^2$$

6)
$$f(x) = x^3 - \frac{x}{3}$$
;

B)
$$f(x) = (x+1)^2$$
;

- a) $f(x) = x^3 + 6x^2$; 6) $f(x) = x^3 \frac{x}{3}$; B) $f(x) = (x+1)^2$; $f(x) = x^2 + x + 1$.
- 2. Найдите промежутки монотонности, точки локального экстремума, локальные экстремумы и составьте таблицу поведения функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^2 + 2x$$
;

6)
$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$$
;

B)
$$f(x) = (x-1)^2(x+2)^2$$
;

$$f(x) = (x+1)^3(x-2)^2;$$

д)
$$f(x) = 3 + x - x^2$$
;

e)
$$f(x) = x^4 - 4x + 2$$
.

3. Найдите точки локального экстремума, локальные экстремумы функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$
;

6)
$$f(x) = x^4 - \frac{9}{2}x^2 + 8;$$

B)
$$f(x) = x^3 - 12x + 4$$
;

$$f(x) = x^3 + x - 4;$$

д)
$$f(x) = \frac{1}{5}x^5 + x^3 - 4x + 1;$$

e)
$$f(x) = x^2(x+1)^3$$
.

4. На указанном промежутке определите глобальные экстремумы функции $f: I \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 2$$
, $I = [0; 1]$; 6) $f(x) = x^3 - x + 2$, $I = [0; 2]$.

6)
$$f(x) = x^3 - x + 2$$
, $I = [0; 2]$.

5. \bigcirc *Работайте в парах!* Постройте график функции $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a)
$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$$
;

6)
$$f(x) = x^2 + 2x + 2$$
.

- **6.** Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + ax^2 2$. Постройте график функции f, зная, что:
 - а) график функции проходит через точку (1, 1);
 - б) в точке x = 1 функция f имеет локальный экстремум.
- 7. Цена товара составляет 240 леев. Затраты на производство товара выражены функцией $C(x) = 3x^2 + 6x + 120$, где x – количество произведенного товара. Определите максимальный доход (валовой).

Указание: Валовой доход B(x) выражается формулой B(x) = 240x - C(x).

- **В**₁ **8.** Покажите, что:
 - a) $\arccos \frac{1-x^2}{1+x^2} = \begin{cases} 2 \arctan x \in [0, +\infty), \\ -2 \arctan x \in (-\infty, 0]; \end{cases}$ б) $\arctan \frac{1+x}{1-x} = \arctan x + \frac{\pi}{4}, x \in (-\infty, 1);$
 - B) $2\arctan x \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = 0$, $x \in (-1, 1)$.
 - 9. Найдите промежутки монотонности, локальные и глобальные экстремумы функции:
 - a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f(x) = |x+1|;
- 6) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x}{1 + x^2}$
- B) $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 \ln x$.
- **10.** Работайте в парах! Найдите значения $m \in \mathbb{R}$, при которых функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = mx - \ln(1+x^2)$, убывает на \mathbb{R} .
 - 11. Определите промежутки выпуклости функции:
 - a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^3 + 3x^2$;
- 6) $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin x$
- B) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$;
- Γ) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^2 + |x|$.
- 12. Найдите точки перегиба функции:
 - a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2$;
- б) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \begin{cases} x^3, \ \text{если } x \neq 0, \\ 1. \ \text{если } x = 0. \end{cases}$
- B) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^4 4x$;
- $f: (-\infty, -1) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sqrt{x^2 1}$
- д) $f: (0, +\infty) \to \mathbb{R}, \ f(x) = |\ln x 1|;$ e) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = |x^2 4x|$.
- **13.** Постройте график функции $f: D \to \mathbb{R}$:
 - a) $f(x) = \frac{x}{x+1}$;
- 6) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$;
- B) $f(x) = \frac{x^2}{3x-2}$;

- r) $f(x) = \frac{x}{x-2}$; a) $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$; e) $f(x) = \ln(x^2-4)$.
- **14.** Покажите, что для любых $m \in \mathbb{R}$, функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 + mx)e^{-x}$, имеет один локальный максимум и один локальный минимум.
- **15.** Пусть функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ удовлетворяет условиям:
 - а) f дифференцируема на \mathbb{R} ;
- б) существует $\lim_{x \to a} f(x) = a \in \mathbb{R}^*$;
- в) существует $\lim f'(x)$.

Покажите, что $\lim f'(x) = 0$.


Указание. Примените правило Лопиталя для вычисления предела $\lim_{x\to +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x}$.

16. *Исследуйте!* Дана функция $f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{mx^2 - 1}{x - 1}, \ m \in \mathbb{R}.$

Найдлите значения m, при которых:

- а) функция строго возрастает на каждом из интервалов $(-\infty, 1)$; $(1, +\infty)$;
- б) функция строго убывает на каждом из интервалов, указанных в пункте а);
- в) функция имеет точки экстремума;
- г) график функции не имеет асимптот.
- С. 17. Работайте в парах! Затраты (в леях) на производство товара выражены функцией C(x) = 1 + 76x, а спрос – функцией $p(x) = -x^2 + 42x - 80$, $2 \le x \le 40$. Определите количество товара х, при котором будет максимальный доход, а также сумму этого дохода.

- **18.** (БАК, 2016) Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = a^2x^4 + 2(a^2 1)x^2 + 3$. Найдите действительные значения параметра a, при которых функция f имеет единственный локальный экстремум.
- 19. (БАК, 2008) Для построения здания больницы, фундамент которого имеет форму прямоугольника *MNKL* площадью 400 м², необходим участок земли прямоугольной формы *ABCD* такой, чтобы здание больницы было расположено на расстояниях



36 м и 16 м от границ участка (см. рисунок). Найдите длину и ширину фундамента здания больницы такие, чтобы площадь участка *ABCD* была минимальной.

20. Работайте в группах! Проект Прикладные задачи на максимум и минимум.

<u>Итоговый тест</u>

Время выполнения работы: 45 минут

2

3

(3)

(3)

(3)

6)

(8)

8

Реальный профиль

1. Найдите значение истинности высказывания:

"График функции $f: [0, 1] \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x}{x-2}$, не имеет асимптот". **И** / Л

2. Дана функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 \cdot e^{-x^2}$.

1) Найдите: а) промежутки монотонности;

- б) точки локального экстремума;
- в) локальные экстремумы.

2) составьте таблицу поведения функции f.

- **3.** Найдите на отрезке I = [-1, 2] глобальные экстремумы функции $f: D \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{если } -1 \le x \le 0, \\ 2\ln x, & \text{если } 0 < x \le 2. \end{cases}$
- **4.** Постройте график функции $f: D \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{x+1}.$

5. Зная функцию спроса p(x) = 800 - 0.5x и функцию предложения $p_1(x) = 700 + 2x$ (x – количество продукции), определите величину налога на такую продукцию, чтобы налогообложение доходов было максимальным. Указание. Налогообложение доходов на единицу продукции x выражается

Указание. Налогообложение доходов на единицу продукции x выражается формулой $V(x) = (p(x) - p_1(x))x$.

Схема оценивания теста


Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	36–35	34–31	30–27	26–22	21–17	16–11	10-7	6–4	3–2	1-0

Приложения производной

Роль первой производной в исследовании функции

Пусть $f\colon I o \mathbb{R},\ I \subseteq \mathbb{R},\ -$ функция, дифференцируемая на I.

- 1. Если f'(x) = 0, $\forall x \in I$, то функция f(x) является постоянной на интервале I.
- . Функция f является возрастающей (убывающей) на интервале I тогда и только тогда, когда $f'(x) \ge 0$ ($f'(x) \le 0$), $\forall x \in I$.
 - 3. Если f'(x) > 0, $\forall x \in I$, $x < x_0$, и f'(x) < 0, $\forall x \in I$, $x > x_0$, то x_0 точка локального максимума функции f. Обозначают: $f'(x_0)$ \ .



4. Если f'(x) < 0, $\forall x \in I$, $x < x_0$, и f'(x) > 0, $\forall x \in I$, $x > x_0$, то $x_0 -$ точка локального минимума функции f.

Обозначают: $f(x_0)$

- 5. Точки локального максимума и локального минимума функции называются точками локального экстремума этой функции.
- 6. Решения уравнения f'(x) = 0 являются возможными точками локального экстремума функции f.

Роль второй производной в исследовании функции

Пусть $f: I \to \mathbb{R}, I \subseteq \mathbb{R}, -$ дважды дифференцируемая функция на интервале I.

1. Если $f''(x) \ge 0$, $\forall x \in I$, то функция f выпукла вниз на интервале I.



Если $f''(x) \le 0$, $\forall x \in I$, то функция f выпукла вверх на интервале I.



3. Пусть $f''(x_0) = 0$ и $V(x_0)$ – окрестность точки $x_0 \in I$. Если f''(x) < 0, $\forall x \in V(x_0)$, $x < x_0$, и f'''(x) > 0, $\forall x \in V(x_0)$, $x > x_0$, или наоборот (f''(x) > 0, $\forall x \in V(x_0)$, $x < x_0$, и f'''(x) < 0, $\forall x \in V(x_0)$, $x > x_0$, и f''(x) < 0, $\forall x \in V(x_0)$, $x > x_0$, то точка $x_0 = 0$



очка **перегиба** функции ƒ

4. Решения уравнения f''(x) = 0 являются возможными точками перегиба функции f.

Построение графиков функций

Для построения графиков функций рекомендуется: I. Найти максимальную область

- определения функции.

 I. Определить знак функции и возможные симметрии графика.
- III. Найти пределы на концах промежутков, промежутки непрерывности функции, асимптоты.
- IV. Найти первую производную, исследовать функцию на монотонность и определить ее возможные точки экстремума.
 V. Найти вторую производную,
 - тапти вторую производную, исследовать функцию на выпуклость и определить возможные точки перегиба.

 7. Составить таблицу поведения функции.
- VII. Построить график функции.

Задачи на максимум и минимум

Модуль

Комплексные числа

Цели

- ⇒ использование действительных и комплексных чисел для выполнения вычислений в различных контекстах;
- применение комплексных и действительных чисел, заданных в различных формах, использование соответствующей терминологии в разных контекстах;
- применение операций над комплексными и действительными числами, их общих свойств при решении примеров и задач;
- применение некоторых алгоритмов, характерных для вычислений с комплексными числами, для решения уравнений (второй степени, *биквадратных, *двучленных, *возвратных) на множестве **C**;
- *геометрическое изображение комплексных чисел, их модуля; применение этих представлений при решении задач;
- *вычисление корней 2, 3 и 4 степеней из комплексного числа, заданного в тригонометрической или в алгебраической форме.

§1 Операции над комплексными числами, заданными в алгебраической форме

Известно, что уравнение второй степени $ax^2 + bx + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \ne 0$, имеет действительные решения тогда и только тогда, когда его дискриминант неотрицательный. Если его дискриминант отрицательный (например, дискриминанты уравнений $3x^2 - x + 4 = 0$, $x^2 + 1 = 0$), то уравнение не имеет действительных реше-



ний, так как в \mathbb{R} не существует корней второй степени из отрицательного числа. Чтобы существовали решения для всех уравнений такого вида, в XVI веке математики использовали выражения вида $\sqrt{-a}$, $a \in \mathbb{R}_+^*$. В XVIII веке Л. Эйлер вводит обозначение $\sqrt{-1} = \mathbf{i}$ (i от латинского слова "imaginarius"). Таким образом, множество действительных чисел расширяется до множества чисел вида $a+b\mathbf{i}$, $a,b\in\mathbb{R}$, названных К. Ф. Гауссом¹ в XIX веке *комплексными числами*.

Определение. Комплексным числом называется выражение вида a+bi, где $a, b \in \mathbb{R}$, а i- это символ, обладающий свойством $i^2 = -1$.

¹ Карл Фридрих Гаусс (1777–1855) – немецкий математик, физик и астроном.

Множество комплексных чисел обозначим через С.

Таким образом, $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$. Следовательно, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Если z = a + bi, то говорят, что комплексное число z записано в алгебраической форме (можно использовать и форму z = a + ib). Число a называется действительной частью числа z = a + bi и обозначается Rez, а b -мнимой частью z и обозначается Imz.

Комплексные числа $z_1 = a + bi$ и $z_2 = c + di$ считаются **равными**, если a = c и b = d. Число вида a + 0i отождествляется с действительным числом a. Следовательно, множество действительных чисел является подмножеством множества комплексных чисел. Число вида 0 + bi, $b \neq 0$, называется **чисто мнимым** и обозначается bi. Комплексное число i = 0 + 1i называется **мнимой единицей**, однако она не выражает результат измерения величин. Это число является решением на множестве C уравнения $x^2 + 1 = 0$ (неразрешимого на множестве R).

Задание с решением

Ч Найдем такие действительные числа x, y, что 2+3i+(x+yi)=5+7i. *Решение*:

$$(2+3i+(x+yi)=5+7i \Leftrightarrow (2+x)+(3+y)i=5+7i.$$

Приравнивая действительные и соответственно мнимые части, получаем:

$$\begin{cases} 2+x=5\\ 3+y=7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3,\\ y=4. \end{cases}$$

Определим *операции сложения*, *вычитания и умножения* комплексных чисел следующим образом:

$$(a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i;$$

 $(a+bi)-(c+di) = (a-c)+(b-d)i;$
 $(a+bi)\cdot(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i.$

Сложение (вычитание) выполняется, складывая (вычитая) между собой соответственно действительные и мнимые части этих чисел. Вычитание является обратной к сложению операцией.

Примеры

1.
$$(2+3i)+(-3+7i)=[2+(-3)]+(3+7)i=-1+10i$$
;

2.
$$(2+3i) \cdot (-3+7i) = [2 \cdot (-3) - 3 \cdot 7] + [2 \cdot 7 + 3(-3)]i = -27 + 5i$$
.

Замечание. Операции сложения, вычитания, умножения комплексных чисел выполняются аналогично операциям над многочленами от переменного i, считая $i^2 = -1$.

Определение. Комплексное число $\bar{z} = a + bi = a - bi$ называется сопряженным числу z = a + bi.

Произведение $z \cdot \overline{z}$, $z \in \mathbb{C}$, имеет особое значение, так как оно является неотрицательным действительным числом:

$$z \cdot \overline{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + abi - abi - b^2i^2 = a^2 + b^2.$$

Свойства операций сложения и умножения комплексных чисел (они те же, что и для действительных чисел):

$$1^{\circ} z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$
 – коммутативность сложения;

2°
$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$
 – ассоциативность сложения;

3°
$$0 = 0 + 0 \cdot i$$
 — нейтральный элемент относительно сложения;

$$4^{\circ} - z = -a - bi -$$
число, противоположное числу $z = a + bi;$

5°
$$z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$$
 – коммутативность умножения;

6°
$$z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 -$$
 ассоциативность умножения;

7°
$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$$
 – дистрибутивность умножения относительно сложения;

8°
$$1 = 1 + 0 \cdot i$$
 – нейтральный элемент относительно умножения;

9°
$$\frac{1}{z} = z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}$$
і — число, обратное числу $z = a + b$ і, $z \neq 0$.

Выражение для z^{-1} может быть получено следующим образом:

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i.$$

Деление комплексных чисел может быть определено как операция, обратная к умножению: $z_1: z_2 = z_1 \cdot z_2^{-1}, \ z_2 \neq 0$, однако, чтобы избежать громоздких вычислений, проще поступить следующим образом:

если
$$z_1 = a + bi$$
, $z_2 = c + di$, $z_2 \neq 0$, то $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(\overline{c + di})}{(c + di)(\overline{c + di})} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$.

Примеры

1.
$$\frac{7+3i}{5-i} = \frac{(7+3i)(5+i)}{(5-i)(5+i)} = \frac{35+7i+15i+3i^2}{25+1} = \frac{35-3+22i}{26} = \frac{16}{13} + \frac{11}{13}i.$$

2.
$$(1+i)^{-1} = \frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$$
.

Определение. Модулем комплексного числа z = a + bi называется неотрицательное действительное число $\sqrt{a^2 + b^2}$, обозначенное |a + bi| или |z|. Следовательно, $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Если
$$z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$
, $z_2 = i$, то $|z_1| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$, $|z_2| = |i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$.

Теорема 1. Для любых комплексных чисел z, z_1, z_2 верны свойства:

$$\mathbf{1}^{\circ} \ \overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z}_1 \pm \overline{z}_2; \quad \mathbf{2}^{\circ} \ \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z}_1 \cdot \overline{z}_2; \quad \mathbf{3}^{\circ} \left(\overline{\frac{z_1}{z_2}} \right) = \frac{\overline{z}_1}{\overline{z}_2}, \quad z_2 \neq 0 \quad \text{(значит, и } \overline{z}_2 \neq 0);$$

4°
$$z \cdot \overline{z} \in \mathbb{R}$$
; **5°** $z + \overline{z} \in \mathbb{R}$; **6°** $z = \overline{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$; **7°** $\overline{\overline{z}} = z$.

Задание. Покажите, что при заданных $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ уравнения $z_1 \cdot u = z_2 \ (z_1 \neq 0)$ и $z_1 + t = z_2$ имеют единственные решения.

Замечание. Учитывая, что операции над комплексными числами обладают теми же свойствами, что и соответствущие операции над действительными числами, можно применить известные формулы сокращенного умножения, понятие степени с целым показателем ненулевого комплексного числа z: $z^0 = 1$, $z^k = \underline{z \cdot ... \cdot z}$, $z^{-k} = (z^{-1})^k$, $k \in \mathbb{N}^*$; а также ее свойства: $z^n \cdot z^m = z^{n+m}$, $(z^n)^m = z^{n-m}$, $z \neq 0$, $n, m \in \mathbb{Z}$ Например: $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i^4 \cdot i = 1 \cdot i = i$. Можно также применить формулы $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ нахождения решений уравнений второй степени: $ax^2 + bx + c = 0$, $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$. Заметим, что любое квадратное уравнение имеет решения на множестве С, так как для любого комплексного числа z существует такое комплексное число

Задания с решением

4 1. Вычислим:
$$A = (2+3i)^3 - \frac{7+3i}{5-i}$$
.

u, что $u^2 = z$ (что будет показано ниже).

Решение:

Применив формулу куба суммы и результат из предыдущего примера, получим:

$$A = 8 + 3 \cdot 4 \cdot 3i + 3 \cdot 2 \cdot (3i)^{2} + (3i)^{3} - \left(\frac{16}{13} + \frac{11}{13}i\right) = 8 + 36i + 54i^{2} + 27i^{3} - \frac{16}{13} - \frac{11}{13}i = 8 - 54 - \frac{16}{13} + \left(36 - 27 - \frac{11}{13}\right)i = -\frac{614}{13} + \frac{106}{13}i.$$

🔖 2. Вычислим:

a)
$$i^{73}$$
; 6) i^{24k+3} , $k \in \mathbb{N}$; B) $(7-3i)^{-1}$

B)
$$(7-3i)^{-1}$$

Решение:

a)
$$i^{73} = i^{72+1} = (i^4)^{18} \cdot i = 1^{18} \cdot i = i$$
.

6)
$$i^{24k+3} = (i^4)^{6k} \cdot i^3 = 1^{6k} \cdot (-i) = -i$$

B)
$$(7-3i)^{-1} = \frac{1}{7-3i} = \frac{7+3i}{(7-3i)(7+3i)} = \frac{7+3i}{49+9} = \frac{7}{58} + \frac{3}{58}i$$
.

5 3. Решим на множестве **C** уравнение:

a)
$$(2+i)z - (3+6i)z = 5+2i$$
;

$$5) \ z^2 - 2z + 3 = 0.$$

Решение:

а) Используя свойства операций над комплексными числами, получаем:

$$(2+i-3-6i)z = 5+2i \Leftrightarrow (-1-5i)z = 5+2i \Leftrightarrow z = \frac{5+2i}{-1-5i} = -\frac{15}{26} + \frac{23}{26}i.$$
Ombern: $S = \left\{ -\frac{15}{26} + \frac{23}{26}i \right\}.$

6)
$$\Delta = 4 - 12 = -8 = (i\sqrt{8})^2 = (2\sqrt{2}i)^2$$
.

Таким образом, решениями являются: $z_1 = \frac{2 + 2\sqrt{2}i}{2} = 1 + i\sqrt{2}$, $z_2 = \frac{2 - 2\sqrt{2}i}{2} = 1 - i\sqrt{2}$.

Omsem: $S = \{1 - i\sqrt{2}, 1 + i\sqrt{2}\}.$

Упражнения и задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

A 1. Вычислите:

a)
$$(2+3i)+(1-i)$$
;

6)
$$4+3i-(2+5i)$$
;

B)
$$(\sqrt{3} + i) + (\sqrt{2} - i\sqrt{3});$$

$$\Gamma$$
) $(1+3i)(2-4i)$;

д)
$$(\sqrt{3} + i)(\sqrt{2} - i\sqrt{3});$$

e)
$$(2+i):(3+2i);$$

ж)
$$(3+i)^{-1}$$
;

3)
$$\frac{2+4i}{1+i} + 22-23i$$
; $\qquad \qquad \text{u) } (1+i)(1+i)^2$.

$$\Gamma$$
) i^{131} . π) i^{2020}

2. 1) Вычислите: a) i⁵;

ствительным числом?

- б) i⁶;
- в) i¹⁶.
- 2) При каких натуральных значениях показателя степени число i^k является дей-

В 3. Найдите все действительные числа x и y такие, что:

a)
$$(1+3i)x + (2+5i)y = 7+i$$
;

6)
$$(\overline{2+5i})x + (1+i)y = i$$
;

B)
$$i \cdot x + i((i+1)x - (3+i)y) = 3 + 2i$$
;

r)
$$7i \cdot x + (\sqrt{3} - i)(\overline{x - iy}) = 4 + 3i$$
.

4. 1) Решения каких уравнений являются действительными числами?

a)
$$2z^2 + 3z + 3 = 0$$

6)
$$\bar{z}^2 + \bar{z} + 1 = 0$$

B)
$$z^2 - z + 4 = 0$$
;

$$\Gamma$$
) $\sqrt{2}z^2 + z + 1 = -2z$;

e)
$$\frac{2-z}{3+z} = \frac{4z+1}{5-z}$$
;

$$y = 2 = \frac{3-z}{z+1}.$$

5. Вычислите: a)
$$(2+i)^3 - (2-i)^3$$
;

6)
$$(3-i)^3 + (3+i)^3$$
.

С 6. Решите на множестве С уравнение:

a)
$$(1+i)z = 3+i$$
;

6)
$$3z \cdot i + (5+2i)z = 3z + 2 - i$$
;

B)
$$\frac{z}{2+i} + 7 + i = z(1+i);$$

$$\Gamma^*$$
) (БАК, 2018) $3 + i\bar{z} = 2z$.

7. Решите систему уравнений $(z_1, z_2 \in \mathbb{C})$:

a)
$$\begin{cases} 2z_1 - (3+3i)z_2 = 3-i, \\ (-1+i)z_1 + 3iz_2 = i; \end{cases}$$

6)
$$\begin{cases} -2z_1 + (2+i)z_2 = i, \\ (4+2i)z_1 - 5z_2 = -1 - 2i. \end{cases}$$

8. ? *Работайте в парах!* Найдите комплексные числа z, удовлетворяющие условиям:

a) Re
$$z = -1$$
, $|z| = \sqrt{2}$

a)
$$\operatorname{Re} z = -1$$
, $|z| = \sqrt{2}$; 6) $\operatorname{Re} z - \operatorname{Im} z = 2$, $|\overline{z}| = 1$;

B)
$$\text{Im } z = 3, |z + i| = 2.$$

Реальный профиль

A₁ **1.** Вычислите:

a)
$$(-2+31)+($$

a)
$$(-2+3i)+(1-i);$$
 6) $4+3i-(-2+5i);$

B)
$$(\sqrt{3}-i)+(\sqrt{2}-i\sqrt{3});$$

$$\Gamma$$
) $(1-3i)(2-4i);$

д)
$$(\sqrt{3}-i)(\sqrt{2}-i\sqrt{3});$$

e)
$$(2+i):(3+4i);$$

ж)
$$(3-i)^{-1}$$
;

3)
$$\frac{2+4i}{1-i}+22-23i$$
;

и)
$$(1-i)(1+i)^2$$
.

- a) i^3 ; б) i^4 ; в) i^{24} ; г) i^{131} ; д) i^{2010} **2.** 1) Вычислите:
 - 2) При каких целых значениях показателя степени число i^k является действительным числом?
- **3.** Найдите все действительные числа x и y такие, что:

a)
$$(1+3i)x + (2-5i)y = 7+i$$
;

6)
$$(\overline{2+5i})x - (1+i)y = i$$
;

B)
$$i \cdot x + i((i+1)x - (3-i)y) = 3 + 2i;$$
 Γ) $7i \cdot x + (\sqrt{3} - i)(\overline{x - iy}) = 4 - 3i.$

$$(7i \cdot x + (\sqrt{3} - i)(\overline{x - iy}) = 4 - 3i)$$

4. Решите на множестве С уравнение:

a)
$$2z^2 - 3z + 3 = 0$$
;

6)
$$\bar{z}^2 - \bar{z} - 1 = 0$$

B)
$$z^2 + z + 4 = 0$$

$$\Gamma$$
) $\sqrt{2}z^2 - z + 1 = -2z$;

д)
$$2z^2 + z - 2 = 3z - 7$$

6)
$$\bar{z}^2 - \bar{z} - 1 = 0;$$
 B) $z^2 + z + 4 = 0;$ д) $2z^2 + z - 2 = 3z - 7;$ e) $\frac{2-z}{3+z} = \frac{-4z+1}{5-z};$

ж)
$$(3-z)(-4+z) = (2+z)z+7;$$
 3) $z^2-2z+2=0;$ и) $z+2=\frac{-3-z}{z+1}.$

3)
$$z^2 - 2z + 2 = 0$$

$$u$$
) $z+2=\frac{-3-z}{z+1}$

- **5.** Вычислите: a) $(2+i)^3 + (2-i)^3$; б) $(3-i)^3 (3+i)^3$.
- 6. Решите на множестве С уравнение:

a)
$$(1-i)z = 3+i$$
;

6)
$$3z \cdot i + (5-2i)z = 3z + 2 - i$$
:

B)
$$\frac{z}{2+i} - 7 + i = z(1+i);$$

$$\Gamma^*$$
) $|z| - iz = 1 - 2i$.

В₁ 7. Решите систему уравнений $(z_1, z_2 \in \mathbb{C})$:

a)
$$\begin{cases} 2z_1 - (3+3i)z_2 = 3-i, \\ (1-i)z_1 - 3iz_2 = -i; \end{cases}$$

6)
$$\begin{cases} 2z_1 - (2+i)z_2 = -i, \\ (4+2i)z_1 - 5z_2 = -1 - 2i. \end{cases}$$

8. $\begin{picture}(40,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0){\line(1,$

a) Re
$$z = 1$$
, $|z| = \sqrt{2}$;

6) Re
$$z + \text{Im } z = 2, |\bar{z}| = 1;$$

B)
$$\text{Im } z = 3, |z - i| = 2.$$

9. Вычислите:

a)
$$(3+2i)(-2+3i)^{-1} \cdot (-i) + 1;$$

6)
$$(\overline{2+i})(5+i)^{-1} - (7+5i)^2 \cdot (3-i)^{-1}$$
.

- 10. Вычислите:
- a) (z-1-i)(z-1+i)(z+1+i)(z+1-i);

6)
$$(z-i)(z+i)(z-1)(z+1)$$
;

в)
$$(b\varepsilon^2 + a\varepsilon)(a\varepsilon^2 + b\varepsilon)$$
, если $\varepsilon = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$.

11. Покажите, что следующие числа являются действительными:

a)
$$\frac{1}{i}(z-\bar{z});$$

a)
$$\frac{1}{\mathrm{i}}(z-\overline{z});$$
 б) $\frac{z-1}{\mathrm{i}(z+1)},$ если $z\cdot\overline{z}=1.$

 C_1 12. Докажите равенство:

a)
$$(1+i)^{8n} = 2^{4n}, n \in \mathbb{Z};$$

6)
$$(1+i)^{4n} = (-1)^n \cdot 2^{2n}, n \in \mathbb{Z}$$


- **13.** Найдите комплексное число z, удовлетворяющее условиям |z+i|=|z+1|=|z+iz|.
- 14. Исследуйте! а) Может ли быть действительным числом частное двух различных комплексных чисел?
 - б) Может ли быть действительным числом частное двух чисел, из которых одно число мнимое комплексное число, а второе действительное число?
 - в) Пусть $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{\alpha (\alpha + 1)i}$. Найдите все числа $\alpha \in \mathbb{R}$ такие, что $z \in \mathbb{R}$.
- **15.** Докажите, что $\operatorname{Im} z = \frac{z \overline{z}}{2i}$, $\operatorname{Re} z = \frac{z + \overline{z}}{2}$, $\forall z \in \mathbb{C}$.

Геометрическое изображение комплексных чисел. Тригонометрическая форма комплексных чисел

Геометрическое изображение комплексных чисел, предложенное К. Гауссом в начале XIX века, дало возможность их применения в различных областях.

В заданной ортогональной системе координат каждому числу z = x + iyставится в соответствие точка M(x, y) и обратно (точка M называется *образом* z) (рис. 6.1). Таким образом, устанавливается биективное соответствие между множеством комплексных чисел С и множеством точек плоскости, что позволяет

отождествить комплексное число z = x + iy с точкой M(x, y). В силу этого иногда будем говорить "точка z = x + iy" вместо "комплексное число z", а соответствующую плоскость назовем комплексной плоскостью. Кроме того, заметим, что множество действительных чисел изображается точками оси Ox, которую назовем *действительной* осью, а множество чисто мнимых чисел – точками оси Оу, которую назовем мнимой осью.



Пример


Числа $z_1 = 2 + 2i$, $z_2 = 3$, $z_3 = 3i$ изображаются соответственно точками $M_1(2, 2)$, $M_2(3,0)$ и $M_3(0,3)$ (рис. 6.1).

Комплексные числа можно также изображать с помощью векторов. Комплексное число z = x + iy отождествляется с вектором \overline{OM} , где O(0,0), а M(x,y) – образ числа z (рис. 6.1). Очевидно, что $|z| = |\overrightarrow{OM}|$. Это дает возможность изображать сумму чисел $t_1 = a + bi$, $t_2 = c + di$ (соответствующих точкам $A_1(a, b)$, $A_2(c, d)$)

как сумму векторов \overrightarrow{OA}_1 , \overrightarrow{OA}_2 , так как координаты точки A_3 , где $\overrightarrow{OA_3} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2}$, равны a+c и b+d(рис. 6.2).

Разность $t_1 - t_2$ отождествляется с вектором $\overrightarrow{OA_4}$, _____ где $\overrightarrow{OA_1} = \overrightarrow{A_2}\overrightarrow{A_1} = \overrightarrow{OA_1} - \overrightarrow{OA_2}$ (рис. 6.2).

Следовательно, $|t_1 - t_2| = A_2 A_1$, а это означает, что расстояние между точками A_1 и A_2 равно модулю разности $t_1 - t_2$.



Свойства модуля комплексного числа приводятся в следующей теореме:

Теорема 2. Для любых $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ верны свойства:

1°
$$|z| = |\bar{z}| = |-z|$$
; **2°** $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$; **3°** $||z_1| - |z_2| \le |z_1 + z_2|$;

2°
$$|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$$
;

$$3^{\circ} \|z_1| - |z_2| \le |z_1 + z_2|;$$

$$\mathbf{4}^{\circ} \mid z_{1} \cdot z_{2} \mid = \mid z_{1} \mid \cdot \mid z_{2} \mid;$$

$$\mathbf{5}^{\circ} \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad z_2 \neq 0$$

4°
$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$
; **5°** $\left| \frac{z_1}{z} \right| = \frac{|z_1|}{|z_1|}$, $z_2 \neq 0$; **6°** $||z_1| - |z_2| \leq |z_1 - z_2|$.

Доказательство

Свойство 1° получается из определений сопряженного числа и модуля. Свойства 2°, 3°, 6° следуют из соотношения между сторонами треугольника, в качестве которых можно взять $|z_1|$, $|z_2|$, $|z_1+z_2|$, или, если векторы коллинеарны, из правил сложения таких векторов. Свойства 4°, 5° докажем позже в этом параграфе.

В отличие от сложения и вычитания комплексных чисел, операции умножения и деления не могут быть так просто истолкованы в виде действий над соответствующими векторами. Ниже изложим представление комплексных чисел в тригонометрической форме, которая упрощает выполнение умножения, деления, возведения в степень комплексных чисел.

Напомним, что модулем комплексного числа z = x + iy является

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2} = r.$$

Аргументом комплексного числа $z = x + \mathrm{i} y, z \neq 0$, называется величина угла, образованного вектором \overrightarrow{OM} , где O(0,0), а M(x,y) – образ числа z, с положительной полуосью Ox. Комплексному числу $z, z \neq 0$, соответствует бесконечное множество аргументов, которые отличаются между собой величиной $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Отметим, что аргумент числа 0 не определен. Существует единственный аргумент φ заданного числа $z = x + \mathrm{i} y$, удовлетворяющий условию $-\pi < \varphi \leq \pi$. Он называется главным аргументом и обозначается α дг. Произвольный аргумент числа α обозначается α дг. Агд α и, следовательно, можно записать: α дг. Агд α = α дг. α дг. α

Замечание. В некоторых учебниках обозначают $\operatorname{Arg} z = \{ \arg z + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z} \}$, а условие $\arg z \in (-\pi, \pi]$ заменяется условием $\arg z \in [0, 2\pi)$.

Пример

Модуль числа $z_1=2+2\mathrm{i}$ равен $|z_1|=|OM_1|=\sqrt{4+4}=2\sqrt{2},\ \arg z_1=\frac{\pi}{4},\ \mathrm{a}$ значениями $\mathrm{Arg}\,z_1$ являются $-\frac{7\pi}{4},\,\frac{9\pi}{4}$ или любое число вида $\frac{\pi}{4}+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z}.$

Очевидно, что для числа z = a + bi, $b \ne 0$, имеем $\arg \overline{z} = -\arg z$. Главный аргумент числа z = a + bi, $z \ne 0$, можно получить с помощью функции arccos:

$$\arg z = \begin{cases} \arccos \frac{a}{r}, & \text{если } b \ge 0 \\ -\arccos \frac{a}{r}, & \text{если } b < 0, r = \sqrt{a^2 + b^2}. \end{cases}$$
 (1)

Примеры

1.
$$arg(2-2i) = -arccos \frac{2}{2\sqrt{2}} = -arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\pi}{4}$$
;

2.
$$arg(-2+3i) = arccos \frac{-2}{\sqrt{13}}$$
.

Пусть $z = x + \mathrm{i} y$, $z \neq 0$, некоторое комплексное число, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ — его модуль, φ — некоторый его аргумент. Используя определения функций sin и сов произвольного аргумента, получим соотношения: $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$. Тогда $z = r(\cos \varphi + \mathrm{i} \sin \varphi)$.

Запись $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ называется **тригонометрической формой** числа z.

Так как аргумент комплексного числа определяется неоднозначно, для комплексных чисел, заданных в тригонометрической форме, имеем:

$$r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1) = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = r_2, \\ \varphi_1 = \varphi_2 + 2\pi k, \ k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$
 (2)

Задание с решением

🦴 Запишем в тригонометрической форме числа:

a)
$$z_1 = 1 + i;$$
 6) $z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2};$ B) $z_3 = -1;$ Γ) $z_4 = 2 - 3i.$

Решение:

а) Вычислим модуль и один из аргументов z_1 :

$$|z_1| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$
, a $\arg z_1 = \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$.

Таким образом, верно равенство $1+i=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$, правая часть которого и есть тригонометрическая форма числа z_1 .

б) Аналогично,
$$|z_2| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$
, а согласно (1) получим $\arg z_2 = \pi + \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = \frac{2\pi}{3}$.

Следовательно, $-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$.

в) Для
$$z_3$$
 получим: $|z_3| = 1$, $\arg z_3 = \arccos(-1) = \pi$, значит, $-1 = \cos \pi + i \sin \pi$.

г) Для
$$z_4 = 2 - 3i$$
 имеем: $|z_4| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$, $\arg z_4 = -\arccos \frac{2}{\sqrt{13}}$.

Итак,
$$2-3i = \sqrt{13} \left[\cos \left(-\arccos \frac{2}{\sqrt{13}} \right) + i \sin \left(-\arccos \frac{2}{\sqrt{13}} \right) \right].$$

Замечание. Тригонометрическими формами рассмотренных чисел z_1, z_2, z_3 (с другими аргументами) также являются:

$$z_{1} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{9\pi}{4} + i \sin \frac{9\pi}{4} \right), z_{2} = \cos \left(-\frac{4\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{4\pi}{3} \right), z_{3} = \cos(-\pi) + i \sin(-\pi),$$

но при использовании тригонометрической формы, как правило, указывается главный аргумент.

В теореме 3 приводятся формулы для вычисления произведения, частного, степени с целым показателем комплексных чисел, заданных в тригонометрической форме.

Теорема 3. Если $z_1, z_2, z \in \mathbb{C}^*$, $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$, $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, то:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2));$$
 (3)

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)); \tag{4}$$

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i\sin n\varphi), n \in \mathbb{Z}$$
 (формула Муавра)¹. (5)

Доказательство

Для доказательства формулы (3) имеем:

 $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + i\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + i\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + i^2\sin\varphi_1\sin\varphi_2) =$ $= r_1 \cdot r_2[\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1\cos\varphi_2)] =$ $= r_1 \cdot r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$



Абрахам де Муавр

Аналогично получается формула (4) (для частного чисел).

Формулу (5) докажем сначала для $n \in \mathbb{N}$ методом математической индукции. Для n = -k, $k \in \mathbb{N}^*$, формула (5) проверяется следующим образом:

$$z^{n} = z^{-k} = \frac{1}{z^{k}} = \frac{1(\cos 0 + i\sin 0)}{r^{k}(\cos k\varphi + i\sin k\varphi)} = r^{-k}(\cos(0 - k\varphi) + i\sin(0 - k\varphi)) =$$
$$= r^{-k}(\cos(-k\varphi) + i\sin(-k\varphi)) = r^{n}(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

Замечания. 1. Из равенств (3), (4) следуют соответственно свойства **4°** и **5°** модуля произведения и частного двух комплексных чисел, приведенные в теореме 2.

2. Из соотношений (3)–(5) следует соответственно: аргумент произведения равен сумме аргументов множителей; аргумент частного равен разности между аргументом делимого и аргументом делителя; аргумент степени z^n равен произведению показателя степени n на аргумент основания z. Подчеркнем, что равенство здесь понимается с точностью до слагаемого, кратного 2π .

Задание с решением

Вычислим
$$A = \frac{2(1+i)(1-i\sqrt{3})}{(-\sqrt{3}+i)^{30}}$$
.

Решение:

Для выполнения умножения и деления удобно преобразовать все числа в тригонометрическую форму:

$$1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right), \quad 1-i\sqrt{3} = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right),$$
$$-\sqrt{3} + i = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right).$$

 $^{^{1}}$ Абрахам де Муавр (1667–1754) – английский математик французского происхождения.

Используя формулы (3) – (5), получаем:

$$A = \frac{4\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)\left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right]}{\left[2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)\right]^{30}} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]} = \frac{4\sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]}{2^{30}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6} \cdot 30\right)\right]}$$

$$= \frac{2^{\frac{-55}{2}} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{12} \right) \right]}{\cos 25\pi + i \sin 25\pi} = -2^{\frac{-55}{2}} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{12} \right) \right] = 2^{\frac{-55}{2}} \left(\cos \frac{1 \, 1\pi}{12} + i \sin \frac{1 \, 1\pi}{12} \right)$$

Известно, что корень n-й степени из действительного числа a есть такое число b (если оно существует), что $b^n = a$. Это понятие обобщается для комплексных чисел.

Определение. Комплексное число u называется **корнем** n-ой степени, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \ge 2$, из комплексного числа z, если $u^n = z$.

Примеры

Корнями третьей степени из числа 1 являются 1, $-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$, так как $1^3 = \left(-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^3 = 1$, а корнями второй степени из 1 являются ± 1 .

Если комплексное число z задано в тригонометрической форме, то с помощью следующей теоремы относительно легко можно найти все корни n-й степени из z.

Замечание. Если n пробегает все значения из $\{k, k+1, ..., m\}, k, m \in \mathbb{Z}, k < m,$ то обозначим $n = \overline{k, m}$.

Теорема 4. Существует n различных корней n-й степени, $n \in \mathbb{N}$, $n \ge 2$, из произвольного ненулевого комплексного числа z. Именно, если $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то множество всех корней n-й степени из z равно:

$$\left\{ \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) \middle| k = \overline{0, n - 1} \right\}.$$
 (6)

Доказательство

Пусть $u = \rho(\cos\psi + i\sin\psi)$ – некоторый корень n-й степени из z, причем ρ и ψ нужно найти.

Согласно формуле Муавра имеем $\rho^n(\cos n\psi + i\sin n\psi) = r(\cos \varphi + i\sin \varphi)$, а из (2) получаем $\rho^n = r$ и $n\psi = \varphi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Из первого соотношения имеем $\rho = \sqrt[n]{r}$ (напомним, что $r \in \mathbb{R}_+^*$, поэтому $\sqrt[n]{r}$ – единственное положительное значение корня n-й степени из r), а из второго полу-

чаем
$$\psi = \frac{\varphi + 2\pi k}{n} = \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n}, k \in \mathbb{Z}.$$

Для $k = \overline{0, n-1}$ получаем n различных значений для u:

$$u_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) \right],$$

так как эти числа изображаются на комплексной плоскости вершинами правильного n-угольника (если $n \ge 3$), вписанного в окружность радиуса $\sqrt[n]{|z|}$ с центром в начале координат (проверьте!). Для других целых значений k имеем $k = n \cdot q + t$, $0 \le t \le n - 1$, и, ввиду периодичности тригонометрических функций, получаем:

$$u_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\varphi}{n} + 2\pi q + 2\pi \frac{t}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + 2\pi q + 2\pi \frac{t}{n} \right) \right] = u_t, \quad t = \overline{0, n-1}.$$

Следовательно, каждое u_k , $k \in \mathbb{Z}$, равно некоторому u_t , где $0 \le t \le n-1$. Таким образом, получаем в точности n различных корней n-й степени из числа z, $z \ne 0$.

Замечания. 1. Аргументы чисел в (6) не обязательно являются их главными аргументами.

2. В дальнейшем будем вычислять лишь корни второй, третьей и четвертой степени.

Задания с решением

🦫 1. Используя теорему 4, вычислим все корни второй степени из числа -4.

Решение:

Запишем число –4 в тригонометрической форме: $-4 = 4 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi)$. Из (6) получаем $u_0 = 2 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) = 2i$, $u_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi + 2\pi}{2} + i \sin \frac{\pi + 2\pi}{2}\right) = -2i$.

Итак, корнями второй степени из числа -4 являются только числа $\pm 2i$.

4. Вычислим и изобразим на комплексной плоскости корни 3-й степени из числа 2i.

Решение:

Так как
$$2\mathbf{i} = 2\left(\cos\frac{\pi}{2} + \mathbf{i}\sin\frac{\pi}{2}\right)$$
, из (6) получаем:
$$u_0 = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{\pi}{6} + \mathbf{i}\sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt[3]{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathbf{i}\right),$$

$$u_1 = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi}{3} + \mathbf{i}\sin\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi}{3}\right) = \sqrt[3]{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\mathbf{i}\right),$$

$$u_2 = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{\frac{\pi}{2} + 4\pi}{3} + \mathbf{i}\sin\frac{\frac{\pi}{2} + 4\pi}{3}\right) = -\sqrt[3]{2} \cdot \mathbf{i}.$$

Эти числа геометрически изображаются вершинами правильного треугольника (рис. 6.3, а)).

🔖 3. Найдем корни четвертой степени из числа 1.


Решение:


Для корней *п*-й степени из числа 1 имеем:

$$\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k = \overline{0, n-1}.$$

На рисунке 6.3 б) изображены корни четвертой степени из числа 1: $\{\pm 1, \pm i\}$.

Корни второй степени α_1 , α_2 из ненулевого комплексного числа a+bi (это противоположные числа) могут быть вычислены без использования его тригонометрической формы:





1) для
$$b \neq 0$$
, $\alpha_{1,2} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} + i \operatorname{sgn} b \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}} \right)$, Рис. 6.3

2) для
$$b=0$$
, $\alpha_{1,\,2}=\begin{cases} \pm\,\sqrt{a}\,,\,\,\mathrm{есл}\,u\,\,a\geq0,\\ \pm\,\mathrm{i}\sqrt{|\,a\,|},\,\,\,\mathrm{есл}\,u\,\,a<0, \end{cases}$

где
$$\operatorname{sgn} b = \begin{cases} 1, & \text{если } b > 0, \\ 0, & \text{если } b = 0, \\ -1, & \text{если } b < 0. \end{cases}$$

Задания с решением

🦴 1. Вычислим корни второй степени из числа 40 – 421.

Решение:

Так как b = -42 < 0, получаем:

$$\alpha_{1,2} = \pm \left(\sqrt{\frac{1}{2} (\sqrt{40^2 + 42^2 + 40})} - i \sqrt{\frac{1}{2} (\sqrt{40^2 + 42^2 - 40})} \right)$$

Итак, $\{-7+3i, 7-3i\}$ есть множество корней второй степени из числа 40-42i.

\$ 2. Решим на множестве **C** уравнение $z^2 - 3z + 3 - i = 0$.

Решение:

Воспользуемся известными формулами нахождения решений уравнения второй степени. Дискриминант равен -3+4i, а корнями второй степени из комплексного числа -3+4i являются 1+2i и -1-2i.

Значит, уравнение имеет решения $z_1 = \frac{3 + (1 + 2i)}{2}$, $z_2 = \frac{3 - (1 + 2i)}{2}$.

Omeem: $S = \{2 + i, 1 - i\}$.

Упражнения и задачи

Реальный профиль

A₁ **1.** а) На комплексной плоскости укажите образы чисел:

-1, i, 1-i, -5i, 3, -3+i, -1-2i, $1-i\sqrt{2}$, $\sqrt{2}-i$.

- б) Образы каких чисел принадлежат оси Ох? Образы каких чисел принадлежат оси Ov?
- в) На каком расстоянии от начала координат находится образ каждого числа из
- 2. Вычислите все корни второй степени из числа:

a) –2i:

6) -5-12i;

B) 48+14i;

a) -21; b) -3-121; c) $2-2\sqrt{3}i$; д) $1-2i\sqrt{6}$;

e) $-1 + 2i\sqrt{6}$

 B_1 3. 1) Решите на множестве **C** уравнение:

a) $z^2 + 4z + 4 - 2i = 0;$ b) $i \cdot z^2 - (4+i)z + 6 + 12i = 0;$ c) $(1+i)z^2 + (2+i)z - 7 - i = 0;$ c) $(2+i)z^2 - (5-i)z + 2 - 2i = 0;$

 π) $(2+i)z^2 - (5-i)z + 2 - 2i = 0;$

e) $z^2 - (48 + 14i) = 0$.

- 2) Может ли иметь действительные решения уравнение второй степени с комплексными (недействительными) коэффициентами?
- **4.** Работайте в парах! Пусть $\alpha + \beta i$ и $-\alpha \beta i$ корни второй степени из числа z. Найдите корни второй степени из числа –z.
- 5. Представьте в тригонометрической форме число:

a) -5:

B) $1 - i\sqrt{3}$:

 Γ) 2-2i:

д) $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$;

e) $-4\left(\cos\frac{\pi}{5} - i\sin\frac{\pi}{5}\right)$;

ж) 3 + 4i:

3) $\sin \varphi - i \cos \varphi$;

 $\mathrm{H})\left(\frac{1}{\mathrm{i}-1}\right)^{\!100}\!.$

С₁ **6.** Вычислите:

a)
$$\frac{\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)\left(\cos\frac{\pi}{24} + i\sin\frac{\pi}{24}\right)}{\cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}}; \qquad \text{ 6) } (1 + i\sqrt{3})^3 \cdot \overline{(1 + i)^7}; \qquad \text{ B) } \left(\frac{\sqrt{3} - i}{1 + i}\right)^{20}.$$

- 7. Вычислите корни:
 - а) третьей степени из числа і;
 - б) третьей степени из числа -27;
 - в) четвертой степени из числа $2-2i\sqrt{3}$;
 - Γ) четвертой степени из числа -1.
- 8. Найдите комплексные числа z, удовлетворяющие условиям:

a) $\text{Im } z \ge 1, |z| \le 1$;

6) Re(iz) = 1, |z+i| = 2.

9. (БАК, 2019) Найдите действительные значения p, q, при которых 2+i является решением уравнения $x^2 + px + q = 0$.

§3 Приложения комплексных чисел

3.1. Решение уравнений вида $mz^k + p = 0$, $m \in \mathbb{C}^*$, $p \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{N}^*$

Определение. Уравнения вида $mz^k + p = 0$, где $m \in \mathbb{C}^*$, $p \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{N}^*$, называются двучленными уравнениями.

Двучленное уравнение $mz^k+p=0$ равносильно уравнению $z^k=-\frac{p}{m}$, и потому для его решения надо лишь найти все значения корня степени $k,\ k\geq 2,\$ из числа $-\frac{p}{m}.$

Задание с решением

७ Решим на множестве **C** уравнение $2z^4 = 1 + i\sqrt{3}$.

Решение

$$2z^4 = 1 + i\sqrt{3} \Leftrightarrow z^4 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$
. Для вычисления корней четвертой степени запишем число $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ в тригонометрической форме: $\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$.

Применив (6) из § 2, получим:

$$z_0 = \cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}; \quad z_1 = \cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12};$$
$$z_2 = \cos\frac{13\pi}{12} + i\sin\frac{13\pi}{12}; \quad z_3 = \cos\frac{19\pi}{12} + i\sin\frac{19\pi}{12}.$$

Ответ:

$$S = \left\{ \cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}, \cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}, \cos\frac{13\pi}{12} + i\sin\frac{13\pi}{12}, \cos\frac{19\pi}{12} + i\sin\frac{19\pi}{12} \right\}.$$

3.2. Решение уравнений вида $mz^4 + pz^2 + q = 0$, $m \in \mathbb{C}^*$, $p, q \in \mathbb{C}$

Определение. Уравнения вида $mz^4 + pz^2 + q = 0$, $m \in \mathbb{C}^*$, $p, q \in \mathbb{C}$, называются биквадратными уравнениями.

Подстановкой $z^2 = u$ биквадратное уравнение приводится к системе $\begin{cases} mu^2 + pu + q = 0, \\ z^2 = u. \end{cases}$ Задание с решением

Решим на множестве **C** уравнение $z^4 - 3z^2 + 3 - i = 0$.

Решение

Обозначив $z^2 = u$, получим уравнение $u^2 - 3u + 3 - i = 0$. Применим формулы из §2 и получим $u_1 = 2 + i$, $u_2 = 1 - i$. Для нахождения z решим два уравнения: $z^2 = 2 + i$ и $z^2 = 1 - i$. Решениями первого уравнения являются:

$$z_{1,2} = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{4+1}+2}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{4+1}-2}{2}}\right) = \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{5}+2}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{5}-2}{2}}\right).$$

Решения второго уравнения найдем, применив формулу (6) из §2, где

$$1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right).$$

Получим
$$z_3 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{8} \right) \right), \quad z_4 = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{8} + i \sin \frac{7\pi}{8} \right).$$

Ответ:

$$S = \left\{ \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{5} + 2}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{5} - 2}{2}} \right); \sqrt[4]{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{8} \right) \right); \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{8} + i \sin \frac{7\pi}{8} \right) \right\}.$$

3.3. Решение возвратных уравнений

Рассмотрим уравнения вида $ax^3 + bx^2 + bx + a = 0$, $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$, $a \ne 0$, являющиеся возвратными уравнениями степени 3, 4 соответственно.

Пример

Уравнение $x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1 = 0$ является возвратным уравнением степени 4.

При решении таких уравнений можно использовать следующие свойства:

- **1°** Решением уравнения $ax^3 + bx^2 + bx + a = 0$ является число $x_0 = -1$.
- **2°** Подстановкой $y = x + \frac{1}{x}$ уравнение $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$ сводится к системе, состоящей из одного уравнения второй степени относительно y и совокупности двух уравнений второй степени относительно x.

Задание с решением

७ Решим на множестве **С** уравнение $x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1 = 0$.

Решение:

Так как x = 0 не является решением, то разделив на x^2 , получим равносильное уравнение: $x^2 - 3x - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) + 4 = 0$.

Если обозначим $y=x+\frac{1}{x}$, то $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=y^2-2$ и получим уравнение $y^2-3y+2=0$, имеющее решения $y_1=1,\ y_2=2$. Возвращаясь к неизвест-

ному x, получим: $\begin{vmatrix} x+\frac{1}{x}=1, \\ x+\frac{1}{x}=2. \end{vmatrix}$ Таким образом, получим следующую совокупность

уравнений II степени: $\begin{bmatrix} x^2 - x + 1 = 0, \\ x^2 - 2x + 1 = 0. \end{bmatrix}$ Итак, решениями исходного уравнения

являются
$$x_1 = 1$$
, $x_2 = 1$, $x_3 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$, $x_4 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}$.

Ombem:
$$S = \left\{ 1, \ \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}, \ \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \right\}.$$

3.4. Приложения комплексных чисел в геометрии

Комплексные числа находят применение в тех областях, в которых рассматриваются векторные величины. В этом случае операции над векторами, выполненные в геометрической форме, заменяются соответствующими операциями над комплексными числами, заданными в алгебраической или тригонометрической формах, которые удобнее выполнять.

Для удобства в дальнейшем обозначим числа, соответствующие точкам M, M_0 , M_1 , M_2 , ..., через $z=x+\mathrm{i}y$, $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$, $z_1=x_1+\mathrm{i}y_1$, $z_2=x_2+\mathrm{i}y_2$, ...

а) Уравнением окружности с центром в точке M_0 радиуса r является $|z-z_0|=r$, или $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$.

Действительно, $M\in \mathscr{C}(M_0,r)$ в том и только в том случае, когда $|\overrightarrow{MM_0}|=r$, то есть $|z-z_0|=r$.

- б) Круг с центром в точке M_0 радиуса r задается неравенством $|z-z_0| \le r$.
- в) Кольцо, заключенное между окружностями $\mathscr{C}(M_0, r_1)$ и $\mathscr{C}(M_0, r_2)$, $r_1 < r_2$, задается неравенством $r_1 < |z z_0| < r_2$ (рис. 6.4).
- г) Величину угла $M_1M_2M_3$ можно найти из формулы $\mathrm{m}(\angle M_1M_2M_3)=\mathrm{arg}\frac{z_3-z_2}{z_1-z_2}+2\pi k$, для некоторого $k\in\mathbb{Z}$.

. Формула получается из свойства $\arg\frac{z_3-z_2}{z_1-z_2}=\arg(z_3-z_2)-\arg(z_1-z_2)+2\pi k,\ k\in\mathbb{Z}$ (рис. 6.5).




Рис. 6.5

0

Задания с решением

5 1. Напишем уравнение окружности радиуса 3 с центром в точке $M_0(1, -2)$. *Решение*:

Точка M_0 является образом числа $z_0=1-2\mathrm{i}$, следовательно, $M\in\mathscr{C}(M_0,3)$ в том и только в том случае, когда $|z-(1-2\mathrm{i})|=3$, где M(x,y), $z=x+\mathrm{i}y$. Используя формулу модуля комплексного числа, получим:

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2} = 3 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9, x, y \in \mathbb{R}.$$

4. Изобразим в прямоугольной системе координат xOy геометрическое место точек M(x, y), соответствующих комплексным числам z = x + iy, удовлетворяющим условию $|z - 1 + i| \le 3$.

Решение:

$$|z-1+i| \le 3 \Leftrightarrow |x+iy-1+i| \le 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |(x-1)+(y+1)\cdot i| \le 3 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+1)^2 \le 9 = 3^2.$$

Получается круг с центром A(1, -1) радиуса 3 (рис. 6.6).

🔖 3. Определите, принадлежит ли образ числа z = 1 + i области, заданной двойным неравенством $2 \le |z - 1 + i| \le 3$.

Решение:

Подстановкой в неравенство убеждаемся в том, что M(1, 1) принадлежит кольцу, образованному кругами с центром в точке A(1, -1) и радиусами 2, соответственно 3.




Рис. 6.6

Упражнения и задачи

Реальный профиль

 A_1 1. Решите на множестве C уравнение:

a)
$$(1-i)z^4 = 1-i\sqrt{3}$$
:

Решите на множестве C уравнение:
a)
$$(1-i)z^4 = 1 - i\sqrt{3}$$
; б) $(1+i\sqrt{3})z^3 = 1+i$; в) $z^4 - 7z^2 + 6 = 0$;
г) $z^4 + z^2 - 2 = 0$; д) $z^4 + z^2 - 6 = 0$.

B)
$$z^4 - 7z^2 + 6 = 0$$

$$\Gamma$$
) $z^4 + z^2 - 2 = 0$;

$$z^4 + z^2 - 6 = 0$$

- **2.** Решите на множестве **C** уравнение $\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 + \left(\frac{z-i}{z+i}\right) + 1 = 0$.
- **В**₁ 3. Решите на множестве **C** уравнение $(z+1)^4 = (z-1)^4$.
 - 4. Решите на множестве С возвратное уравнение:

a)
$$x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 5x + 1 = 0$$
; b) $x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = 0$; b) $x^3 - 4x^2 - 4x + 1 = 0$.

6)
$$x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = 0$$
;

B)
$$x^3 - 4x^2 - 4x + 1 = 0$$

- C_1 5. Работайте в парах! Покажите, что уравнение $(z+i)^n + (z-i)^n = 0$ имеет только действительные решения.
 - **6.** а) Вычислите $a = \frac{5}{1-2i} (1-i)(2-i)$. 6) Найдите |a|.

 - в) Определите, принадлежит ли образ числа a кругу с центром в A(1,-1) радиуса 3.
 - 7. Проект Приложения комплексных чисел в науке и технике.

Упражнения и задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- A 1. Вычислите:

 - a) (2+3i)+(-1-i); 6) (4+3i)-(2+5i); B) $(1-3i)\cdot(2-4i);$ (2+i):(3+4i); (2+i):(3+4i); (2+3i)-(2+5i); (2+3i)-(2+5i)-(2+5i); (2+3i)-(2+5i)-(2

- 2. Работайте в парах! Покажите, что число является действительным:
- 3. Решите на множестве С уравнение:
- 6) $z\overline{z} + 2(z \overline{z}) = 25 + 12i$; B) $2z^2 + 2z + 1 = 0$.
- **В** 4. Вычислите модуль числа $z = \left(\frac{8+i}{7-4i}\right)^{-1}$.

5. Пусть $z_1 = \sqrt{3} + i$, $z_2 = -2 - 2i\sqrt{3}$. Вычислите: a) $\bar{z}_1 \cdot z_2$; б) $(z_1 : \bar{z}_2)^2$.

С 6. Вычислите: a) $(1+i)(2+i)+\frac{5}{1+2i};$ b) $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}-(1-i)^{12};$ c) $(1+2i)^3-(1-2i)^3$

B) $\frac{(1+2i)^3 - (1-2i)^3}{(2-i)^2 - (2+i)^2}$; Γ) $\frac{5+i}{(1+i)(2-3i)}$.

7. Найдите z = x + iy, если 2z = |z| - 2i.

Реальный профиль

A₁ **1.** Вычислите:

a) (2-3i)+(-1+i); 6) (4-3i)-(2-5i); B) $(1+3i)\cdot(2+4i);$ Γ (2-i):(3-4i); D) $(-i)^3;$ e) $(-i)^4;$ Γ (2+4i):(3-4i)

2. Покажите, что число является действительным:

3. Решите на множестве С уравнение:

a) $z^2 = -9$; 6) $z\overline{z} + 2(z - \overline{z}) = 20 + 8i$; B) $2z^2 - 2z + 1 = 0$.

4. Вычислите модуль числа $z = \frac{8+\mathrm{i}}{7-\Delta\mathrm{i}}$.

5. Пусть $z_1 = \sqrt{3} - i$, $z_2 = -2 + 2i\sqrt{3}$. Вычислите: a) $\overline{z}_1 \cdot z_2$; б) $(z_1 : \overline{z}_2)^2$.

6. Решите задание **6.** С.

 ${\bf B_1}$ 7. ${\bf Pa }$ Работайте в парах! Найдите $z = x + {\bf i} y$, если $2z = |z| + 2{\bf i}$.

8. Найдите действительную часть числа $(\sqrt{3} + i)^6$.

9. Решите на множестве С уравнение:

a) $z^2 - 3|z| + 3 = 0;$ b) |z| - 2z + 2i = 0; B) $\begin{cases} |z| = |z - 2i|, \\ |z - i| = |z - 1|; \end{cases}$

 Γ) $z^2 + |z| = 0$; $(2+i)z^2 - (5-i)z + (2-2i) = 0$.

10. Запишите в тригонометрической форме число:

11. Найдите корни третьей степени из числа: a) $-2 + 2i\sqrt{3}$; б) $-\frac{3}{8}(\sqrt{3} + i)$.

12. Вычислите: a) $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{1-i}\right)^{12}$; б) $\left(\frac{\sqrt{3}+i}{1-i}\right)^{12} + \left(\frac{\sqrt{3}-i}{1+i}\right)^{12}$; в) $\frac{(1-i\sqrt{3})^{15}}{(1+i)^{12}}$.

 C_1 13. Вычислите $z^4 + \frac{1}{z^4}$, если известно, что $z^2 + z + 1 = 0$.

14. Найдите $n, n \in \mathbb{N}$, для которых верно равенство $(1+i)^n = (1-i)^n$.

15. *Исследуйте!* Пусть заданы комплексные числа $z_0 = 1 + i$, $z_1 = 2 + i$, $z_2 = 2 + 3i$, $z_3 = 3 + i$ и M_0 , M_1 , M_2 , M_3 – их соответствующие образы.

а) Вычислите $|z_1 - z_0|$, $|z_2 - z_0|$, $|z_3 - z_0|$.

б) Выясните, какие из точек $M_{\rm 1},~M_{\rm 2},~M_{\rm 3}$ принадлежат кругу радиуса 2 с центром в точке $M_{\rm 0}.$

16. а) Решите на множестве **C** уравнение $z^2 + 2z + 3 = 0$.

б) Найдите модули полученных решений уравнения.

в) Образ какого из решений уравнения принадлежит кругу с центром в точке M(1,1) радиуса 3.

Итоговый тест

Время выполнения работы: 45 минут

6

2

8

4

4

6)

(8)

(2)

4

6)

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- 1. При каких $x, y \in \mathbb{R}$ равны числа $z_1 = (2+3i)x 3x + 4i$ и $z_2 = (2i-5y)(3-i)$? **6**)
- a) $(2-3i)-\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{5}i\right)$; 6) $\frac{2-3i}{7+i}$. 2. Вычислите: (8)
- **3.** Решите на множестве **C** уравнение (3 + 2i)z + 5z = 4. 4
- **4.** а) Обоснуйте, почему уравнение $7z^2 2z + 13 = 0$ не имеет действительных 2 решений.
 - б) Решите на множестве С это уравнение.
- **5.** Пусть z = -1 i.
 - а) Вычислите z^2 .
 - б) Определите букву, соответствующую верному варианту.

Число z является решением уравнения

A
$$x^2 + (2+i)x - 3i = 0$$
.

B
$$x^2 + 4x + 1 = 0$$
.

A
$$x^2 + (2+i)x - 3i = 0$$
.
B $x^2 + 4x + 1$
C $x^2 + (2+2i)x + 2i = 0$.
D $x^2 + 1 = 0$.

D
$$x^2 + 1 = 0$$

Схема опенивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	36–35	34–31	30–27	26–22	21–16	15–11	10–7	6–4	3–2	1-0

Время выполнения работы: 45 минут

Реальный профиль

- 1. Вычислите: a) $(1-2i)^2 \left(\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$; 6) $\frac{3-i}{2i-7}$.
- **2.** а) Определите, имеет ли уравнение $2z^2 + \sqrt{7}z + 7 = 0$ действительные решения. (2)
 - б) Решите на множестве С это уравнение.
- **3.** Найдите z = x + iy, если $1 z z\overline{z} = i$.
- **4.** Запишите в алгебраической форме число $a = \frac{(1+i\sqrt{3})^{12}}{(-2+2i)^5}$.
- **5.** а) Обоснуйте, почему уравнение $2z^3 = 3i$ имеет решениями только комплексные числа (недействительные).
 - б) Решите на множестве С это уравнение.
- **6.** а) Изобразите в прямоугольной системе координат xOy геометрическое место точек M(x, y), соответствующих комплексным числам z = x + iy, удовлетворяющим условию $1 \le |z - 2i| \le 3$.
 - б) Принадлежит ли этому геометрическому месту точек образ числа z = 1 i? Обоснуйте ответ!

Схема опенивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	36–35	34–31	30–27	26–22	21–16	15-11	10–7	6–4	3–2	1-0

 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Комплексные числа

Модуль

7/

Мотрицы. Определители. Системы линейных уравнений

Цели

- распознавание видов матриц, применение терминологии, соответствующей понятию матрицы;
- □ применение операций над матрицами (в том числе вычисление обратной матрицы), их свойств в различных контекстах, *в том числе для решения матричных уравнений;
 □ распознавание в различных ситуациях определителей второго, третьего порядков, их вычисление разными способами; *применение свойств определителей для вычисления определителей 4-го порядка;
- решение систем линейных уравнений типа (m, n) $m \le 4, n \le 4$, в том числе *однородных, методом Крамера, *методом Гаусса, *матричным методом;
- приложения изученных элементов высшей алгебры для описания некоторых повседневных ситуаций и/или для решения задач из различных областей.

§1 Матрицы

1.1. Общие понятия

Два предприятия производят мороженое. Для этого они используют 4 основных компонента: молоко, сливки, сахар и какао. Первое предприятие ежедневно использует: 890 л молока, 400 кг сливок, 250 кг сахара, 90 кг какао. Второе предприятие ежедневно использует: 1500 л молока, 700 кг сливок, 400 кг сахара и 160 кг какао. Транспортное предприятие заключило контракт на доставку данных продуктов указанным предприятиям. Для удобства эти данные записали в следующую таблицу:

$$\begin{pmatrix} 890 & 400 & 250 & 90 \\ 1500 & 700 & 400 & 160 \end{pmatrix} \tag{1}$$

Таблицы такого вида (названные матрицами) применяются в математике, экономике и в других областях.

Определение. Матрицей размера $m \times n \ (m, n \in \mathbb{N}^*)$ называется таблица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

содержащая $m \cdot n$ элементов, расположенных в m строках и n столбцах.

Матрицу обозначают: $A = (a_{ij}), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}.$

Элементы $a_{i1}, a_{i2}, ..., a_{in}$ составляют *i*-ю **строку**, а элементы $a_{1j}, a_{2j}, ..., a_{mj} - j$ -й **столбен** матрицы (2). Следовательно, первый индекс (*i*) элемента a_{ij} (читается

а-и-йот (жи); например, a_{12} читается а-один-два, но никак не а-двенадцать) указывает номер строки, а второй индекс (j) – номер столбца, где расположен этот элемент.

Например, размер матрицы (1) равен (2×4), $a_{21} = 1500$, $a_{22} = 700$.

Задание. Напишите: а) все элементы матрицы (1); б) строки и столбцы матрицы (1).

Множество матриц размера $m \times n$ с элементами из множества \mathbb{C} (соответственно из множеств \mathbb{R} , \mathbb{Q} , \mathbb{Z}) обозначают через $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$ (соответственно $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{Q}), \ \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{Z})$). В дальнейшем будем рассматривать матрицы с комплексными элементами, если не будут оговорены другие условия.

Существуют различные виды матриц.

Для
$$m=n$$
 матрица (2) имеет вид $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ и называется **квадратиюй**

матрицей порядка п. В этом случае множества $\mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C}), \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R}), ...$ соответственно обозначаются $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, ... В квадратной матрице элементы $a_{11}, a_{22}, ..., a_{nn}$ образуют *главную диагональ*, а элементы $a_{1n}, a_{2n-1}, ..., a_{n-12}, a_{n1}$ – ее *второстепенную* диагональ. Квадратная матрица, у которой все элементы, расположенные выше (соответственно ниже) главной диагонали, равны нулю, называется ниженетреугольной (соответственно верхнетреугольной) матрицей.

Для
$$n=1$$
 матрица (2) принимает вид $A=\begin{pmatrix} a_{11}\\a_{21}\\ \vdots\\a_{m1} \end{pmatrix}$ и называется вектор-столбцом, а для $m=1$ получаем $A=(a_{11}\ a_{12}\ ...\ a_{1n})$, и она называется вектор-строкой.

Квадратная матрица порядка n вида $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix}$ называется единичной

Если все элементы матрицы (2) равны 0, то A называется *нулевой матрицей* и обозначается $O_{m \times n}$ или O, если известен ее вид.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_{3\times 2}$$

Квадратная Единичная матрица матрица порядка 3 порядка 3

$$\begin{pmatrix}
1 & 0 & 3 & 4 \\
0 & 2 & 1 & 2 \\
0 & 0 & -1 & 1 \\
0 & 0 & 0 & 4
\end{pmatrix}$$

матрица порядка 4

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_{3\times 2}$$

Нулевая матрица размера 3×2

Если известно, что $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$, то матрицу A обозначим $A = (a_{ij})$.

Определение. Две матрицы $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$ называются равными, если $a_{ij} = b_{ij}$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$.

1.2. Операции над матрицами

 Сложение матриц, умножение матриц на число, транспонирование матриц

Определение. Пусть $A = (a_{ij}), \ B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbf{C})$. Суммой матриц A и B называется матрица $D = (d_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbf{C})$, где $d_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$.

Обозначают: D = A + B.

Пример

Суммой матриц
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} -1 & -7 & 5 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ является матрица
$$D = \begin{pmatrix} 2-1 & 1-7 & 3+5 \\ -1+2 & 0-3 & -4+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -6 & 8 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Определение. Произведением матрицы $A=(a_{ij})\in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbf{C})$ на число $\alpha\in\mathbf{C}$ называется матрица $B=(b_{ij})\in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbf{C})$, где $b_{ij}=\alpha\cdot a_{ij}$, $i=\overline{1,m},\ j=\overline{1,n}$.

Обозначают: $B = \alpha A$.

Замечания. 1. Матрица (-1)A обозначается через -A, так как A+(-1)A=(-1)A+A=O. Матрица -A называется **противоположной матрице** A. Сумму B+(-A) обозначают через B-A.

2. Сложение матриц определяется только для матриц одинаковых размеров, однако любую матрицу можно умножить на число.

Пример

Для матриц из предыдущего примера имеем:

$$2A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ -2 & 0 & -8 \end{pmatrix}, iB = \begin{pmatrix} -i & -7i & 5i \\ 2i & -3i & 0 \end{pmatrix}.$$

Определение. Транспонированной к матрице $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$ называется матрица $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times m}(\mathbb{C})$, для которой $b_{ij} = a_{ji}$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$.

Если A матрица размера $m \times n$, то транспонированная к ней матрица имеет размер $n \times m$ и обозначается tA ; ее столбцы (строки) совпадают с соответствующими строками (столбцами) матрицы A.

Примеры
1. Если
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
, то ${}^{t}A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

2. Пусть
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$
, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Возможно ли вычислить $3 \cdot {}^{t}A - 5B$?

Так как размеры матриц ${}^t\!A$ и B (следовательно, $3 \cdot {}^t\!A$ и 5B) различны, то невозможно вычислить "матрицу" $3 \cdot {}^t\!A - 5B$.

В теореме 1 приведены свойства определенных выше операций над матрицами.


Теорема 1. Для любых матриц $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), D = (d_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$ и любых чисел α , $\beta \in \mathbb{C}$ справедливы равенства:

- **1°** A + B = B + A (сложение коммутативно);
- 2° A + (B + D) = (A + B) + D (сложение ассоциативно);
- 3° A + O = O + A = A (*O* является нейтральным элементом относительно сложения);
- **4°** A + (-A) = -A + A = O (любая матрица имеет противоположную);
- 5° $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;
- 6° $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$;
- 7° $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$;
- **8°** $1 \cdot A = A$;
- 9° ${}^{t}(\alpha A) = \alpha^{t}A;$
- $10^{\circ} {}^{t}(A+B) = {}^{t}A + {}^{t}B$:
- 11° ${}^{t}({}^{t}A) = A$.

Доказательство

Для доказательства используются определение равенства матриц и свойства операций над комплексными числами. Докажем, например, свойство 2°.

Матрица F = A + (B + D) того же размера, что и F' = (A + B) + D. Элемент f_{ii} матрицы F имеет вид $f_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + d_{ij})$, а соответствующий ему элемент f'_{ij} матрицы F' имеет вид: $f'_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + d_{ij}$. Так как сложение комплексных чисел ассоциативно, то $f_{ij} = f'_{ij}, \ i = \overline{1, m}, \ j = \overline{1, n}$. Следовательно, матрицы F и F' равны.



Свойства операций над матрицами позволяют решить матричные уравнения, т. е. уравнения, в которых неизвестным является матрица.

Задание с решением Найдем матрицу X, если $2 \cdot {}^{t}A + 3X - 4I = O$, где $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3i \\ -2 & 3 & -i \end{bmatrix}$

Решение:

Свойства 2°-4° дают право переносить известные слагаемые в правую часть, поменяв их знак.

$$3X = -2 \cdot {}^{t}A + 4I_{3} = -2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ i & 0 & 3 \\ 0 & 3i & -i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6 \\ 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -6i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 4 \\ -2i & 0 & -2i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2i & 2i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 &$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 4 \\ -2i & 4 & -6 \\ 0 & -6i & 4+2i \end{pmatrix}. \text{ Отсюда} \quad X = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 4 \\ -2i & 4 & -6 \\ 0 & -6i & 4+2i \end{pmatrix}.$$

Умножение матриц

Проиллюстрируем операцию умножения матриц на следующем примере.

Малое предприятие производит игрушки: кукол (к) и медвежат (м).

Объем продаж (тыс. штук) в первом квартале года указан в матрице:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 5 & 3 \\ 6 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$
 янв. февр. март.

Цена (в леях) каждой игрушки указана в матрице $B = \begin{pmatrix} 50 \\ 90 \end{pmatrix}_{\rm M}^{\rm K}$

Месячный доход, получаемый предприятием, равен:

$$v_{11} = 5 \cdot 50 + 3 \cdot 90 = 520$$
 (в январе), $v_{21} = 6 \cdot 50 + 7 \cdot 90 = 930$ (в феврале),

$$v_{31} = 4.50 + 8.90 = 920$$
 (в марте).

Можно заметить, что v_{11} (соответственно v_{21} , v_{31}) получается путем сложения произведений элементов первой (соответственно второй, третьей) строки матрицы A на соответствующие элементы вектора-столбца B.

Матрица $V = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \\ v_{13} \end{pmatrix}$ представляет собой произведение матрицы A на матрицу B.

Определение. Пусть $A = (a_{ii}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbf{C}), B = (b_{ii}) \in \mathcal{M}_{m \times k}(\mathbf{C})$. Произведением **матрицы** A на матрицу B (в этом порядке) называется матрица $D=(d_{sp})\in \mathcal{M}_{m\times k}(\mathbb{C})$, элементы которой d_{sp} вычисляются следующим образом: $d_{sp}=a_{s1}b_{1p}+a_{s2}b_{2p}+...+a_{sn}b_{np}=\sum_{i=1}^n a_{si}b_{ip},\ \ s=\overline{1,\,m},\ \ p=\overline{1,\,k}.$

Обозначают: $D = A \cdot B$ или D = AB

Другими словами, элемент d_{sp} произведения AB равен сумме произведений элементов строки s матрицы A на соответствующие элементы столбца p матрицы B(кратко говорят также, что элемент d_{sn} равен произведению элементов строки sматрицы A на элементы столбца p матрицы B).

Внимание. Произведение АВ определено лишь в случае, когда число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B. Число строк (столбцов) матрицы ABравно числу строк (столбцов) матрицы A(B).

Пример

Пример
$$B$$
ычислим $D = A \cdot B$, если $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ По определению имеем
$$D = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ -2 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + (-3) \cdot 0 & (-2) \cdot 0 + 0 \cdot 3 + (-3) \cdot 2 & (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot 1 + (-3) \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 0 \\ -2 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Замечание. В отличие от умножения чисел, умножение матриц не коммутативно. В предыдущем примере произведение AB определено, а BA не определено. Но и в случае, когда оба выражения AB и BA имеют смысл, эти произведения не обязательно равны.

Например:
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$$
.

Свойства умножения матриц приведены в следующей теореме.

Теорема 2. Если для матриц A, B, D имеет смысл выражение из одной части равенства, то имеет смысл и выражение из другой части равенства и верно соответствующее равенство:

- 1° A(BD) = (AB)D (умножение ассоциативно);
- **2°** A(B+D) = AB + AD, (A+B)D = AD + BD (умножение дистрибутивно относительно сложения);
- $3^{\circ} {}^{t}(AB) = {}^{t}B \cdot {}^{t}A;$
- **4°** $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A, \ I_n, \ A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \ (I_n$ нейтральный элемент относительно умножения в $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$;
- $5^{\circ} A \cdot O = O, O \cdot A = O.$

Доказательство

Эти свойства можно доказать, используя определения равенства матриц и действий над матрицами.

Докажем, например, свойство 1°.

Пусть $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$, $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times p}(\mathbb{C})$, $D = (d_{ij}) \in \mathcal{M}_{p \times q}(\mathbb{C})$ – произвольные матрицы, для которых определено произведение (AB)D. Сначала заметим, что имеет смысл и произведение A(BD): матрица BD содержит n строк и q столбцов, следовательно, определено произведение A(BD) и в результате получим матрицу размера $m \times q$, то есть того же размера, что и матрица (AB)D. Чтобы получить равенство соответствующих элементов, обозначим:

$$U = AB = (u_{ij}), V = BD = (v_{ij}), S = (AB)D = (S_{ij}), T = A(BD) = (t_{ij}).$$

Имеем:

$$u_{il} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kl}, \quad v_{kj} = \sum_{l=1}^{p} b_{kl} d_{lj}, \quad s_{ij} = \sum_{l=1}^{p} u_{il} d_{lj} = \sum_{l=1}^{p} \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kl} d_{lj}, \quad t_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} v_{kj} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{p} a_{ik} b_{kl} d_{lj},$$
 то есть $s_{ij} = t_{ij}$ для $i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, q}, \quad \text{и, в итоге, } A(BD) = (AB)D$. При доказательстве были использованы и свойства операций над комплексными числами.

Задание. Докажите остальные свойства.

На множестве $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ определены все введенные выше операции, поэтому, в частности, можно вычислить степени с натуральными показателями произвольной матрицы. Если $n \in \mathbb{N}^*$ и $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$, то $A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot ... \cdot A}_n$. Легко проверить равенства $A^s \cdot A^t = A^{s+t}$, $(A^s)^t = A^{st}$, $s, t \in \mathbb{N}^*$.

Задания с решением

5. а) Пусть $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3$. Вычислим $f(A) = A^3 - 2A^2 + 3I_2$ для $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

б) Можно вычислить f(B) для B = (2 - 1)?

Решение:

a)
$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$
, $A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.
Итак, $f(A) = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

б) Не существует B^2 , значит, невозможно вычислить f(B)

4.
$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Вычислим A^n , если $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $n \in \mathbb{N}^*$. *Решение*:

Воспользуемся методом математической индукции.

Чтобы найти формулу для A^n , вычислим A^2 , A^3 :

$$A^{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Можно предположить, что $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$. Применяя метод математической индукции можно доказать, что это равенство справедливо при любых $n \in \mathbb{N}^*$.

Рассматриваемые ниже понятия будут использованы для решения произвольных систем линейных уравнений.

Определение. Говорят, что ненулевая матрица имеет ступенчатый вид (является ступенчатой), если первый (слева) ненулевой элемент в каждой строке, начиная со второй, расположен правее первого ненулевого элемента из предыдущей строки.

Первые (слева) ненулевые элементы (если существуют) называются ведущими.

Пример

Матрица
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
 является ступенчатой матрицей, а матрица $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

не является ступенчатой.

Замечания. 1. Если ступенчатая матрица имеет нулевые строки, то они стоят в конце.2. Квадратная ступенчатая матрица является верхнетреугольной матрицей.

Для приведения матрицы к ступенчатому виду применим к ее строкам преобразования, подобные тем, которые применяются к уравнениям системы уравнений, чтобы получить систему, равносильную первоначальной.

Определение. Элементарными преобразованиями строк матрицы называются следующие преобразования:

- 1) перестановка двух строк;
- 2) умножение всех элементов строки на одно и то же ненулевое число;
- 3) прибавление к элементам некоторой строки соответствующих элементов другой строки, умноженных на одно и то же число.

Матрицы одинакового размера A и B называются эквивалентными, если одна получается из другой путем применения конечного числа элементарных преобразований строк.

Обозначают: $A \sim B$.

Пример

Рассмотрим матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$. К ее строкам применим следующие преобразования (обозначенные стрелками):

- а) переставим строки
- $\begin{pmatrix}
 1 & -1 & 0 & 2 \\
 -1 & 2 & 3 & 0
 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}
 -1 & 2 & 3 & 0 \\
 1 & -1 & 0 & 2
 \end{pmatrix};$ $i\begin{pmatrix}
 1 & -1 & 0 & 2 \\
 -1 & 2 & 3 & 0
 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}
 i & -i & 0 & 2i \\
 -1 & 2 & 3 & 0
 \end{pmatrix};$ б) умножим элементы первой строки на і
- в) к элементам первой строки прибавим $\binom{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 3 & 6 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix};$ соответствующие элементы второй строки, умноженные на 2
- г) к элементам первой строки, умноженным на 3, прибавим соответствующие элементы второй строки, умноженные на 2

Теорема 3. Для любой ненулевой матрицы А существует, по крайней мере, одна такая конечная последовательность элементарных преобразований строк матрицы, что их последовательное выполнение приводит матрицу Aк ступенчатому виду.

Пример

Приведем матрицу к ступенчатому виду, указывая стрелками последовательное выполнение элементарных преобразований:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}^2 \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}^2 \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \end{pmatrix}$$

Замечания. 1. Существует больше, чем одна последовательность элементарных преобразований строк, с помощью которых из матрицы A получается ступенчатая

2. Ступенчатая матрица, полученная из A, определена неоднозначно, однако все имеют одно и то же количество ненулевых строк.

Упражнения и задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

A 1. Вычислите:

a)
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$
, 6) $\begin{pmatrix} 7 & 5 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & i \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & 2-i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & i \\ i & 3i \end{pmatrix}$; F) $\begin{pmatrix} 3 & i \\ i & 2+i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$; A) $3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 3 & i \end{pmatrix}$; e) $2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & i & 2 \\ 2 & 0 & -i \\ -1 & 7 & 3 \end{pmatrix}$; K) $2i \cdot \begin{pmatrix} 3 & i & 5 \\ 0 & 2 & i \\ 1 & i-1 & -3 \end{pmatrix}$; 3) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$; A) $\begin{pmatrix} 7i & -1 \\ 3 & 8i \end{pmatrix} - i \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ i & 3 \end{pmatrix}$; K) $\begin{pmatrix} 3 & i & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2. \nearrow Работайте в парах! Найдите числа x, y, если

$$x \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y & 0 & 6 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 7 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Вычислите АВ, ВА (в случае, когда существует соответствующее произведение):

a)
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$
, $B = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$;
b) $A = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 1 & 7 & 9 \end{pmatrix}$;
c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 9 & 0 \\ 6 & 2 & 3 \\ 11 & 5 & 7 \end{pmatrix}$;
c) $A = \begin{pmatrix} a & 1 & x \\ b & 1 & y \\ c & 1 & z \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;
d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$;
e) $A = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$, $B = I_3$.

4. Вычислите:

a)
$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$
; 6) $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$; B) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$; F) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$; C) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$; e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$; \mathbf{x}) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

- **В** 5. Вычислите разность $A^2 B^2$ (в случае, когда существует), где A, B из задания 3.
 - **6.** Найдите такую матрицу X, что 3X + A = 2B, где A, B из задания **3** а), в).
 - 7. Работайте в парах! Вычислите f(A), если:

a)
$$f(X) = X^3 - 2X + I_3$$
, $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; 6) $f(X) = X^3 - 3X + 2I_3$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

8. Пять строек C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 получают кирпич от трех поставщиков A, B, C. Цены (сотни леев) на перевозку одного поддона с 1000 кирпичами от каждого поставщика до каждой стройки приведены в матрице T:

$$T = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & C_5 \\ 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 6 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} C$$

Начиная со следующего месяца цены возрастут на 10%. Используя операцию умножения матрицы на число, найдите новые цены.

9. Число поддонов с кирпичами, перевезенных от поставщиков на стройки (см. задачу **8**) за первые три месяца текущего года, приведены в матрицах M_1 , M_2 , M_3 :

$$M_{1} = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 10 & 8 & 5 \\ 10 & 8 & 4 & 0 & 6 \\ 3 & 3 & 4 & 10 & 7 \end{pmatrix}, M_{2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 6 & 3 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}, M_{3} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найдите число поллонов с кирпичами, перевезенных от каждого поставшика на каждую стройку за первый квартал года.

10. — Исследуйте! В матрицах A_1 и A_2 представлены результаты тестирования в

двух классах (вторая строка содержит соответствующее количество отметок).
$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 7 & 3 & 4 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \ A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 6 & 5 & 5 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- б) Предложите вариант изменения результатов тестирования в первом классе, при которых средний балл в этом классе был бы выше, чем во втором классе.
- **11.** Верно ли матричное равенство $A^2 B^2 = (A B)(A + B)$, при любых $A, B \in \mathcal{M}_s(\mathbb{R})$?

Реальный профиль

A₁ **1.** Вычислите:

2. \nearrow Работайте в парах! Найдите числа x, y, z, u, если

$$x \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y & z & 6 \\ 1 & u & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 7 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Вычислите АВ, ВА (в случае, когда существует соответствующее произведение):

a)
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$
, $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$;
b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 11 \\ 9 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$;
c) $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;
d) $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;
e) $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4. Вычислите:

a)
$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
, 6) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

- **В**₁ **5.** 1) Вычислите разность $A^2 B^2$ (в случае, когда существует), где A, B из задания **3**. 2) Верно ли матричное равенство $A^2 B^2 = (A B)(A + B)$?
 - **6.** Найдите такую матрицу X, что 3X + A = 2B, где A, B из задания **3**.
 - **7.** Решите задание **8**, **C**.
 - **8.** Решите задание **9**, **С**.
 - 9. Вычислите:

BEFUNCTION:

a)
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$$
, $n \in \mathbb{N}^*$;

b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n$, $n \in \mathbb{N}^*$;

B) $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \hline 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}^k$, $k \in \mathbb{N}^*$;

10. Вычислите f(A), если:

a)
$$f(X) = X^3 - 2X + I_3$$
, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 6) $f(X) = X^3 - 3X + 2I_3$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

 \mathbb{C}_1 11. Покажите, что для любых $A, B \in \mathcal{M}_{_{\!\!R}}(\mathbb{C})$ равенство AB - BA = I неверно.

12. Предприятие намерено приобрести три вида машин T_1, T_2, T_3 у трех поставщиков F_1 , F_2 , F_3 . Число машин, предлагаемых каждым поставщиком, дано в следующей

матрице:
$$M = \begin{pmatrix} T_1 & T_2 & T_3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} F_1 F_2 .$$

В зависимости от выбранного варианта комплектации машин (2 варианта V_1 и V_{2}) предприятие может их приобрести у каждого поставщика по следующим

ценам (д. ед.):
$$P = \begin{pmatrix} V_1 & V_2 \\ 5,1 & 4,1 \\ 5,2 & 4,0 \\ 5,0 & 3,8 \end{pmatrix} T_1$$
 каждому поставщику (в обоих вариантах).

каждому поставщику (в обоих вариантах).

13. Mccnedyŭme! В матрицах A_1 и A_2 представлены результаты тестирования в

двух классах (вторая строка содержит соответствующее количество отметок).
$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 8 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \ A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 7 & 3 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- а) В каком из классов средний балл выше?
- б) Предложите вариант изменения результатов тестирования в первом классе, при которых средний балл в этом классе был бы выше, чем во втором классе.
- **14.** а) Если $A \cdot B = B \cdot A$, то матрицы A, B обязательно являются квадратными матрицами одного и того же порядка? Обоснуйте ответ.
 - б) Приведите пример матриц $A, B \ (A \neq B)$ и отличные от единичной матрицы), удовлетворяющих равенству из задания а).

§2 Определители

С помощью систем линейных уравнений (то есть уравнений вида $a_1x_1 + a_2x_2 + ... + a_nx_n = c$, c, $a_i \in \mathbb{C}$, i = 1, n) можно решать различные задачи. Например, ученик купил тетради и карандаши, всего 22 предмета, заплатив 20 д. ед. Сколько тетрадей и сколько карандашей он купил, если одна тетрадь стоит 1,5 д. ед., а один карандаш -0.5 д. ед.? Обозначим через x число приобретенных тетрадей, а через y – число купленных карандашей. Из условия задачи получим систему двух

линейных уравнений с двумя неизвестными:
$$\begin{cases} x + y = 22, \\ 1,5x + 0,5y = 20. \end{cases}$$

Применив один из известных способов решения (метод подстановки, метод алгебраического сложения и др.), получим x = 9, y = 13.

В общем случае рассматриваются системы линейных уравнений, содержащие больше двух уравнений, неизвестных, и для их решения эти методы мало эффективны. В дальнейшем изложим другие методы решения, которые основываются на понятиях матрицы, определителя матрицы.

Замечание. В этом параграфе слово "матрица" будет обозначать "квадратная матрица".

2.1. Определители второго (третьего) порядка. Системы двух (трех) линейных уравнений с двумя (тремя) неизвестными

Произвольная система двух линейных уравнений с двумя неизвестными имеет вид:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & a_{ij}, b_i \in \mathbb{C}, i, j = \overline{1, 2}. \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, & a_{ij}, b_i \in \mathbb{C}, i, j = \overline{1, 2}. \end{cases}$$
 (1)

Матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ называется *матрицей системы* (1).

Предположив, что в каждом уравнении, по крайней мере, один из коэффициентов при неизвестных ненулевой, применим для решения метод алгебраического сложения. Получим систему:

$$\begin{cases}
(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}, \\
(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1.
\end{cases}$$
(2)

Очевидно, что любое решение системы (1) является решением и для (2). Пусть $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, тогда получим

$$x_{1} = \frac{b_{1}a_{22} - b_{2}a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad x_{2} = \frac{a_{11}b_{2} - a_{21}b_{1}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$
 (3)

Определение. Число $\Delta = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ называется **определителем матрицы** (говорят также детерминант матрицы) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, или определителем второго порядка. Также обозначают: $\det A$, |A| или $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$. Следовательно, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \Delta$.

Выражение Δ называется *главным определителем* системы (1).

Заметим, что числители отношений в (3) также могут быть записаны в виде определителей, а именно: $b_1a_{22}-b_2a_{12}=\begin{vmatrix}b_1&a_{12}\\b_2&a_{22}\end{vmatrix}=\Delta_1,\ a_{11}b_2-a_{21}b_1=\begin{vmatrix}a_{11}&b_1\\a_{21}&b_2\end{vmatrix}=\Delta_2,\ и$ они называются второстепенными определителями системы (1).

Отметим, что Δ_1 (или Δ_2) получается из |A| заменой первого (соответственно второго) столбца на столбец $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ свободных членов системы (1).

Пример

Определителем матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ является число $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 2$.

Полученный результат (3) сформулируем в виде следующей теоремы:

Теорема 4 (правило Крамера). Если главный определитель Δ системы (1) отличен от нуля, то система имеет единственное решение: $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Lambda}$, $x_2 = \frac{\Delta_2}{\Lambda}$.



Габриэль Крамер

¹ Габриэль Крамер (1704–1752) – швейцарский математик.

Доказательство

Из выполненных выше преобразований следует единственность решения: если $x_1 = c_1$, $x_2 = c_2$ является решением системы (1), то оно совпадает со значениями для x_1 , x_2 из (3). То, что эти значения из (3) являются решениями, проверяется подстановкой в (1).

Задание с решением

Методом Крамера решите на множестве \mathbb{R} систему уравнений $\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 = 3, \\ 3x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$

Так как $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 12 = 16 \neq 0$, можно применить правило Крамера и получим

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 10; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -7.$$
 Значит, $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{5}{8}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -\frac{7}{16}.$

Ombem: $S = \left\{ \left(\frac{5}{8}, -\frac{7}{16} \right) \right\}$.

Используя метод алгебраического сложения для решения системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными, которая в общем виде записывается:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, & a_{ij}, b_i \in \mathbb{C}, i, j = \overline{1, 3}, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$
(4)

можно получить уравнения: $\Delta \cdot x_1 = \Delta_1, \ \Delta \cdot x_2 = \Delta_2, \ \Delta \cdot x_3 = \Delta_3,$ (5) где $\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32},$ $\Delta_1 = b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32},$ $\Delta_2 = a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{13}b_2a_{31} - a_{11}a_{23}b_3 - b_1a_{21}a_{33},$ $\Delta_3 = a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - b_1a_{22}a_{31} - a_{11}b_2a_{32} - a_{12}a_{21}b_3.$

Определение. Определителем матрицы $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, или определителем третьего порядка называется число

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33},$$

Также обозначают: $\det A$, |A| или $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ -3 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot (-4) + 1 \cdot 3 \cdot (-3) + 0 \cdot 4 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-2) \cdot (-3) - 2 \cdot 3 \cdot 4 - 1 \cdot 0 \cdot (-4) = -11.$$

Замечания. 1. Определитель третьего порядка представляет собой сумму шести членов, каждый из которых равен произведению трех элементов, расположенных по одному в каждой строке и каждом столбце матрицы A (определителя).

2. Для запоминания алгоритма вычисления определителя третьего порядка можно воспользоваться *правилом треугольников* (рис. 7.1) или *правилом Саррюса* (рис. 7.2): знак плюс ставится перед произведениями элементов, соединенных линией или расположенных в вершинах треугольников на рисунке 7.1 а) или 7.2 а), знак минус ставится перед произведениями элементов, соединенных линией или расположенных в вершинах треугольников на рисунке 7.1 б) или 7.2 б).

Возвращаемся к решению системы (4). Выражение Δ называется *главным опре- делителем* этой системы (определителем матрицы A системы). Заметим, что свободные члены $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ в уравнениях (5) также являются определителями третьего порядка (проверьте!):

$$\Delta_{1} = \begin{vmatrix} b_{1} & a_{12} & a_{13} \\ b_{2} & a_{22} & a_{23} \\ b_{3} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_{1} & a_{13} \\ a_{21} & b_{2} & a_{23} \\ a_{31} & b_{3} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_{1} \\ a_{21} & a_{22} & b_{2} \\ a_{31} & a_{32} & b_{3} \end{vmatrix}.$$

Отметим, что Δ_i (i=1,3) (названный *второстепенным определителем*) есть определитель матрицы, полученной из матрицы A системы (4) заменой столбца i на столбец свободных членов системы (4).

Используя равенства (5), получим следующую теорему, аналогичную теореме 4.

Теорема 5 (правило Крамера). Если главный определитель Δ системы (4) отличен от нуля, то система имеет единственное решение:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}.$$

Задание с решением

🔖 Выясним, можно ли применить правило Крамера, и решим систему:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_2 - x_3 = -1, \\ 4x_1 + x_2 - x_3 = 3. \end{cases}$$

Решение:

Так как
$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -6 + 4 - 12 + 2 = -12$$
 и он отличен от нуля, то можно при-

менить правило Крамера.

Вычислим второстепенные определители:

$$\Delta_{1} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -12; \ \Delta_{2} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0; \ \Delta_{3} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -12.$$

Получим решение:
$$x_1 = \frac{-12}{-12} = 1$$
, $x_2 = \frac{0}{-12} = 0$, $x_3 = \frac{-12}{-12} = 1$.

Omsem: $S = \{(1, 0, 1)\}.$

Замечание. Решение систем такого вида, для которых их главный определитель равен нулю, рассмотрим в §3.

2.2. Определители порядка п

Метод Крамера решения систем 2 (3) уравнений с 2 (3) неизвестными обобщим для систем n линейных уравнений с n неизвестными ($n \in \mathbb{N}, n \ge 2$). Он основывается на понятии определителя порядка n.

Сначала, для удобства, введем в рассмотрение определитель первого порядка, $\det(a_{11}) = a_{11}$, и изложим другой алгоритм для вычисления определителей третьего порядка (названный *разложением определителя по строке/столбцу*). Для этого сгруппируем члены определителя, выделив элементы первой строки:

$$|A| = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}).$$

Этот результат запишем в следующей форме:

$$|A| = a_{11}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Определители второго порядка из этого выражения называются *дополнительными минорами* соответствующих элементов a_{1j} , записанных перед ними: это определители матриц, полученных из первоначальной матрицы удалением строки 1 и столбца j. Дополнительный минор элемента a_{ij} обозначается через \overline{M}_{j}^{i} . Используя эти обозначения, для определителя матрицы A получим выражение:

$$|A| = a_{11}(-1)^{1+1}\overline{M}_1^1 + a_{12}(-1)^{1+2}\overline{M}_2^1 + a_{13}(-1)^{1+3}\overline{M}_3^1,$$

которое называется *разложением определителя по первой строке*. Аналогично получаются разложения определителя третьего порядка по любой строке или любому столбцу. Например, легко проверяется равенство:

$$\begin{vmatrix} A | = a_{13}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + a_{23}(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} + a_{33}(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{13}(-1)^4 \overline{M}_1^3 + a_{23}(-1)^5 \overline{M}_2^3 + a_{23}(-1)^6 \overline{M}_3^3,$$

которое представляет собой разложение определителя по третьему столбцу.

Аналогично получаются разложения определителя по любой другой строке/ столбцу.

Задание. Напишите разложение определителя третьего порядка по другим строкам, столбцам.

Задание с решением

Вычислим $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix}$, разложив его по некоторому столбцу.

Разложим определитель по первому столбцу (нулевой элемент упрощает вычисления):

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) + 0 + 4 \cdot (-2) = -12.$$

Понятие определителя квадратной матрицы порядка n (сокращенно – определитель порядка n), $n \in \mathbb{N}$, $n \ge 2$, введем индуктивно, предположив, что известно понятие определителя любого порядка, не превосходящего n-1, и понятие дополнительного минора элемента a_{ij} матрицы $A = (a_{ij}), i, j = \overline{1,n}$. Это определитель матрицы, полученной из A удалением строки i и столбца j; он обозначается через \overline{M}_i^i .

Определение. Определителем квадратной матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \ n \ge 2,$ или определителем порядка n, называется число

$$\Delta = a_{11}(-1)^{1+1}\overline{M}_1^1 + a_{12}(-1)^{1+2}\overline{M}_2^1 + \dots + a_{1n}(-1)^{1+n}\overline{M}_n^1 = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j}a_{1j}\overline{M}_j^1.$$
 (6)

Также обозначают:
$$|A|$$
, $\det A$ или $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

Следующее понятие очень полезно для вычисления определителей, а также для решения других задач.

Определение. Алгебраическим дополнением элемента a_{ij} матрицы $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \ n \ge 2, \ ($ определителя |A|) называется число $A_{ij} = (-1)^{i+j} \overline{M}_j^i$.

Например, дополнительным минором элемента a_{23} определителя |A| из предыдущего примера является $\overline{M}_3^2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 6$, а его алгебраическое дополнение есть число $A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot 6 = -6$.

Используя это понятие, придадим формуле (6) вид:

$$\Delta = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n} = \sum_{i=1}^{n} a_{1j} \cdot A_{1j}.$$
 (7)

Т. е. определитель квадратной матрицы равен сумме произведений элементов первой строки на соответствующие алгебраические дополнения.

Формулы (6), (7) (для n=3 они совпадают с полученной ранее формулой разложения определителя третьего порядка по первой строке) называются разложением определителя по первой строке.

Задание с решением

Вычислим определитель $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 0 + (-1) \cdot (+15) + 2 \cdot 0 + (-3) \cdot (-1) \cdot 0 = -15.$$

Если в формулах (6), (7) можно было бы заменить элементы первой строки элементами другой строки (как и для определителя третьего порядка), то предыдущий определитель можно было бы вычислить проще: разложив его по четвертой строке, пришлось бы вычислить только один дополнительный минор, так как остальные умножаются на нули. Следующая теорема показывает, что такое разложение возможно.

Теорема 6. Пусть $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \ n \ge 2$. Для любых $i = \overline{1, n}$ справедливо равенство:

$$\Delta = |A| = a_{i1}(-1)^{i+1}\overline{M}_1^i + a_{i2}(-1)^{i+2}\overline{M}_2^i + \dots + a_{in}(-1)^{i+n}\overline{M}_n^i = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}.$$
 (8)

Эта формула называется разложением определителя по строке і.

Задание с решением

Вычислим определитель $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$

Решение:

Применим теорему 6, разложив определитель по 4-й строке (так как она содержит больше нулевых элементов).

$$|A| = 0 \cdot (-1)^{4+1} \overline{M}_{1}^{4} + 0 \cdot (-1)^{4+2} \overline{M}_{2}^{4} + 3 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{4+4} \overline{M}_{4}^{4} = (-3) \cdot 5 = -15.$$

Идея разложения определителя по строке, содержащей большее число нулей, наводит на мысль о разложении определителя по столбцу. Следующая теорема подтверждает эту возможность.

Теорема 7. Пусть $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \ n \ge 2$. Для любых $j = \overline{1, n}$ справедлива формула:

$$\Delta = |A| = a_{1j}(-1)^{1+j}\overline{M}_{j}^{1} + a_{2j}(-1)^{2+j}\overline{M}_{j}^{2} + \dots + a_{nj}(-1)^{n+j}\overline{M}_{j}^{n} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij}.$$

Эта формула называется разложением определителя по столбцу ј.

Задание с решением

🔖 Разложим определитель из предыдущего задания по второму столбцу.

Решение:

$$|A| = 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+2} \overline{M}_{2}^{2} + 0 \cdot (-1)^{3+2} \overline{M}_{2}^{3} + 0 \cdot (-1)^{4+2} \overline{M}_{2}^{4} = -1 \cdot 15 = -15.$$

2.3. Свойства определителей

Вычисление определителей на основе определения затруднено, если его элементы содержат объемные выражения (радикалы, логарифмы, комплексные числа, ...). Следующие свойства определителей облегчат их вычисление. Кроме того, свойства 2°, 5°, 8° показывают, как изменится определитель матрицы, если мы применим к ее строкам элементарные преобразования.

1° Определитель матрицы A равен определителю транспонированной матрицы tA . Это свойство можно доказать, вычислив |A|, |A| для n=2, n=3 или используя математическую индукцию для n>3 (определитель |A| нужно разложить по первой строке, а |A| — по первому столбцу).

Замечание. Из этого свойства следует, что любое свойство, справедливое для строк определителя, будет верным и для столбцов. Поэтому следующие свойства будут сформулированы только для строк, хотя они верны и для столбцов.

2° Если матрица B получается из матрицы A перестановкой двух строк, то |B| = -|A|.

Доказательство

Применим метод математической индукции: для k=2 свойство проверяется непосредственно, а переход от k-1 к $k,\ k\geq 3$, осуществляется разложением определителя по строке, отличной от тех, которые переставляются.

 3° Если матрица A содержит две одинаковые строки, то ее определитель равен нулю. Λ оказательство

Действительно, переставляя эти две строки, получим матрицу B, для которой, ввиду свойства 2° , |B| = -|A|. На самом деле B = A, так как переставили две одинаковые строки. Следовательно, |A| = |B| = -|A|, то есть 2|A| = 0 и поэтому |A| = 0.

4° Сумма произведений элементов некоторой строки матрицы на соответствующие алгебраические дополнения элементов любой другой строки равна 0:

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \dots + a_{in}A_{kn} = 0 \quad (i \neq k).$$

Доказательство

Выражение из левой части равенства представляет собой разложение по строке k определителя матрицы, полученной из матрицы A путем замены элементов строки k на соответствующие элементы строки i, т.е. матрицы, содержащей две равные строки, определитель которой равен нулю.

5° Если все элементы некоторой строки матрицы A умножить на число α , то получится матрица A', определитель которой равен произведению α на определитель матрицы A.

Также говорят: общий множитель элементов некоторой строки можно вынести перед знаком определителя.

Доказательство

Элементы a'_{ij} строки i матрицы A' имеют вид: $a'_{ij} = \alpha \cdot a_{ij}$. Разложив определитель |A'| по строке i, получим: $|A'| = \sum_{j=1}^{n} (\alpha \cdot a_{ij}) \cdot A_{ij} = \alpha \cdot \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{ij} = \alpha \cdot |A|$.

Пример

$$\begin{vmatrix} 2i & 3i \\ 5 & 8 \end{vmatrix} = 16i - 15i = i, \ \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} = 1, \ \text{3hauht}, \ \begin{vmatrix} 2i & 3i \\ 5 & 8 \end{vmatrix} = i \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{vmatrix}.$$

6° Если все элементы некоторой строки матрицы равны нулю, то определитель этой матрицы равен нулю.

Это свойство получается из свойства 5° для $\alpha = 0$.

Аналогично свойству 5° доказывается свойство 7°.

7° Если матрица содержит две пропорциональные строки, то ее определитель равен нулю. Строки i и s некоторой матрицы A называются *пропорциональными*, если $a_{ii} = \beta \cdot a_{si}$, $j = \overline{1, n}$.

Пример

$$\begin{vmatrix} 2 & i & -3 \\ 4 & 2i & -6 \\ 7 & \pi & i\sqrt{3} \end{vmatrix} = 0$$
, так как строки 1 и 2 пропорциональны.

8° Если к элементам некоторой строки матрицы A прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженные на одно и то же число α , то получится матрица, определитель которой равен определителю матрицы A.

Доказательство

Пусть к элементам строки k матрицы A прибавили соответствующие элементы строки s, умноженные на число α . Элементы k–й строки полученной матрицы B имеют вид: $a_{ki} + \alpha a_{si}$. Разложив определитель |A'| по строке k, получим

$$|A'| = \sum_{j=1}^{n} (a_{kj} + \alpha \cdot a_{sj}) A_{kj} = \sum_{j=1}^{n} a_{kj} A_{kj} + \alpha \cdot \sum_{j=1}^{n} a_{sj} A_{kj} = |A| + \alpha \cdot 0 = |A|.$$

Пример Если к элементам второй строки матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ прибавим соот-

ветствующие элементы третьей строки, умноженные на -2, получим матрицу

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$
. Таким образом, $|A| = |B| = 0$.

2.4. Вычисление определителей

Во избежание громоздких вычислений рекомендуется выполнить преобразования определителя (используя свойства), чтобы получить нулевые элементы.

Замечания. 1. а) Определитель верхнетреугольной/нижнетреугольной квадратной матрицы (порядков 2, 3) равен произведению элементов главной диагонали.

б) Определитель матрицы, элементы которой, расположенные выше/ниже второстепенной диагонали, равны нулю, равен произведению элементов этой диагонали, взятого со знаком минус:

$$\Delta_{1} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}, \ \Delta_{2} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -a_{13}a_{22}a_{31}.$$

2. Для определителей квадратных матриц порядка 4 имеем:

2. Для определителей квадратных матриц порядка 4 име
$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44};$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & 0 \\ a_{41} & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{41}a_{32}a_{23}a_{14}.$$

Эти результаты получаются, если разложить определитель (а также новые полученные определители) по строке, которая содержит только один ненулевой элемент.

Задания с решением

\\$ 1. Вычислим
$$\Delta = \begin{vmatrix} 1-i & 2 & 3i \\ i & 2+i & i \\ 1 & 4+i & 4i \end{vmatrix}$$
.

 Решение:
 $\Delta = \begin{bmatrix} 1-i & 2 & 3i \\ 1 & 4+i & 4i \\ 1 & 4+i & 4i \end{bmatrix}$. Этот

определитель равен нулю, так как содержит две равные строки (свойство 3°).

У. 2. Вычислим
$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$
.

Применим свойства 2°, 8° и получим определитель, имеющий треугольный вид:

$$\Delta_{1} = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 6 & -10 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -1 \cdot 6 \cdot (-5) = 30.$$

Теорема 8 (определитель произведения матриц). Если $A, B \in \mathcal{M}_{a}(C)$, то $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.

Пример Если
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, то $AB = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Имеем $|A| = 1$, $|B| = -2$, $|AB| = -2$.

2.5. Обратимые матрицы

Известно, что для любого ненулевого числа a существует число a^{-1} такое, что $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = \frac{1}{a} \cdot a = 1$. Ставя задачу найти такую матрицу B, что для заданной матрицы A верно $A \cdot B = B \cdot A = I$, вводится следующее понятие:

Определение. Квадратная матрица A называется **обратимой**, если существует такая квадратная матрица B, что AB = BA = I.

Матрица B называется обратной матрицей к матрице A и обозначается A^{-1} .

Очевидно, что B и I того же размера, что и A. Из соотношений $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$ следует, что A^{-1} также обратима и что обратная ей матрица равна A, т. е. $(A^{-1})^{-1} = A$.

Примеры Обратными к матрицам
$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ являются соответственно $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ и $B^{-1} = \frac{1}{22} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ -12 & 8 & 5 \\ 6 & -4 & 3 \end{pmatrix}$, так как $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и $B^{-1} \cdot B = B \cdot B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Свойства обратимых матриц

1° Матрица, обратная к обратимой матрице, единственна.

Доказательство

Предположим обратное. Пусть B и C – обратные матрицы для A, т. е. CA = AC = I и BA = AB = I. Из этих равенств получаем: B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C.

2° Если матрицы $A_1,\ A_2,\ ...,\ A_k\in\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ обратимы, то матрица $A_1\cdot A_2\cdot ...\cdot A_k$ обратима и $(A_1\cdot A_2\cdot ...\cdot A_k)^{-1}=A_k^{-1}\cdot A_{k-1}^{-1}\cdot ...\cdot A_2^{-1}\cdot A_1^{-1}$.

Доказательство

Действительно, например, для k = 2 имеем:

$$(A_1 \cdot A_2) \cdot (A_2^{-1} \cdot A_1^{-1}) = A_1 \cdot (A_2 \cdot A_2^{-1}) \cdot A_1^{-1} = A_1 I_2 A_1^{-1} = A_1 A_1^{-1} = I_2.$$

Используя определители и алгебраические дополнения элементов квадратной матрицы, приведем еще один критерий обратимости матрицы и другой метод вычисления обратной матрицы.

Теорема 9. Квадратная матрица обратима в том и только в том случае, когда ее определитель отличен от нуля.

Доказательство

Heoбxoдимость следует из теоремы 8. Так как матрица A обратима, то $I=A\cdot A^{-1}$, и, значит, $1=|I|=|A|\cdot |A^{-1}|$, откуда следует, что $|A|\neq 0$ и (очень важно!) $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}=|A|^{-1}$.

В процессе доказательства достаточности получается формула для вычисления обратной матрицы. Именно, покажем, что

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$
(9)

Действительно, на основе свойства 4° и формулы разложения определителя по строке (столбцу) для $n \ge 2$ получаем:

$$A^{-1} \cdot A = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$=\frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} A_{i1} a_{i1} & \sum_{i=n}^{n} A_{i1} a_{i2} & \dots & \sum A_{i1} a_{in} \\ \sum_{i=1}^{n} A_{i2} a_{i1} & \sum_{i=n}^{n} A_{i2} a_{i2} & \dots & \sum_{i=n}^{n} A_{i2} a_{in} \\ \sum_{i=1}^{n} A_{in} a_{i1} & \sum_{i=n}^{n} A_{in} a_{i2} & \dots & \sum_{i=n}^{n} A_{in} a_{in} \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{pmatrix} = \frac{|A|}{|A|} I = I.$$

Аналогично доказывается, что $A \cdot A^{-1} = I_n$.

Для n=1, из условия $|A|=|a_{11}|\neq 0$ получаем $A^{-1}=\left(\frac{1}{a_{11}}\right)$. Следовательно, $AA^{-1}=A^{-1}\cdot A=I$.

Задание с решением

Задание с решениемНайдем матрицу, обратную $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

Решение:

Вычислим определитель матрицы: $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 6 + 4 + 12 = 22.$

Обратная матрица существует, так как $|A| \neq 0$. Найдем алгебраические дополнения элементов матрицы A:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 2; \ A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -12; \ A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6;$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 6; \ A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8; \ A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4;$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1; \ A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 5; \ A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 3.$$

Согласно формуле (9), получим: $A^{-1} = \frac{1}{22} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -12 & 8 & 5 \\ 6 & -4 & 3 \end{bmatrix}$.

Применяя обратную матрицу, можно решить различные матричные уравнения. Если матрицы A и B имеют одинаковое число строк, то уравнение AX = B, где A – квадратная матрица, для которой $\det A \neq 0$, можно решить следующим образом. Умножив слева обе части уравнения на A^{-1} , получим последовательно матричные равенства:

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B, \ (A^{-1}A)X = A^{-1}B, \ I \cdot X = A^{-1}B, \ X = A^{-1}B.$$

Например, для матрицы A из предыдущего примера и $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ получаем

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{22} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ -12 & 8 & 5 \\ 6 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{22} \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 4 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Задание. Покажите, что решением уравнения XA = B, $|A| \neq 0$, является матрица $X = B \cdot A^{-1}.$

Задания с решением

5 1. Для производства 1 т конфет "Маска" необходимо 0,2 т какао-продуктов и 0,5 т сахара, а для производства 1 т конфет "Грильяж" используется 0,14 т какао-продуктов и 0,6 т сахара (не считая другие компоненты). Найдем, сколько получается конфет каждого вида, если израсходовано 0,15 т какао-продуктов и 0,5 т сахара.

Решение:

Обозначим через x_1 и x_2 количество (в тоннах) полученных конфет "Маска" и "Грильяж" соответственно. Составим систему уравнений: $\begin{cases} 0.2x_1 + 0.14x_2 = 0.15 \\ 0.5x_1 + 0.6x_2 = 0.5 \end{cases}$

или, в матричной форме,
$$AX = B$$
, где $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.14 \\ 0.5 & 0.6 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0.15 \\ 0.5 \end{pmatrix}$

Вычислим:
$$A^{-1} = \frac{1}{0.05} \begin{pmatrix} 0.6 & -0.14 \\ -0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$$
.

Умножив слева равенство AX = B на A^{-1} , получим

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{0.05} \begin{pmatrix} 0.6 & -0.14 \\ -0.5 & 0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.15 \\ 0.5 \end{pmatrix} = \frac{1}{0.05} \begin{pmatrix} 0.02 \\ 0.025 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.5 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, было произведено 0,4 т конфет "Маска" и 0,5 т конфет "Грильяж".

У 2. Можно доказать, что площадь треугольника $M_1M_2M_3$, где $M_1(x_1, y_1)$,

$$M_2(x_2, y_2), \ M_3(x_3, y_3), \$$
вычисляется по формуле: $\mathcal{A}_{M_1M_2M_3} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}.$

В частности, точки M_1 , M_2 , M_3 коллинеарны, если соответствующий определитель равен нулю.

Даны точки $M_1(2,3)$, $M_2(3,0)$, $M_3(2,2)$. Вычислим площадь треугольника $M_1M_2M_3$ или покажем, что соответствующие точки коллинеарны.

Решение:

Определитель
$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$
 равен -1 , следовательно, данные точки не коллинеар-

ны. Площадь $\Delta M_1 M_2 M_3$ равна $\frac{1}{2} \cdot |-1| = \frac{1}{2}$ (кв. ед.).

Упражнения и задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. 1) Вычислите определитель:
 - a) $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$; 6) $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 6 \end{vmatrix}$; B) $\begin{vmatrix} 2a & 3a \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$; F) $\begin{vmatrix} 5i & i \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$; A) $\begin{vmatrix} 5-i & 5 \\ 3 & 5-i \end{vmatrix}$; e) $\begin{vmatrix} 5 & 3 & -7 \\ 9 & 1 & 9 \\ 10 & 6 & 3 \end{vmatrix}$; 3) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$; 3) $\begin{vmatrix} -3 & 3 & -7 \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix}$; 4) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix}$; 6) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -3 \\ 5 & 3 & 3 \end{vmatrix}$.
 - 2) Вычислите определитель из 1.1) ж), используя правило треугольника, затем, применив свойства определителей, приведите определитель к треугольному виду (все элементы, расположенные выше (ниже) главной или второстепенной диагонали, равны нулю). Сравните результаты.
 - 2. 1) Выясните, можно ли решить методом Крамера систему уравнений:

a)
$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 = 5, \\ x_1 + 2x_2 = 1; \end{cases}$$
 6) $\begin{cases} 3x_1 + 8x_2 = 1, \\ 4x_1 + 3x_2 = 2; \end{cases}$ B) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 2, \\ 3x_1 - 5x_2 = 3; \end{cases}$ $(x_1 + x_2 + x_2) = (x_1 + x_2) = (x$

$$\begin{bmatrix} mx_1 + nx_2 = p, \\ -nx_1 + mx_2 = q, \\ m \cdot n \neq 0; \\ \end{bmatrix} \begin{cases} x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 3, \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 - 8x_2 - 3x_3 = -2; \\ \end{bmatrix} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 6; \\ \end{bmatrix} \begin{cases} x_1 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 3, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 3, \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 = 7; \\ \end{bmatrix} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2, \\ 3x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 4, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3. \\ \end{bmatrix}$$

- 2) Решите на R×R системы уравнений из 2.1) методом Крамера.
- **В** 3. Решите на $\mathbf{C} \times \mathbf{C}$ систему уравнений:

a)
$$\begin{cases} (3+i)x + (4-2i)y = 2-6i, \\ (4-2i)x - (2-3i)y = 5-4i; \end{cases}$$
 6)
$$\begin{cases} (2-i)x + (2+i)y = 6, \\ (3-2i)x + (3+2i)y = 8; \end{cases}$$
 8)
$$\begin{cases} x-iy-2z = 10, \\ x-y-2iz = 20, \\ ix+3iy+(1-i)z = -30. \end{cases}$$

- **4.** Решите на **C** уравнение $\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} = 0$, где f(x) = 16x + 6, $g(x) = 4x^2 + 2x$.
- **С** 5. *Исследуйте!* Зависимость количества y (в литрах) израсходованного топлива

от веса x (в тоннах), $x \in [1, 4]$, груза автомобиля задана функцией $f(x) = \begin{bmatrix} 4 & x & 2 \\ x-1 & 2 & x \\ 6 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

- а) Задайте аналитически f(x). б) При каких $x, x \in [1, 4], f(x) = 0$
- в) При каких x, $x \in [1, 4]$, будет израсходовано минимальное количество топлива? Вычислите это количество топлива.
- 6. Вычислите, используя свойства определителей:

a)
$$\begin{vmatrix} a+1 & 1 & a^2 \\ b+1 & 1 & b^2 \\ c+1 & 1 & c^2 \end{vmatrix}$$
; 6) $\begin{vmatrix} x+a & a & a \\ x+a & x & a \\ 2a & a & x \end{vmatrix}$; B) $\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$.

7. Paбomaйте в парах! Решите на множестве R уравнение:

a)
$$\begin{vmatrix} 2x-4 & 2 & -2 \\ x & -3 & 1 \\ 2 & -5 & x+1 \end{vmatrix} = 0;$$

6)
$$\begin{vmatrix} -x & a & a \\ x & a-x & a \\ 0 & a & a-x \end{vmatrix} = 0.$$

Реальный профиль

a)
$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$
; 6) $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$; B) $\begin{vmatrix} a & 2 \\ 2a & 3 \end{vmatrix}$; F) (EAK, 2019) $\begin{vmatrix} 5i & 2 \\ i & -3 \end{vmatrix}$; A) $\begin{vmatrix} 2-i & i \\ 3 & 5-i \end{vmatrix}$; e) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 8 & 1 & 9 \\ 4 & 6 & 3 \end{vmatrix}$; W) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{vmatrix}$; 3) $\begin{vmatrix} 3 & 3 & -7 \\ 2 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$; W) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$; K) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 2 & -3 & 3 \\ 1 & -3 & 3 \end{vmatrix}$

- 2) Вычислите определитель из 1.1) ж), используя правило треугольника, затем, применив свойства определителей, приведите определитель к треугольному виду (все элементы, расположенные выше (ниже) главной или второстепенной диагонали, равны нулю). Сравните результаты.
- 2. 1) Выясните, можно ли решить методом Крамера систему уравнении

a)
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 8x_2 = 1, \\ 7x_1 + 11x_2 = 3 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 = 5\\ x_1 + 3x_2 = 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 = 3 \\ x_1 - x_2 = 6 \end{cases}$$

а)
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 4, \\ x_1 + 2x_2 = 1; \end{cases}$$
 б) $\begin{cases} 3x_1 + 8x_2 = 1, \\ 7x_1 + 11x_2 = 3; \end{cases}$ в) $\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 = 5, \\ x_1 + 3x_2 = 2; \end{cases}$ г) $\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 = 3, \\ x_1 - x_2 = 6; \end{cases}$ д) $\begin{cases} ax_1 + bx_2 = c, \\ -bx_1 + ax_2 = d, \ a \cdot b \neq 0, \ a \neq b; \end{cases}$ е) $\begin{cases} 2x_1 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 1, \\ -x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 2; \end{cases}$ ж) $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 6; \end{cases}$ д) $\begin{cases} 3x_1 - x_2 = 5, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 15; \end{cases}$ д) $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 = 7, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 3; \end{cases}$ к) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 3. \end{cases}$

e)
$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 - 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 1, \\ -x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6, \end{cases}$$

3)
$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 = 5, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 15; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$

- 2) Решите на $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ системы уравнений из 2.1) методом Крамера.
- 3. Вычислите определитель:

a)
$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -3 & 4 \end{vmatrix}$$
; 6) $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 11 & 5 \\ 1 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & 3 & 4 \end{vmatrix}$; B) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}$; F) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$; A) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 5 \end{vmatrix}$

4. 1) Выясните, обратима ли матрица:

2) Используя алгебраические дополнения элементов, найдите обратную к матрице из 4.1).

- **В**₁ **5.** Решите на множестве **C** уравнение $\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} = 0$, где f(x) = 8x + 3, $g(x) = 2x^2 + x$.
 - **6.** Исследуйте! Зависимость количества y (в литрах) израсходованного топлива от веса x (в тоннах), $x \in [1, 4]$, груза автомобиля задана функцией $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & 2 \\ -1 & 2 & x \\ 1 & 4 & 5 \end{vmatrix}$.
 - а) Задайте аналитически f(x). б) При каких $x, x \in [1, 4], f(x) = 0$?
 - в) При каких x, $x \in [1, 4]$, будет израсходовано минимальное количество топлива? Вычислите это количество топлива.
 - 7. Применяя свойства определителей, докажите равенство:

a)
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & a_1x + b_1y + c_1 \\ a_2 & b_2 & a_2x + b_2y + c_2 \\ a_3 & b_3 & a_3x + b_3y + c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}; 6) \begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1x + b_1 & c_1 \\ a_2 + b_2x & a_2x + b_2 & c_2 \\ a_3 + b_3x & a_3x + b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (1 - x^2) \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

8. Решите на $\mathbf{C} \times \mathbf{C}$ систему уравнений:

a)
$$\begin{cases} (3-i)x + (4+2i)y = 2+6i, \\ (4+2i)x - (2+3i)y = 5+4i; \end{cases}$$
 6)
$$\begin{cases} (2+i)x + (2-i)y = 6, \\ (3+2i)x + (3-2i)y = 8; \end{cases}$$
 B)
$$\begin{cases} x+iy-2z=10, \\ x-y+2iz=20, \\ ix+3iy-(1+i)z=30. \end{cases}$$

- **9.** Вычислите площадь треугольника $M_1M_2M_3$ или покажите, что точки M_1, M_2, M_3 коллинеарны. a) $M_1(2,1), M_2(3,4), M_3(1,6);$ б) $M_1(0,0), M_2(2,1), M_3(4,2);$ в) $M_1(-2,4), M_2(0,-3), M_3(1,7);$ г) $M_1(5,4), M_2(1,0), M_3(0,3).$
- **10.** Решите матричные уравнения AX = B, YA = B, где A из **4** а) и B из **4** б).

11. Решите на множестве
$$\mathbb{R}$$
 уравнение: a) $\begin{vmatrix} x-2 & 1 & -1 \\ x & -3 & 1 \\ 2 & -5 & x+1 \end{vmatrix} = 0$; б) $\begin{vmatrix} a-x & a & a \\ a & a-x & a \\ a & a & a-x \end{vmatrix} = 0$.

- **C**₁ **12.** Если поменять знаки всех элементов определителя на противоположные, то как изменится значение определителя порядка: а) 3; б) 4?
 - **13.** Как изменится значение определителя матрицы $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C})$, если каждый ее элемент заменить на сопряженный ему?
 - **14.** Как изменится значение определителя 3 порядка, если каждый его элемент умножить на одно и то же ненулевое число α ?
 - **15.** Покажите, что определитель $\begin{vmatrix} z_1 & \overline{z}_1 & c_1 \\ z_2 & \overline{z}_2 & c_2 \\ z_3 & \overline{z}_3 & c_3 \end{vmatrix}$, $c_i \in \mathbb{R}$, $z_i \in \mathbb{C}$, является чисто мнимым
 - 16. Используя свойства определителей, вычислите:

a)
$$\begin{vmatrix} a & 1 & a^2 \\ b & 1 & b^2 \\ c & 1 & c^2 \end{vmatrix}$$
; 6) $\begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix}$; B) $\begin{vmatrix} a^2 & b^2 & c^2 \\ c & b & a \\ b & c & a \end{vmatrix}$.

17. Вычислите определитель, записав результат в виде произведения:

a)
$$\begin{vmatrix} a^2 & b^2 & c^2 \\ bc & ac & ab \\ b^2 + c^2 & a^2 + c^2 & a^2 + b^2 \end{vmatrix}$$
; 6) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ bc & ca & ab \end{vmatrix}$.

§3 Системы линейных уравнений

3.1. Основные понятия

В этом параграфе найдем условия, при которых произвольная система линейных уравнений имеет решения, а также изложим некоторые методы нахождения множества решений такой системы.

Произвольная система т линейных уравнений с п неизвестными имеет вид:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} a_{ij}, b_i \in \mathbb{C}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}.$$
 (1)

Числа a_{ij} , $i=\overline{1,m}$, $j=\overline{1,n}$, называются коэффициентами при неизвестных, а $b_1, b_2, ..., b_m -$ свободными членами системы.

Коэффициенты при неизвестных и свободные члены образуют две матрицы:

матрицей системы и расширенной матрицей системы.

Определение. Упорядоченная система n комплексных чисел $(c_1, ..., c_n)$ называется **решением** системы (1), если подставив вместо x_i соответственно c_i , i=1, n,каждое уравнение системы (1) обращается в истинное высказывание, то есть

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot c_{j} = b_{i}, \quad i = \overline{1, m}.$$

Замечание. Для удобства решение системы с *п* неизвестными иногда запишем (считая порядок $x_1, ..., x_n$ установленным) в виде вектор-столбца $X_0 = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \end{bmatrix}$ из $\mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbf{C})$, подразумевая, что подставляем $x_1 = c_1, ..., x_n = c_n$.

Можно показать, что если система линейных уравнений имеет хотя бы два решения, то множество ее решений бесконечно.

Система линейных уравнений называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение, и несовместной в противном случае. Совместная система называется определенной, если она имеет единственное решение, и неопределенной, если она имеет более одного решения.

Примеры

Рассмотрим системы уравнений:
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 3, \\ 2x_1 + 3x_2 = -1; \end{cases} \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 3, \\ 4x_1 - 8x_2 = 12; \end{cases} \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 3, \\ x_1 - 2x_2 = 4. \end{cases}$$

Первая система совместна и определена, так как ее главный определитель ненулевой, и, по правилу Крамера, она имеет единственное решение. Вторая система совместна и неопределенна: ее решениями являются, например, $x_1 = 1$, $x_2 = -1$; $x_1 = -3$, $x_2 = -3$. Последняя система несовместна, так как выражения из левых частей уравнения совпадают, а свободные члены – нет.

Решить систему линейных уравнений означает:

- а) выяснить, совместна ли она;
- б) при положительном ответе найти множество ее решений.

В общем случае будем считать, что систему уравнений решаем на множестве С.

В матричном виде система (1) записывается:

$$AX = B,$$
где $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C}), X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m \times 1}(\mathbb{C}).$

Рассмотрим еще одну систему линейных уравнений:

$$A_1 X = B_1, \tag{3}$$

причем матрицы A_1 , B_1 одинаковых размеров с A, B соответственно.

Определение. Системы (2) и (3) называются **равносильными**, если их множества решений равны (в частности, если обе не имеют решений).

Пример

Системы
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$
 и
$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$$
 имеют общее решение $x_1 = 1, \ x_2 = 1,$

 $x_3 = 1$, однако они не равносильны, так как $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2$ является решением второй системы, но не является решением первой системы.

Лемма. Если $A, A_1 \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbf{C}), B, B_1 \in \mathcal{M}_{m \times 1}(\mathbf{C})$ и существует обратимая матрица $U \in \mathcal{M}_m(\mathbf{C})$ такая, что $UA = A_1, UB = B_1$, то системы (2) и (3) равносильны.

Доказательство

Пусть система (2) совместна, $X_0 \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{C})$ — произвольное решение (2), то есть верно равенство $AX_0 = B$. Умножая это равенство слева на U, получим $UAX_0 = UB$, или $A_1X_0 = B_1$. Следовательно, любое решение системы (2) является решением для (3). Аналогично получаем, что любое решение системы (3) является решением для (2), так как $A = U^{-1}A_1$, $B = U^{-1}B_1$. Следовательно, системы (2) и (3) равносильны.

3.2. Методы решения систем *п* линейных уравнений с *п* неизвестными

□ Матричный метод

Если в системе (1) m = n, то получаем следующую *систему*:

$$\begin{cases}
a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\
\dots \\
a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n.
\end{cases}$$
(4)

В матричной форме она записывается

$$AX = B, (5)$$

где $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ – квадратная матрица системы, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{C})$.

Теорема 10. Если матрица A системы (4) обратима, то система имеет единственное решение

$$X_0 = A^{-1}B. (6)$$

Доказательство

Умножив слева равенство (5) на A^{-1} , последовательно получим: $A^{-1}(AX) = A^{-1} \cdot B$, $(A^{-1} \cdot A) \cdot X = A^{-1} \cdot B$, $I \cdot X = A^{-1} \cdot B$, $X = A^{-1} \cdot B$. Согласно лемме из п. 3.1, системы (5) и $X = A^{-1} \cdot B$ равносильны: в роли U из леммы выступает обратимая матрица A^{-1} .

Задание с решением

Решим на множестве
$$\mathbf{C} \times \mathbf{C} \times \mathbf{C}$$
 систему уравнений:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2. \end{cases}$$

Решение:
$$\text{Матрицей системы является } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Имеем } |A| = -3, \ A_{11} = 2, \ A_{12} = -1, \ A_{13} = -1, \ A_{21} = -1, \ A_{22} = -1, \ A_{23} = -1, \ A_{24} = -1, \ A_{24} = -1, \ A_{25} = -1, \ A$$

$$A_{31} = -7$$
, $A_{32} = 5$, $A_{33} = -1$.

Итак,
$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 7 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$
 и $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 7 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, то есть

 $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$

Omeem: $S = \{(1, 0, 1)\}.$

 \square Правило Крамера (полученное в § 2 для n=2, n=3) — другой метод решения систем (4). Используя свойство 4° из раздела 2.3, формулу (7) из раздела 2.2 и формулу (9) для A^{-1} из раздела 2.5, с помощью (6) получим формулы для вычисления значений неизвестных $x_1, x_2, ..., x_n$.

Именно:
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n A_{i1} b_i \\ \sum_{i=1}^n A_{i2} b_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n A_{i2} b_i \\ \sum_{i=1}^n A_{in} b_i \end{pmatrix}, \text{ откуда:}$$

$$x_j = \frac{1}{\mid A \mid} \sum_{i=1}^n A_{ij} b_i = \frac{1}{\mid A \mid} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 & \dots & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \frac{\Delta_j}{\Delta}, \ \ j = \overline{1, n}, \ \ \text{где} \ \ \Delta_j - \text{определи-}$$

тель матрицы, полученной из A заменой столбца j столбцом свободных членов системы (4). Определитель $\Delta = |A|$ называется главным, а $\Delta_1, \Delta_2, ..., \Delta_n$ – второстепенными определителями системы (4).

Полученный результат сформулируем в виде теоремы.

Теорема 11 (правило Крамера). Если определитель Δ матрицы системы (4) отличен от нуля, то система совместно определена и ее решением является:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}.$$

Пример

Применив теорему 11 к системе уравнений из предыдущего примера, получим $\Delta=-3,~\Delta_1=-3,~\Delta_2=0,~\Delta_3=-3,~\mathrm{T.~e.}~x_1=1,~x_2=0,~x_3=1.$

3.3. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений

В отличие от рассмотренных выше методов, *метод Гаусса* (названный и *методом последовательного исключения неизвестных*), изложенный далее, можно применить к произвольной системе линейных уравнений (1). Для решения применим следующие преобразования, в результате которых получаем равносильные системы:

- перестановка двух уравнений;
- умножение обеих частей уравнения на одно и то же ненулевое число;
- прибавление к обеим частям некоторого уравнения соответствующих частей другого уравнения, умноженных на одно и то же число.

Очевидно, выполнение этих преобразований над уравнениями системы равносильно выполнению соответствующих элементарных преобразований строк расширенной матрицы \overline{A} системы (см. пункт 1.3).

Следующие примеры помогут глубже вникнуть в суть метода Гаусса; они представляют два типа систем, получаемых в результате применения этого метода.

1. Решим на множестве
$$\mathbf{C} \times \mathbf{C} \times \mathbf{C}$$
 систему линейных уравнений
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ x_2 - x_3 = -1, \\ 2x_3 = 1. \end{cases}$$

Такая система называется *теугольной*, так как ее матрица является верхнетреугольной с ненулевыми элементами на главной диагонали.

Такие системы легко решить: из последнего уравнения вычисляем значение последнего неизвестного и подставляем во все остальные уравнения, из предпоследнего полученного уравнения вычисляем значение предпоследнего неизвестного и т. д., пока не вычислим значение первого неизвестного из первого уравнения. Итак, система имеет единственное решение.

В данном примере из последнего уравнения получаем $x_3 = \frac{1}{2}$; подставляем значение x_3 в первые два уравнения и из второго уравнения получим $x_2 = -\frac{1}{2}$; в итоге, подставляя значение x_2 в первое уравнение, получим $x_1 = 1$. Следовательно, система имеет единственное решение: $x_1 = 1$, $x_2 = -\frac{1}{2}$, $x_3 = \frac{1}{2}$.

Ombem:
$$S = \left\{ \left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\}$$
.

2. Решим на множестве $\mathbf{C} \times \mathbf{C} \times \mathbf{C}$ систему уравнений $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ 3x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$

Заметим, что система не содержит уравнения вида $0 = b, b \neq 0$, число неизвестных больше, чем число уравнений, и матрица системы имеет ступенчатый вид. Говорят, что такая система *трапециевидная*, или имеет ступенчатый вид (другими словами, система линейных уравнений имеет ступенчатый вид (трапециевидная), если ее матрица является ступенчатой, число r ненулевых строк матрицы системы равно числу ненулевых строк расширенной матрицы и r меньше числа неизвестных системы). Неизвестные, коэффициенты которых являются ведущими элементами в ступенчатой матрице, считают, как правило, *главными неизвестными*, а остальные — *второстепенными*, или *свободными*.

В рассматриваемом примере главными неизвестными будем считать x_1 и x_2 , а x_3 – свободным.

Первоначальная трапециевидная система приводится к треугольному виду по отношению к x_1 , x_2 следующим образом:

В левых частях всех уравнений оставляем слагаемые, содержащие главные неизвестные, а остальные слагаемые переносим в правые части, поменяв при этом знаки:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 - x_3, \\ 3x_2 = 1 + x_3. \end{cases}$$

Переменной x_3 придаем произвольное значение α , $\alpha \in \mathbb{C}$, и, решив систему, получим так называемое *общее решение* системы: $x_1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}\alpha$, $x_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\alpha$, $x_3 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$. Очевидно, что для каждого значения α однозначно определяются значения для главных неизвестных. Например, для $\alpha = 0$ получаем решение системы $x_1 = \frac{2}{3}$, $x_2 = \frac{1}{3}$, $x_3 = 0$, называемое *частным решением* системы.

Для $\alpha = -1$ получаем $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, $x_3 = -1$ – другое частное решение системы. Параметру α , следовательно, и свободному неизвестному x_3 , можно придать бесконечное множество значений из \mathbf{C} , поэтому первоначальная система неопрелеленна.

Замечания. 1. Главные неизвестные определяются неоднозначно: важно, чтобы относительно главных неизвестных получилась треугольная система.

Например, в предыдущей системе главными неизвестными могут быть и x_1, x_3 .

2. Системы треугольного и системы ступенчатого видов совместны: треугольная система имеет единственное решение, а трапециевидная система имеет бесконечное множество решений.

Совместность систем линейных уравнений определяется следующей теоремой.

Теорема 12. Пусть $A \in \mathcal{M}_{_{\! M \times \! N}}(\mathbf{C})$, $B \in \mathcal{M}_{_{\! M \times \! I}}(\mathbf{C})$ и $\overline{A} = (A \mid B)$. Система линейных уравнений AX = B совместна в том и только в том случае, если ступенчатые матрицы A_1 , $\overline{A_1}$, полученные из A и \overline{A} соответственно, имеют одинаковое число ненулевых строк.

Задания с решением

1. Установим совместность системы $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 10, \\ x_1 - x_2 + 7x_3 = 8. \end{cases}$

Составляем расширенную матрицу \overline{A} системы и приводим ее к ступенчатому виду:

Ступенчатые матрицы, полученные из матрицы системы, соответственно из расширенной матрицы, имеют по 2 ненулевые строки. Следовательно, первоначальная система совместна.

🔖 2. Если бы в предыдущем примере в третьем уравнении свободный член был бы равен 5, например, то вместо последней матрицы получилось бы:

$$\begin{pmatrix}
1 & 2 & -2 & 2 \\
0 & -1 & 3 & 2 \\
0 & 0 & 0 & -3
\end{pmatrix}.$$

В таком случае ступенчатые матрицы, полученные из матрицы системы и ее расширенной матрицы, имели бы 2 и соответственно 3 ненулевые строки. Следовательно, система несовместна.

Идея приведения расширенной матрицы системы к ступенчатому виду, использованная при доказательстве теоремы 12, составляет основу метода Гаусса решения систем линейных уравнений. Заметим, что этот способ удобно запрограммировать на компьютере. Он состоит в следующем:

- 1. Составляем расширенную матрицу $\overline{A} = (A \mid B)$ системы (1).
- 2. Элементарными преобразованиями строк приводим эту матрицу к ступенчатому виду: $\overline{A_1} = (A_1 \mid B_1)$, где A_1 – ступенчатая матрица, полученная из A.
- 3. Если число ненулевых строк матрицы A_1 не равно числу ненулевых строк матрицы \overline{A}_1 , то система несовместна.
- 4. Если число ненулевых строк матрицы A_1 равно r и равно числу ненулевых строк матрицы \overline{A}_{1} , то система совместна. Рассмотрим два возможных случая.
- Число r, оговоренное в п. 4, равно числу неизвестных. В данном случае 4.1. ступенчатая матрица A_1 является верхнетреугольной матрицей и все элементы ее главной диагонали отличны от нуля. Соответствующая система является треугольной, поэтому она имеет единственное решение.
- Число r, оговоренное в п. 4, меньше числа n неизвестных. В таком случае 4.2. матрица A_1 содержит больше столбцов, чем ненулевых строк. Составляем систему уравнений, которая имеет расширенную матрицу \overline{A}_1 (эта ступенчатая система равносильна системе (1)). Далее определяем главные неизвестные (их число равно r), свободные неизвестные, которые обозначим $x_p = \alpha$, $x_q = \beta$, ..., где α , β , ... – параметры из **С**. В левых частях всех уравнений

оставляем слагаемые, содержащие главные неизвестные, а остальные слагаемые переносим в правые части с противоположными знаками. Так как r < n, то среди слагаемых из правых частей будет фигурировать хотя бы один параметр. После этих преобразований получится треугольная система r уравнений с r неизвестными (главными). Для каждой системы значений параметров однозначно определяются значения главных неизвестных. Полученная система значений для $x_1, ..., x_n$ является *частным решением* системы. Таким образом, получим бесконечно много решений, так как параметры могут принимать бесконечное множество значений.

Замечание. Чтобы задать бесконечное множество решений, полученное в случае 4.2., поступим следующим образом. Из приведенной системы $A_{\scriptscriptstyle 1}X=B_{\scriptscriptstyle 1}$ выражаем главные неизвестные $x_k, x_l, ...$ через параметры $\alpha, \beta, ...$ Полученная система соотношений:

$$\begin{cases} x_{k} = f_{k}(\alpha, \beta, ...) \\ \dots \\ x_{l} = f_{l}(\alpha, \beta, ...) \\ \dots \\ x_{p} = \alpha \\ x_{q} = \beta \\ \dots \end{cases}$$
(7)

называется общим решением системы (1), и задает множество всех решений этой системы в том смысле, что любое решение системы получается из (7) для некоторых значений параметров.

Задания с решением

1. Решим на множестве $\mathbf{C} \times \mathbf{C} \times \mathbf{C}$ систему уравнений $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 10, \\ x_1 - x_2 + 7x_3 = 8. \end{cases}$

Если система неопределенна, найдем также одно ее частное решение.

Решение:

В примере 1, решенном на стр. 218, было показано, что система неопределенна. Для нахождения общего решения составляем систему, соответствующую ступенчатой матрице:

 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2, \\ -x_2 + 3x_3 = 2. \end{cases}$

Главными неизвестными можно выбрать x_1 и x_2 , тогда свободным неизвестным будет x_3 . Обозначив свободное неизвестное через α , $\alpha \in \mathbb{C}$, получим систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2 + 2\alpha, \\ -x_2 = 2 - 3\alpha. \end{cases}$$

Решив эту систему относительно x_1, x_2 , найдем общее решение:

 $x_1 = 6 - 4\alpha$, $x_2 = -2 + 3\alpha$, $x_3 = \alpha$.

Частное решение получим, если возьмем, например, $\alpha = 0$, откуда найдем $x_1 = 6$, $x_2 = -2$, то есть решением будет $x_1 = 6$, $x_2 = -2$, $x_3 = 0$.

Omsem: $S = \{(6-4\alpha, -2+3\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{C}\};$ частное решение: (6, -2, 0).

2. Решим на множестве $\mathbf{C} \times \mathbf{C} \times \mathbf{C}$ систему уравнений $\begin{cases} x_1 + \alpha x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = \alpha, \end{cases}$ рас-

смотрев все возможные случаи (в зависимости от значений параметра $\alpha \in \mathbb{C}$).

Решение:

Составим расширенную матрицу и приведем ее к ступенчатому вид

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & \alpha \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & \alpha \\ 0 & -1+\alpha & -1 & 1 \end{pmatrix}_{-3}^{1-\alpha} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & \alpha \\ 0 & 0 & 6-3\alpha & -3+\alpha-\alpha^2 \end{pmatrix}$$

1) Если $6-3\alpha \neq 0$, то есть $\alpha \neq 2$, то система совместно определена (так как

имеет треугольный вид) и ее решением является:
$$x_1 = \frac{3+\alpha}{6-3\alpha}, \quad x_2 = \frac{3+\alpha}{-6+3\alpha}, \quad x_3 = \frac{\alpha^2-\alpha+3}{-6+3\alpha}.$$

- 2) Если $6-3\alpha=0$, то есть $\alpha=2$, то полученная система несовместна, так как ступенчатая матрица A_1 , полученная из матрицы системы, имеет 2 ненулевые строки, а \overline{A}_{1} содержит 3 ненулевые строки.
- \$\\ \begin{align*} 3. Решим на множестве C систему уравнений \begin{align*} & x_1 + 2ix_2 x_3 + (1+i)x_4 = 3 + 2i, \\ & 2x_1 + x_2 + (-2+i)x_3 + 2ix_4 = 4 + 5i, \\ & x_1 + 2ix_2 + (-1+i)x_3 + (2+i)x_4 = 3. \end{align*}
 Решение: Решение:

Напишем расширенную матрицу системы и приведем ее к ступенчатому виду:

$$\begin{bmatrix}
-2 & 1 & 2i & -1 & 1+i & 3+2i \\
2 & 1 & -2+i & 2i & 4+5i \\
1 & 2i & -1+i & 2+i & 3
\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}
1 & 2i & -1 & 1+i & 3+2i \\
0 & 1-4i & i & -2 & -2+i \\
0 & 0 & i & 1 & -2i
\end{bmatrix}.$$

Получим систему ступенчатого вида: $\begin{cases} x_1 + 2i x_2 - x_3 + (1+i) x_4 = 3 + 2i, \\ (1-4i) x_2 + i x_3 - 2x_4 = -2 + i, \end{cases}$

В качестве главных неизвестных возьмем x_1 , x_2 , x_4 , а свободным неизвестным –

В качестве главных неизвестных возмень x_1, x_2, x_4 : x_3 и решим систему $\begin{cases} x_1 + 2ix_2 + (1+i)x_4 = 3 + 2i + x_3 \\ (1-4i)x_2 - 2x_4 = -2 + i - ix_3 \end{cases}$ относительно x_1, x_2, x_4 . $x_4 = -2i - ix_3$

Обозначив $x_3 = \alpha$, получим общее решение $x_1 = \frac{1}{17}(-5 + 48i - (6 + 7i)\alpha)$, $x_2 = \frac{1}{17}(10 - 11i + (12 - 3i)\alpha), \ x_3 = \alpha, \ x_4 = -2i - i\alpha.$

Omsem:
$$S = \left\{ \left(\frac{1}{17} (-5 + 48i - (6 + 7i)\alpha), \frac{1}{17} (10 - 11i + (12 - 3i)\alpha), \alpha, -2i - \alpha i \right) \alpha \in \mathbb{C} \right\}$$

Замечание. Выражения из правых частей общего решения определены неоднозначно, так как они зависят от выполненных элементарных преобразований, от выбора главных неизвестных. Однако во всех общих решениях в выражениях из правых частей фигурирует одинаковое число (n-r) свободных неизвестных (параметров), где n – число неизвестных, r – число ненулевых строк в ступенчатой матрице.

Например, если в задании 1 объявить главными неизвестными x_1 , x_3 , то, обозначив $x_2=\alpha$, получим систему $\begin{cases} x_1-2x_3=2-2\alpha\\ 3x_3=2+\alpha, \end{cases}$ откуда получаем следующее общее решение: $x_1=\frac{1}{3}(10-4\alpha),\ x_2=\alpha,\ x_3=\frac{1}{3}(2+\alpha),\ \alpha\in\mathbb{C}.$

3.4. Системы однородных линейных уравнений

Система (1) линейных уравнений называется однородной, если свободные члены всех уравнений равны нулю, то есть уравнения однородны. В общем виде система т однородных уравнений с п неизвестными записывается:

$$\begin{cases}
a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\
\dots \\
a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0.
\end{cases}$$
(8)

Замечание. Расширенная матрица однородной системы отличается от матрицы системы нулевым столбцом (последним), поэтому ступенчатые матрицы, полученные из этих матриц, будут содержать одинаковое число ненулевых строк.

Применив имеющиеся результаты, получим следующие утверждения:

- 1. Любая однородная система линейных уравнений совместна; она имеет по крайней мере нулевое решение: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, ..., $x_n = 0$.
- 2. Если число ненулевых строк ступенчатой матрицы, полученной из матрицы системы (8), равно числу неизвестных, то система совместна и определена, и ее единственным решением является: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, ..., $x_n = 0$.
- 3. Если число ненулевых строк ступенчатой матрицы, полученной из матрицы системы (8), меньше числа неизвестных, то система неопределенна. В частности, это имеет место, если число уравнений в (8) меньше числа неизвестных или когда m=n и определитель матрицы системы равен нулю.

Задание с решением

Решим на множестве $\mathbf{C} \times \mathbf{C} \times \mathbf{C}$ систему уравнений $\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0, \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$ Решение:

Для решения системы приведем матрицу системы к ступенчатому виду:

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 & 6 \\ 3 & 8 & 24 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix}^{1} \sim \begin{bmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 0 & 3 & 18 \\ \frac{1}{5} & 0 & -5 & -30 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Система, соответствующая ступенчатой матрице, имеет вид $\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0, \\ x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$

Главными неизвестными удобно считать x_1 и x_2 . Обозначим свободное неизвестное $x_3 = \alpha$ и решим систему $\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = -6\alpha \\ x_2 = -6\alpha \end{cases}$ относительно x_1, x_2 . Получим общее решение: $x_1 = 8\alpha$, $x_2 = -6\alpha$, $x_3 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$.

Ombern: $S = \{(8\alpha, -6\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{C}\}.$

Упражнения и задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

Выясните, какие из следующих систем чисел являются решением системы линейных

уравнений $\begin{cases} x-3y=3\\ x+2y+z=-1\\ 2x-y+z=2 \end{cases}$ (неизвестные упорядочиваем (x,y,z)):

- a) (0, 0, 0);
- б) (1, 1, 1); в) (0, -1, 1); г) (3, 1, 0).
- 2. Методом Крамера решите на множестве С системы уравнений:

- а) $\begin{cases} 4x+3y=7, \\ 2x-y=1; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 2x+3y=-1, \\ x+2y=-1; \end{cases}$ в) $\begin{cases} -x+3y=5, \\ x+2y=5; \end{cases}$ г) $\begin{cases} x-2y=1, \\ x+3y=1; \end{cases}$ д) $\begin{cases} 4x+4y-2z=2, \\ 2x+4y-z=1, \\ 2x-z=1; \end{cases}$ е) $\begin{cases} 2y+6z=12, \\ x+y+z=1, \\ x+2y+3z=4 \end{cases}$ ж) $\begin{cases} x+y+z=0, \\ x+4z=-7, \\ x+2y-2z=7; \end{cases}$ з) $\begin{cases} 3y+5z=-4, \\ 2x+y+z=2, \\ x+3y+z=5. \end{cases}$

- В 3. Работайте в парах! Олег заплатил за 1 бутерброд и 1 кофе 8,5 д. ед., а его друг заплатил за 2 бутерброда и один кофе 13 д. ед. Найдите цены одного бутерброда и одной чашки кофе, составив систему линейных уравнений.
 - 4. Применив операции почленного сложения, вычитания уравнений системы, покажите, что система а) является совместной определенной, а система б) – несовместная.

 - a) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 4, \\ 3x_1 + 4x_2 x_3 = 5, \\ x_1 + 3x_2 x_3 = 1; \end{cases}$ 6) $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + 6x_3 = 1. \end{cases}$
- f C 5. $\not \sim M$ *Исследуйте!* Три предпринимателя A_1 , A_2 , A_3 приобретают акции трех разных фондов.

Количество акций, приобретенных у каждого фонда, и уплаченная сумма (д. ед.) указаны в таблице:

	F_1	F_2	F_3	Сумма
A_1	3	3	2	52,9
A_2	1	2	1	24,6
A_3	1	1	2	24,3

- а) Составьте систему линейных уравнений, с помощью которой можно найти стоимость акций каждого из фондов.
- б) Что можно сказать о стоимости акций, если третий предприниматель приобретает от F_1 , F_2 , F_3 три, три и две акции соответственно, заплатив 77,2 д. ед.?
- 6. Система уравнений из задания 2 д) имеет единственное решение. Заменив лишь одно уравнение, получите:
 - а) несовместную систему;
- б) совместную неопределенную систему.

Реальный профиль

Выясните, какие из следующих систем чисел являются решением системы линейных

уравнений $\begin{cases} x+y+z=0 \\ 2x-y+z=2 \\ x+2y+z=-1 \end{cases}$ (неизвестные упорядочиваем (x,y,z)):

- a) (0, 0, 0);
- б) (1, 1, 1); B) (0, -1, 1); Γ) (3, 1, 0).

2. Методом Крамера решите на множестве С систему уравнений:

a)
$$\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 2x - y = 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ x + 2y = -1; \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} -2x + y = 0, \\ x + 2y = 5; \end{cases}$$

$$\Gamma)\begin{cases} 2x + y = 2, \\ x + 3y = 1; \end{cases}$$

$$\exists (x) \begin{cases}
-x + 8y + 3z = 2 \\
2x + 4y - z = 1, \\
2x - z = 1;
\end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} x + 4y + 9z = 16 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \\ x + 2y + 3z = 4; \end{cases}$$

a)
$$\begin{cases} 2x + 4y = 6, \\ 2x - y = 1; \end{cases}$$
b)
$$\begin{cases} x + y = 0, \\ x + 2y = -1; \end{cases}$$
c)
$$\begin{cases} 2x + y = 2, \\ x + 3y = 1; \end{cases}$$
d)
$$\begin{cases} -x + 8y + 3z = 2, \\ 2x + 4y - z = 1, \\ 2x - z = 1; \end{cases}$$
e)
$$\begin{cases} x + 4y + 9z = 16, \\ 2x + 2y + 2z = 2, \\ x + 2y + 3z = 4; \end{cases}$$
e)
$$\begin{cases} x + 4z = -7, \\ -2x + y + 3z = -7, \\ x + 2y - 2z = 7; \end{cases}$$
3)
$$\begin{cases} 2x + 4y + 6z = -2, \\ 2x + y + z = 2, \\ x + 3y + z = 5. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 4y + 6z = -2, \\ 2x + y + z = 2, \\ x + 3y + z = 5. \end{cases}$$

3. Методом Крамера решите на множестве комплексных чисел систему уравнений:

a)
$$\begin{cases} 2x_1 + (1+i)x_2 - x_3 = 1\\ x_1 + ix_2 + 2x_3 = i,\\ x_2 + (2-i)x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -2; \end{cases}$$

a)
$$\begin{cases} 2x_1 + (1+i)x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 + ix_2 + 2x_3 = i, \\ x_2 + (2-i)x_3 = 0; \end{cases}$$
 6)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -2; \end{cases}$$
 B)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = -4, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = -4. \end{cases}$$

4. \nearrow Работайте в парах! Решите на множестве $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ однородную систему уравнений (для систем в), г) в зависимости от значений $\lambda \in \mathbb{R}$):

a)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 = 0; \end{cases} \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0; \end{cases} B) \begin{cases} x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + 2x_3 = 0; \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = 0, \end{cases} \Gamma \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} x_1 - \lambda x_2 + x_3 \\ x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + \lambda x_3 = \\ x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 = 0. \end{cases}$$

- В₁ 5. а) Виктор заплатил за 3 бутерброда и 2 кофе 21,5 д. ед., а его друг заплатил 13 д. ед. за одну чашку кофе и 2 бутерброда. Найдите цены одного бутерброда и одной чашки кофе, составив систему линейных уравнений.
 - б) В другой раз Виктор заплатил 20 д. ед. за 2 булочки, чашку чая и 2 пирожных, а его друг заплатил 22 д. ед. за одну булочку, чашку чая и 3 пирожных. Составьте систему линейных уравнений, соответствующую этой ситуации. Можно ли в этом случае найти цены купленных продуктов? Почему?

a)
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + 6x_3 = 1; \end{cases}$$

a)
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 5; \end{cases}$$
 b)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + 6x_3 = 1; \end{cases}$$
 B)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1; \end{cases}$$

$$\Gamma) \begin{cases}
2x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\
x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\
x_1 + x_2 + 5x_3 = -7, \\
2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14
\end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 3, & \{x_1 + x_2 + 6x_3 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -7, \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14; \end{cases} x_1 = \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3, \\ 3x_1 + x_2 - 5x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 - 13x_3 = -6; \end{cases} e_1 \begin{cases} x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = \lambda, \\ x_2 + 2x_3 = 1. \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} x_1 - \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 = \lambda, \\ x_2 + 2x_3 = 1. \end{cases}$$

- 7. Решите на множестве комплексных чисел совместные системы из задания 6.
- **8.** Найдите все матрицы *X* такие, что AX = XA, где $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.
- \mathbf{C}_1 9. \mathscr{H} Исследуйте! Три предпринимателя A_1 , A_2 , A_3 приобретают акции трех разных фондов. Количество акций, приобретенных у каждого фонда, и уплаченная сумма (д. ед.) указаны в таблице:

	F_1	F_2	F_3	Сумма
A_1	2	1	1	28,3
A_2	1	2	1	24,6
A_3	1	1	2	24,3

- а) Составьте систему линейных уравнений, с помощью которой можно найти стоимость акций каждого из фондов.
- б) Что можно сказать о стоимости акций, если третий предприниматель приобретает от F_1 , F_2 , F_3 три, три и две акции соответственно, заплатив 77,2 д. ед.?
- 10. Система уравнений из задания 1 имеет единственное решение. Заменив лишь одно уравнение, получите:
 - б) совместную неопределенную систему. а) несовместную систему;
- 11. Найдите все матрицы $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ такие, что $X^2 = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- 12. Проект Приложения элементов высшей алгебры в различных областях.

Упражнения и задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

A 1. Вычислите:

a)
$$A - iB$$
; 6) $iA + B$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & i & -1 \\ 0 & 2 & 3i \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} i & 1 & 0 \\ 1 & i & i+1 \end{pmatrix}$.

2. 1) Выясните, какое произведение существует, и определите размер соответствующей матрицы-произведения:

a)
$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
; 6) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (2 \ 1 \ 3)$; B) $\begin{pmatrix} i & 0 \\ -3i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2i \\ i & 0 \end{pmatrix}$;

$$\text{г) } \begin{pmatrix} 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 6 & -7 \end{pmatrix}; \quad \text{д) } \begin{pmatrix} 5 & 8 & -4 \\ 6 & 9 & -5 \\ 4 & 7 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 4 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & 5 \end{pmatrix}; \quad \text{e) } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 2) Найдите произведения из задания 2.1).

4. Вычислите определитель матрицы A:

a)
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & -2i \end{pmatrix}$$
; 6) $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -3 \\ 1 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$; B) $A = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -1 \\ 6 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$; $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & -2 \\ 5 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$; $A = \begin{pmatrix} a+b & b+c & c+a \\ b-a & c-b & a-c \\ b & c & a \end{pmatrix}$; e) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 5 \\ 2i & 3i & -2i \end{pmatrix}$; $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$; 3) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

5. Методом Крамера решите на множестве комплексных чисел систему уравнений:

a)
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = 1, \\ 3x_1 - x_2 = 5; \end{cases}$$

6)
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 1 - i, \\ 2x_1 - ix_2 = i; \end{cases}$$

6)
$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 1 - i, \\ 2x_1 - ix_2 = i; \end{cases}$$
B)
$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - x - x = 2 \end{cases}$$

$$\Gamma) \begin{cases} 2x_2 + 5x_2 - 6x_3 = 10, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 7, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 1; \end{cases}$$

д)
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 2, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1. \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} 8x_1 + 6x_2 = 11, \\ 3x_1 + 2x_2 = 4, \\ 7x_1 + 10x_2 = 12; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 9, \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 17, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 6; \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{ (2)} & \left\{ \begin{aligned} 2x_2 + 5x_2 - 6x_3 &= 10, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 &= 7, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 &= 1; \end{aligned} \right. & \text{ (2)} & \left\{ \begin{aligned} 2x_1 - x_2 - x_3 &= 2, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 &= 1, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &= 1; \end{aligned} \right. & \text{ (2)} & \left\{ \begin{aligned} 8x_1 + 6x_2 &= 11, \\ 3x_1 + 2x_2 &= 4, \\ 7x_1 + 10x_2 &= 12; \end{aligned} \right. \\ \text{ (2)} & \left\{ \begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 9, \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 &= 17, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &= 6; \end{aligned} \right. & \text{ (2)} & \left\{ \begin{aligned} 2x_1 - x_2 - x_3 &= 2, \\ -2x_1 + x_2 + x_3 &= 1, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &= 1; \end{aligned} \right. \end{aligned} \right. & \text{ (2)} & \left\{ \begin{aligned} 8x_1 + 6x_2 &= 11, \\ 3x_1 + 2x_2 &= 4, \\ 7x_1 + 10x_2 &= 12; \end{aligned} \right. \end{aligned} \right. \\ \left\{ \begin{aligned} 2x_1 - 2x_2 + x_3 &= -5, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &= -5, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 &= 12. \end{aligned} \right. \end{aligned} \right.$$

- **В** 6. Вычислите $A^2 5A + 7I_2$, если $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$
 - 7. $\stackrel{\wedge}{\Omega}$ Работайте в парах! Найдите размер матрицы X, удовлетворяющей равенству $X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = (1 \quad 1).$
 - 8. В коллекции ученика 8 насекомых: пауки и жучки. У пауков по 8 ножек, а у жучков по 6. Найдите, сколько пауков и сколько жучков в коллекции, если всего у насекомых 54 ножки?
- **9.** Найдите $\alpha \in \mathbb{R}$, при которых система уравнений $\begin{cases} x_1 + \alpha x_2 = 4 \alpha \\ \alpha x_1 + 4x_2 = 4, \ \alpha \in \mathbb{C}, \end{cases}$ имеет единственное решение.
 - 10. В двух сосудах содержится раствор одной и той же кислоты, но различной концентрации: в первом сосуде 15 л, а во втором – 10 л. Если перемешать эти растворы, то получится раствор с концентрацией 42% кислоты. Если перемешать одинаковые объемы этих растворов, то получится раствор с концентрацией 50% кислоты. Сколько кислоты содержится в каждом сосуде?
 - 11. Трое вкладчиков открыли депозиты с годовой процентной ставкой в 2%, 2.5% и 3% соответственно. Через год сумма их прибыли (процентов) составила 265 д. ед. Второй вкладчик получил на 35 д. ед. прибыли больше, чем первый. Если бы весь их капитал поместили с годовой процентной ставкой в 2,5%, то годовой прирост составил бы 250 д. ед. Найдите величину вклада каждого вкладчика.

Реальный профиль

- 6) iA + 2B, где $A = \begin{pmatrix} 1 & i & -1 \\ 0 & 2 & 3i \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} i & 1 & 0 \\ 1 & i & i+1 \end{pmatrix}$ A_1 1. Вычислите: a) 3A - 2iB;
 - 2. 1) Выясните, какое произведение существует, и определите размер соответствующей матрицы-произведения:

a)
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
; 6) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} (1 & 2 & 3)$; B) $\begin{pmatrix} 1 & i \\ -2i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & -3i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; Γ) $\begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 6 \\ 5 & 2 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$; Π) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 9 \\ 5 & -1 & 6 \\ 5 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & 7 \\ -4 & -5 & -3 \end{pmatrix}$

2) Найдите произведения из задания 2.1).

3. Найдите значения параметров $x, y, u, v \in \mathbb{R}$, при которых верны равенства:

a)
$$\begin{pmatrix} x+1 & x+y \\ 0 & x-2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -x-1 \\ 0 & 9-2x \end{pmatrix};$$
 6) $\begin{pmatrix} -x & y \\ u+1 & v \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y & x \\ 3v & 1-2u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -8 & 2 \end{pmatrix}.$

4. Вычислите определитель матрицы A:

a)
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3i & -2i \end{pmatrix}$$
; 6) $A = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -3 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$; B) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 6 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$; r) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -5 \\ 5 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$;

5. 1) Установите, совместна ли система

a)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 4, \\ 3x_1 - x_2 = 5; \end{cases}$$
b)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 4, \\ 2x_1 - ix_2 = i; \end{cases}$$
c)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3; \end{cases}$$
c)
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 7, \\ 4x_1 + 8x_2 - 11x_3 = 17, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 1; \end{cases}$$
c)
$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1; \end{cases}$$
e)
$$\begin{cases} x_1 + (1 - i)x_2 = 1, \\ 2x_1 - ix_2 = i, \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 7, \\ 4x_1 + 8x_2 - 11x_3 = 17, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 1; \end{cases}$$
e)
$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 = 4, \\ 7x_1 + 10x_2 = 12; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 12, \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -10 \end{cases}$$
3)
$$\begin{cases} x_1 + (1 - i)x_2 = 1, \\ 2x_1 - ix_2 = i, \end{cases}$$

- 2) Решите на множестве комплексных чисел системы уравнений из задания 5.1).

a)
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{pmatrix}$$
; 6) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$; B) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

- 7. Вычислите матрицы, обратные к матрицам А из задания 4 (если таковые существуют).
- 8. Вычислите матрицы, обратные к матрицам А из задания 6 (если таковые сущест-
- 9. Методом Гаусса или методом Крамера рещите на множестве С систему уравнений:

a)
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2, \\ -x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 10; \end{cases}$$
b)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 4, \\ -2x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -3, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 7x_4 = 7; \end{cases}$$
c)
$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1, \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - 5x_4 = -7, \\ 3x_1 - 7x_2 + x_3 - 5x_4 = -8, \\ x_2 - x_3 - x_4 = -1; \end{cases}$$
c)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 4, \\ -2x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4 = -3, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1, \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - 5x_4 = -7, \\ 3x_1 - 7x_2 + x_3 - 5x_4 = -8, \\ x_2 - x_3 - x_4 = -1; \end{cases}$$
 Γ)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_1 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_1 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_1 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_1 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_1 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_2 + 3x_2 +$$

- 10. В двух сосудах содержится раствор одной и той же кислоты, но различной концентрации: в первом сосуде 75 л, а во втором – 50 л раствора. Если перемешать эти растворы, то получится раствор, содержащий 42% кислоты. Если перемешать одинаковые объемы этих растворов, то получится раствор, содержащий 50% кислоты. Сколько кислоты содержится в каждом сосуде?
- **В**₁ **11.** Вычислите $A^2 5A + 7I_2$, если $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
 - **12.** Определите размер матрицы X, удовлетворяющей равенству $X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = (3 4)$.
 - 13. Найдите значения параметра $\alpha \in \mathbb{C}$, при которых система уравнений имеет лишь

a)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + \alpha x_3 = 0, \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 = 0; \end{cases}$$
6)
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 + \alpha x_2 + 3x_3 = 0, \end{cases}$$

- а) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 x_2 + \alpha x_3 = 0, \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 = 0; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 2x_1 x_2 + x_3 = 0, \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 + \alpha x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$ 14. Решите на множестве **C** уравнение: а) (БАК, 2012) $\begin{vmatrix} 2 & x & 1 \\ 0 & x & -1 \\ 1 & 2 & x \end{vmatrix} = 3;$ б) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & x \\ x & 0 & 1 & 1 \\ 1 & x & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x & 0 \end{vmatrix} = 0.$
- 15.
 Мсследуйте! Исследуйте совместность (в зависимости от $\lambda \in \mathbb{C}$) и решите

a)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 - x_4 = 0; \end{cases}$$
b)
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0; \end{cases}$$
B)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 - x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ \lambda x_1 - 2x_2 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

- 16. Расстояние между двумя городами равно 90 км. Два велосипедиста выезжают из этих городов навстречу другу другу. Если первый отправится на 2 часа раньше второго, то они встретятся через 2,5 часа после того, как выехал второй. Если второй велосипедист отправится на 2 часа раньше первого, то они встретятся через 3 часа после того, как выехал первый. Какова скорость каждого велосипедиста?
- **С** 17. Пусть A квадратная матрица порядка 3, элементы которой $a_{ii} \in \{0, 1\}$. Найдите наибольшее значение $\det A$.

18. Найдите
$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$$
, $n \in \mathbb{N}^*$.

- **19.** Пусть A квадратная матрица порядка 3, элементы которой $a_i \in \{-1, 1\}$.
 - а) Покажите, что det A четное число.
 - б) Найдите наибольшее и наименьшее значение, которое может принимать $\det A$.
- **20.** Можно показать, что объем параллелепипеда $A_1A_2A_3A_4A_1'A_2'A_3'A_4'$, где $A_1(x_1, y_1, z_1)$, $A_2(x_2, y_2, z_2)$, $A_4(x_3, y_3, z_3)$, $A_1'(x_4, y_4, z_4)$, вычисляется по формуле:

$$\mathcal{V} = \text{mod} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}.$$

Вычислите объем параллелепипеда, построенного на векторах $\overrightarrow{A_1A_2}$, $\overrightarrow{A_1A_4}$, $\overrightarrow{A_1A_4}$, $\overrightarrow{A_1A_4}$, если $A_1(1, 1, 1)$, $A_2(1, 2, 2)$, $A_4(0, 4, 2)$, $A_1'(5, 6, 8)$.

- **21.** Работайте в парах! Найдите матрицу $X, X \neq I_3$, перестановочную с $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ **22.** Исследуйте совместность системы $\begin{cases} x_1 + \alpha x_2 = 4 \alpha \\ \alpha x_1 + 4 x_2 = 4, \ \alpha \in \mathbf{C}, \end{cases}$ в зависимости от значе-
- ний параметра $\alpha \in \mathbb{R}$.
- 23. Трое вкладчиков открыли депозиты с годовой процентной ставкой в 4%, 5% и 6% соответственно. Через год сумма их прибыли (процентов) составила 530 д. ед. Второй вкладчик получил на 70 д. ед. прибыли больше, чем первый. Если бы весь их капитал поместили с годовой процентной ставкой в 5%, то годовой прирост со-ставил бы 500 д. ед. Найдите величину вклада каждого вкладчика.
- **24.** Найдите матрицу X, удовлетворяющую равенству $X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$
- **25.** (БАК, 2018) Найдите значения параметра $\alpha \in \mathbb{R}$, при которых матрица $\begin{pmatrix} \alpha^2 - x & \alpha^2 + |x| \\ 1 & \alpha^2 + x \end{pmatrix}$ обратима $\forall x \in \mathbb{R}$.

Итоговый тест

Время выполнения *работы*: 45 _{минут}

2

4

8

(10)

(8)

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

1. 1) Выясните, значение какого выражения можно вычислить:

a) $2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$; 6) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}^2$.

- 2) Найдите значения выражений 1. 1).
- 2. а) Обоснуйте возможность применения правила Крамера для решения системы:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \\ -x_1 + 5x_3 = -1. \end{cases}$$

- б) Решите систему, используя правило Крамера.
- **3.** Пусть \mathcal{M} матрица системы из задания **2** а). Вычислите \mathcal{M}^3 .
- **4.** Три фермера A, B, C пользуются услугой "Доставка на дом", предложенной четырьмя магазинами M_1, M_2, M_3, M_4 . Цены (д. ед.) на транспортировку продуктов из магазина до каждого фермера указаны в следующей матрице:

$$T = \begin{pmatrix} M_1 & M_2 & M_3 & M_4 \\ 2 & 3 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} C$$

Магазины решили, начиная со следующего месяца, снизить цены на транспортировку продуктов на 5%. Используя операцию "произведение матрицы на число", найдите новые цены.

Схема оценивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	36–35	34–31	30–27	26–22	21–16	15–11	10-7	6–4	3–2	1-0

Время выполнения работы: 45 минут

Реальный профиль

1. 1) Определите, значение какого выражения можно вычислить:

a)
$$i \cdot \begin{pmatrix} 3i & 2-i & 7+2i \\ 3-i & 0 & 1-i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & i-1 & 7-i \\ i-1 & 2 & 3+i \end{pmatrix}$$
, 6) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2-i & -1+i \\ 3i & 2+i \end{pmatrix}$, B) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & \sqrt{3} \\ i & \pi \end{pmatrix}$.

- 2) Найдите значения выражений 1. 1).
- **2.** Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.
 - а) Укажите букву, соответствующую верному варианту. |A| pasen A 1. **B** 0. **C** -4. **D** 6.
 - б) Вычислите, если существует, A^{-1} .
 - в) Решите уравнение XA = B, если $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
- **3.** а) Выясните, совместна ли система $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 3, \\ x_1 + 2x_2 3x_3 2x_4 = -2, \\ 4x_1 2x_2 + x_3 + x_4 = 5. \end{cases}$
 - б) В случае, если система совместна, найдите общее решение и одно частное решение.
- **4.** Хозяин пруда продает свежую рыбу в 3 емкостях: C_1 , C_2 , C_3 . 6 Менеджеры M_1, M_2, M_3 трех ресторанов закупили различное количество рыбы и заплатили суммы (д. ед.), указанные в таблице:

	C_1	C_2	C_3	Сумма
M_1	1	2	1	2 700
M_2	2	1	1	3 3 5 0
M_3	1	2	2	3 100

Найдите цену каждой из емкостей, составив и решив систему уравнений.

Схема оценивания теста

Отмотко	10	0	0	7	6	5	4	2	2	1
Отметка	10	9	0	/	U	3	4	3		1
Сумма баллов	36–35	34–31	30–27	26–22	21–16	15-11	10-7	6–4	3–2	1-0

4

3

6

(5)

5

⑤

Определители Системы линейных уравнений	$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{22} & a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{22} &$	Совместная система Число ненулевых строк ступен- чатых матриц A_1 , $\overline{A_1}$ равно.	$\begin{vmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$ — Ступенчатая матрица \overline{A}_1 — Ступенчатая матрица \overline{A}_1 — Ступенчатая матрица \overline{A}_1 — Матрица \overline{A}_1 имеет и ненулевых строк. — $a_{2n-1} = 0$ — Ненулевых строк.	Правило треугольников Метод Гаусса Правило Крамера Правило Сарроса Общее решение Для $m = n$ и Строке (столбцу) $x_k = f_k(\alpha, \beta,)$ $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta},, x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$
IVIAI priudi		Транспонированная Матрица-строка M_j - определител к матрице A Диагональная из квадратной матрица 'A Нулевая матрица Нижнетреугольная a_{11} a_{12} a_{1n} верхнетреугольная a_{11} a_{1n} a_{1n}	о о <u>в в в в</u>	$(a_{ij})(b_{jk}) = (d_{ik}), i = 1, m,$ $j = \overline{1, n}, k = \overline{1, p}, d_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}$ $(a_{ij}) = (a_{ji}), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ Ступенчатая матрица

Модуль



Мемера отронительность прямых и плоскостей

Цели


- распознавание в различных контекстах и применение аксиом, определений и теорем, специфичных для геометрии в пространстве, в различных контекстах;
- распознавание в реальных и/или смоделированных ситуациях и построение пересекающихся, скрещивающихся, параллельных прямых;
- распознавание в различных контекстах относительного положения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, плоскостей;
- построение прямых, пересекающих плоскость, пересекающихся и параллельных плоскостей;
- применение критериев параллельности прямых, параллельности прямой и плоскости, параллельности двух плоскостей в различных контекстах;
- □ использование параллельности прямых и плоскостей для изучения и описания процессов, явлений из различных областей.

§1 Аксиомы геометрии в пространстве

В стереометрии, как и в планиметрии, геометрические понятия и свойства фигур устанавливаются определениями, аксиомами и теоремами. В стереометрии, к известным уже основным понятиям точка, прямая, расстояние, величина угла добавляется понятие плоскости. В этой связи необходимо расширить систему аксиом геометрии на плоскости.

Дополним группу аксиом планиметрии тремя аксиомами, которые выражают основные свойства точек, прямых и плоскостей в пространстве:

- ΠP_1 Для любой плоскости существуют точки, которые принадлежат ей, и точки, не принадлежащие ей (рис. 8.1 а)).
- ΠP_2 Через любые три неколлинеарные точки проходит плоскость, и притом только одна (рис. 8.1 б)).
- ΠP_3 Если две различные плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой (рис. 8.1 в)).



На основании этих аксиом можно доказать следующие теоремы:

Теорема 1. Если две различные точки прямой принадлежат одной плоскости, то любая точка прямой также принадлежит этой плоскости (рис. 8.2 a)).

Теорема 2. Через прямую и точку, не принадлежащую ей, проходит плоскость, и притом только одна (рис. 8.2 б)).

Теорема 3. Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна (рис. 8.2 в)).



Плоскость обозначают строчными буквами греческого алфавита: α , β , γ , ... Плоскость, которая проходит через прямую d и точку A, обозначается (A, d) или (d, A). Плоскость, проходящая через три неколлинеарные точки A, B, C, обозначается (ABC).


Точки, принадлежащие одной плоскости, называются *компланарными*, в противном случае — некомпланарными.

Теорема 4 (теорема о разбиении пространства). Всякая плоскость α разбивает множество точек пространства, не принадлежащих этой плоскости, на два непустых непересекающихся подмножества точек так, что для любых точек A, B из разных множеств отрезок AB пересекает плоскость α , а для любых точек C, A из одного множества отрезок CA не пересекает плоскость α (рис. 8.3).

Определения. • Каждое подмножество из теоремы 4 называется открытым полупространством, заданным плоскостью α , которая называется границей полупространства.

• Объединение открытого полупространства со своей границей называется замкнутым полупространством.

Обозначают: (αA – открытое полупространство с границей полупространства α и содержащее точку A; [αA – замкнутое полупространство с границей α и содержащее точку A (рис. 8.3).




 $C \in [\alpha A, [CA] \cap \alpha = \emptyset, B \notin [\alpha A, [AB] \cap \alpha = E$

Задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- А 1. Возможно ли, чтобы только три вершины параллелограмма лежали в одной плоскости?
 - 2. Центр и две точки окружности принадлежат одной плоскости. Определите, истинно ли высказывание: "Любая точка окружности также принадлежит этой плоскости".
 - 3. Исследуйте! Может ли прямая и плоскость иметь ровно:
 - а) две общие точки;
 - б) 2020 общих точек;
 - в) одну общую точку?
- **В** 4. Пусть DABC тетраэдр, $P \in (AB)$, $Q \in (AD)$. По данной фигуре постройте прямые пересечения плоскостей:
 - a) ABD и CPQ; б) CPQ и ABC; в) CPQ и ADC.



- **5.** Даны три прямые, которые имеют общую точку и не лежат в одной плоскости. Сколько плоскостей проходят через эти прямые?
- 6. Работайте в парах! Даны четыре некомпланарные точки. Найдите:
 - а) число прямых, определяемых этими точками;
 - б) число плоскостей, определяемых этими точками.
- 7. Сколько общих точек может иметь плоскость и:
 - а) отрезок;
- б) полупрямая;
- в) окружность?
- **8.** Три различные точки прямоугольника принадлежат одной плоскости. Содержится ли прямоугольник в этой плоскости?
- **9.** Длина каждого ребра тетраэдра ABCD равна a. Найдите площадь сечения APQ, где P середина ребра BD, а Q середина ребра DC.
 - 10. *Исследуйте!* Даны четыре прямые, которые имеют общую точку, причем любые три из них не лежат в одной плоскости. Найдите число плоскостей, определяемых этими прямыми.
 - 11. Исследуйте! Даны пять точек, любые четыре из них некомпланарные.

Найдите:

- а) число прямых, проходящих через эти точки;
 - б) число плоскостей, проходящих через эти точки.

Реальный профиль

- **A**₁ **1.** Прямые a и b не пересекаются и лежат в одной плоскости. Докажите, что если прямая a пересекает плоскость α , то и прямая b пересекает эту плоскость.
 - **2.** Прямые d_1 , d_2 и d_3 попарно пересекаются в различных точках. Докажите, что эти прямые лежат в одной плоскости.
 - **3.** Точка A не принадлежит плоскости, заданной тремя неколлинеарными точками B, C, D. Докажите, что прямые AD и CB не пересекаются.
- **В**₁ **4.** Докажите, что любые три точки из четырех заданных, которые не лежат в одной и той же плоскости, неколлинеарны.


- 5. Работайте в парах! Пусть плоскости α и β различны. Докажите, что существует хотя бы одна прямая, не лежащая ни в одной из этих двух плоскостей.
- **6.** Прямые AB и CD не лежат в одной плоскости. Докажите, что прямые AC и BD также не лежат в одной плоскости.
- C_1 7. Прямые AB и CD не лежат в одной плоскости. Докажите, что существует единственная плоскость, содержащая прямую AB, которая параллельна прямой CD.
 - **8.** Точки A, B, C, D принадлежат плоскости α и плоскости β . Докажите, что эти точки коллинеарны, если известно, что плоскости α и β различны.
 - **9.** Работайте в парах! Пусть плоскости α и β пересекаются по прямой a, точки A, B принадлежат плоскости α и разделены прямой a. Докажите, что плоскость β разделяет точки A и B.

Взаимное расположение двух прямых в пространстве

Пусть a и b – прямые в пространстве. Возможны следующие случаи взаимного расположения этих двух прямых в пространстве:

- а) прямые a и b имеют две различные общие точки (в этом случае они совпадают, потому что через две различные точки проходит прямая, и притом только одна);
- б) прямые a и b имеют только одну общую точку (в этом случае прямые принадлежат одной плоскости и называются **пересекающимися**) (рис. 8.4);
- в) прямые a и b принадлежат одной и той же плоскости и не имеют общих точек (рис. 8.5);
- Γ) прямые a и b не лежат в одной плоскости. Такие прямые называются *скрещивающимися*, или *некомпланарными* (рис. 8.6).

В случаях а), б), в), прямые a, b называются компланарными (рис. 8.4, 8.5).



Существование скрещивающихся прямых можно доказать следующим образом: В пространстве существует плоскость α и точка B, не лежащая в этой плоскости. В плоскости α существует прямая a и точка A, не лежащая на этой прямой (рис. 8.6). Точки A и B различны и задают прямую b такую, что a и b – скрещивающиеся прямые.


Определение. Две прямые в пространстве называются **параллельными**, если они лежат в одной и той же плоскости и не имеют общих точек или совпадают (рис. 8.5).


Замечание. Если в пространстве две различные прямые не имеют общих точек, это еще не означает, что они параллельны (рис. 8.6). Чтобы доказать, что две различные прямые параллельны в пространстве, необходимо проверить, принадлежат ли они одной и той же плоскости и не имеют ли они общих точек.

Теорема 5. Если одна из двух различных параллельных прямых пересекает плоскость, то и другая прямая пересекает эту же плоскость (рис. 8.7).

Теорема 6. Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны (рис. 8.8).








Задание. Докажите теоремы 5 и 6.

Задания с решением

 lacktriangle 1. Точки A,B,C,D не лежат в одной плоскости. Докажем, что середины отрезков AD, DC, CB и BA являются вершинами параллелограмма.

Решение:

Пусть M, N, P и Q – середины отрезков AD, DC, CB и BA соответственно (рис. 8.9). Тогда [MQ] – средняя линия треугольника ABD, откуда следует, что $[MQ] \parallel [DB]$, а [NP] – средняя линия треугольника BDC. Следовательно, $[NP] \parallel [DB]$. По теореме 6 [MQ] || [NP]. По аналогии доказываем, что $[MN] \parallel [OP]$. Значит, противолежащие стороны четырехугольника MNPO попарно параллельны, то есть он является параллелограм-MOM.



- а) точки E и F различны;
- б) прямые EF и AD, EF и BC, EF и AC, EF и BD – скрещивающиеся.




Рис. 8.9




Рис. 8.10

Решение:


- а) Из предположения, что точки E и F совпадают, следовало бы, что прямые AB и CD пересекаются в точке E, а это означало бы, что точки A, B, C, D были бы компланарными, что противоречит условию задачи.

Аналогично доказываются и оставшиеся случаи.

Задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. Прямая d пересекает различные прямые d_1 и d_2 . Следует ли отсюда, что прямые d, d_1 и d_2 компланарны?
 - **2.** Прямая a пересекает плоскость α , а прямая b параллельна прямой a. Пересекает ли прямая b плоскость α ?
- **В** 3. *Исследуйте!* Прямые a и b параллельны, а прямая c пересекает прямую b. Определите взаимное расположение прямых a и c.
- С 4. Через вершины параллелограмма проведены четыре параллельные прямые, которые не расположены в плоскости параллелограмма. Докажите, что точки пересечения любой плоскости с этими четырьмя прямыми являются вершинами параллелограмма.



5. *Работайте в парах!* На рисунке изображены параллельные плоскости α и β ($AB \not\parallel DC$).

Выясните взаимное расположение прямых a и b.

Реальный профиль


- А₁ 1. Пусть одна из двух параллельных прямых параллельна плоскости. Докажите, что и вторая прямая параллельна этой плоскости.
 - **2.** Пусть прямая параллельна двум пересекающимся плоскостям. Докажите, что эта прямая параллельна прямой, по которой пересекаются эти плоскости.
- **В**₁ 3. *Исследуйте!* Прямые d_1 и d_2 некомпланарны, а прямая d параллельна прямой d_1 . Каково взаимное расположение прямых d и d_2 ?
 - **4.** M *Сследуйте!* Плоскости α и β пересекаются по прямой d. Точка $A \in \alpha$ и $A \notin d$, точка $B \in \beta$ и $B \notin d$. Каково взаимное расположение прямых d и AB?
- C_1 5. *Исследуйте!* Прямые a и b параллельны, а прямые c и b скрещивающиеся. Каковы возможные взаимные расположения прямых c и a?
 - **6.** Точка A не принадлежит прямой d. Через точку A проведены все прямые некомпланарные с прямой d. Какую фигуру образуют эти прямые?

§3 Прямые и плоскости

Возможны следующие случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве:

- а) прямая имеет единственную общую точку с плоскостью (в этом случае плоскость и прямая *пересекаются*) (рис. 8.11 а));
- б) прямая и плоскость не имеют общих точек (рис. 8.11 б));
 - в) прямая принадлежит плоскости (рис. 8.11 в)).





Определение. Прямая называется **параллельной** плоскости, если она не имеет общих точек с плоскостью или принадлежит этой плоскости.

На рисунках 8.11 б), в), прямая a параллельна плоскости α .

Теорема 7 (признак параллельности прямой и плоскости). Прямая параллельна плоскости тогда и только тогда, когда она параллельна какой-либо прямой, принадлежащей этой плоскости.

Доказательство

Heoбxoдимость. Пусть прямая a ($a \not\subset \beta$) параллельна плоскости β . Возьмем в плоскости β точку A и через нее и прямую a проведем плоскость α (рис. 8.12). Плоскости α и β пересекаются по прямой b. Прямые a и b лежат в плоскости α и параллельны, потому что в противном случае точка их пересечения принадлежала бы и плоскости β , а это противоречит тому, что $a \parallel \beta$.





Рис. 8.12

Достаточность. Пусть прямая a ($a \not\subset \beta$) параллельна прямой b, принадлежащей плоскости β . Тогда прямая a параллельна также и плоскости β . В самом деле, если бы прямая a и плоскость β имели бы общую точку B, то эта точка принадлежала бы линии пересечения плоскостей β и α (α – плоскость, заданная параллельными прямыми a и b) (рис. 8.12), то есть принадлежала бы и прямой b, но это противоречило бы условию, что $a \parallel b$.

Случай $a \subset \beta$ очевиден.



Теорема 8. Если прямая параллельна плоскости, то пересечением этой плоскости с любой другой плоскостью, проходящей через данную прямую, является прямая, параллельная данной прямой (рис. 8.13).



 $(a \parallel \alpha, \ a \not\subset \alpha_i, \ \alpha_i \not\parallel \alpha) \Rightarrow \alpha_i \cap \alpha = a_i \parallel a \quad (i = \overline{1, n}, n \in \mathbb{N}^*)$

Рис. 8.13

Задание. Докажите теорему 8.

Теорема 8' (теорема "крыши").

Пусть прямые d_1 и d_2 параллельны. Если плоскость, содержащая прямую d_1 , пересекает плоскость, содержащую прямую d_2 , по прямой d, то $d \parallel d_1$ и $d \parallel d_2$ (рис. 8.14).




Рис. 8.14

Задания с решением

5 1. Пусть точка E не лежит в плоскости параллелограмма ABCD, а точка F является серединой отрезка AE. Покажем, что прямая FC пересекает плоскость BED в центре тяжести G треугольника BED (рис. 8.15).

Решение:

Рассмотрим плоскость EAC. Точка F и середина O диагонали AC параллелограмма ABCD принадлежат этой плоскости. Следовательно, в этой же плоскости лежит и точка G пересечения медиан CF и EO треугольника EAC. Так как отрезок EO является медианой и треугольника BED, получаем, что $(FC) \cap (BED) = G$.




Рис. 8.15

\cdot 2. Даны некомпланарные точки A, B, C, D. Точки E, F и G являются внутренними точками отрезков AD, DC и BC соответственно такими, что $\frac{DE}{EA} \neq \frac{DF}{FC}$ (рис. 8.16 a)).

Построим пересечения плоскости *EFG* с плоскостями *ADC*, *DBC*, *ABC* и *ABD*.

Решение:

Очевидно, что плоскость EFG пересекает плоскость ADC по прямой EF, а плоскость DBC – по прямой *FG* (рис. 8.16 б)).

Обозначим черезHточку пересечения прямых EFи AC, существование кото-




Рис. 8.16

рой следует из условия $\frac{DE}{EA} \neq \frac{DF}{FC}$. Так как точка H принадлежит плоскости EFG и плоскости ABC, то эти плоскости пересекаются по прямой HG. Пусть $HG \cap AB = L$. Тогда плоскости EFG и ADB пересекаются по прямой EL.

 $\$ 3. Даны пересекающиеся прямые d_1 и d_2 , α – плоскость, определяемая этими прямыми. Прямая d пересекает плоскость α в точке D, которая не принадлежит прямым d_1 и d_2 (рис. 8.17). Найдем множество прямых, которые пересекают все три прямые d, d_1 и d_2 .

Решение:

Пусть O – точка пересечения прямых d_1 и d_2 . Любая прямая, проходящая через точку O и через какую-либо точку A прямой d, удовлетворяет условиям задачи. Также и любая прямая, лежащая в плоскости α , проходящая через точку D и пересекающая обе прямые d_1 и d_2 , удовлетворяет условиям задачи. Других прямых, которые пересекали бы три прямые $d,\ d_{_1}$ и $d_{_2},$ не существует.

4. Скрещивающиеся прямые *a* и *b* пересекают плоскость α в точках A и B соответственно. Через каждую точку M прямой a проведена прямая, параллельная прямой b. Обозначим точку пересечения построенной прямой с плоскостью α через M' (рис. 8.18). Покажем, что при перемещении точки M по прямой a точка M' перемещается по прямой, лежащей в плоскости α и проходящей через точку A.




Рис. 8.17




Рис. 8.18

Решение:

Пусть b' – прямая, проходящая через точку A и параллельная прямой b (она существует и является единственной). Прямые a и b' различны и пересекаются в точке A. Значит, они определяют плоскость. Пусть эта плоскость пересекает плоскость α по прямой с. Прямая с есть искомая прямая.

Задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. Точка M является серединой ребра BD, а точка N серединой ребра AD тетраэдра ABCD. Прямая d является пересечением плоскости ABC с плоскостью MNC. Каково взаимное расположение прямых d и MN?
- **В** 2. *Исследуйте!* Точки A, B, C, D некомпланарны. Точка $E \in AD$ (AE = 2ED), точка $L \in AB$ (AL = 2LB), точка $F \in DC$ (DF = 2FC), точка $M \in CB$ (BM = 2MC). Каково взаимное расположение прямых EL и FM?
- **С 3.** Точки A, B, C неколлинеарны. Плоскость, параллельная прямой AB, пересекает отрезки BC и AC в точках M и N соответственно. Найдите длину отрезка MN, если:
 - а) AB = 30 см и MB : BC = 2 : 3;
- б) AB = 16 см и BM : MC = 5:3;
- в) CM = 20 см и AB : BC = 4 : 5;
- Γ) BM = a, MC = c, AB = b.


Реальный профиль


- **А**₁ **1.** Точки A, B, C, D некомпланарны. На отрезках AB, BC, CD и DA взяты соответственно точки A₁, B₁, C₁ и D₁ так, что AA₁: A₁B=1:3, BB₁: B₁C=3:1, CC₁: C₁D=2:1 и DD₁: D₁A=1:2. Докажите, что точки A₁, B₁, C₁ и D₁ компланарны.
- **В**₁ **2.** *Исследуйте!* Точки A, B, C, D некомпланарны. Точка $M \in AD$, а точка $N \in BD$. Каково взаимное расположение прямой MN и плоскости ABC, если известно, что AM : MD = BN : ND?
- **С**₁ **3.** Точки A, B, C и D некомпланарны. На отрезках AB, BC и CD взяты соответственно точки A_1 , B_1 и C_1 так, что $AA_1: A_1B = a$, $BB_1: B_1C = b$ и $CC_1: C_1D = c$. Плоскость $A_1B_1C_1$ пересекает отрезок AD в точке D_1 . Найдите отношение $DD_1: D_1A$.
 - **4.** Работайте в парах! Точки A, B, C, D некомпланарны. Точка M является центром тяжести треугольника ABD, а точка N центром тяжести треугольника BDC. Докажите, что прямая MN параллельна плоскости ABC.

§4 Параллельные плоскости

Возможны следующие случаи взаимного расположения двух плоскостей в пространстве:


- а) плоскости пересекаются по прямой (рис. 8.19 а));
- б) плоскости не имеют общих точек (рис. 8.19 б));
- в) плоскости совпадают (рис. 8.19 в)).











Определение. Две плоскости называются параллельными, если они не имеют общих точек или совпадают.

Теорема 9 (признак параллельности плоскостей). Если две пересекающиеся прямые одной плоскости параллельны другой плоскости, то эти плоскости параллельны.

Доказательство

Пусть пересекающиеся прямые a и b, принадлежащие плоскости α , параллельны плоскости β (рис. 8.20).

Предположим, что плоскости α и β не параллельны. Тогда они пересекаются по пря-





Рис. 8.20

мой c. По теореме 8, прямые a и b параллельны прямой c, что противоречит аксиоме параллельности, так как получим, что в плоскости α через одну точку проходят две различные прямые a и b, параллельные прямой c, что невозможно. Следовательно, плоскости α и β параллельны.


Теорема 10. Если две параллельные плоскости пересечены третьей плоскостью, то прямые пересечения параллельны (рис. 8.21 a)).

Теорема 11. Отрезки параллельных прямых, заключенные между параллельными плоскостями, конгруэнтны (рис. 8.21 б)).

б)



$$(\alpha \parallel \beta, \ \gamma \cap \alpha = a, \ \gamma \cap \beta = b) \Rightarrow a \parallel b$$



$$(a \parallel b, \alpha \parallel \beta) \Rightarrow [AM] \equiv [BN],$$

 $A, B \in \alpha, M, N \in \beta$

Рис. 8.21

Задание. Докажите теоремы 10 и 11.

Задания с решением

5 1. Отрезок AB не пересекает плоскость α и точки M и N делят его на три отрезка так, что AM:MN=MN:NB=1:2. Через точки A,M,N и B проведены параллельные прямые, которые пересекают плоскость α в точках A_1,M_1,N_1 и B_1 соответственно (рис. 8.22).




Рис. 8.22

Найдем длины отрезков MM_1 и NN_1 , если известно, что $AA_1=2\,\mathrm{cm},\ BB_1=16\,\mathrm{cm}.$

Решение:

Проведем через точку A прямую, параллельную A_1B_1 , которая пересекает прямые MM_1 , NN_1 и BB_1 в точках M_2 , N_2 и B_2 соответственно. Треугольники AM_2M и AB_2B подобны, следовательно, $MM_2:BB_2=AM:AB$.

Поскольку AM:MN=MN:NB=1:2, то AB=7AM. Тогда $MM_2:BB_2=1:7$, $MM_2 = BB_2 : 7 = 14 : 7 = 2$ (cm).

Следовательно, $MM_1 = MM_2 + M_2M_1 = 2 + 2 = 4$ (см).

Аналогично получаем, что $\Delta ANN_2 \sim \Delta ABB_2$.

Тогда NN_2 : $BB_2 = AN$: AB = 3AM: 7AM = 3:7, откуда $NN_2 = \frac{3}{7}BB_2 = 6$ (см). Следовательно, $NN_1 = NN_2 + N_2N = 6 + 2 = 8$ (см).

Omeem: $MM_1 = 4$ cm, $NN_1 = 8$ cm.

 $^{\diamondsuit}$ 2. Точки A_1 , A_2 , A_3 расположены на ребре пирамиды VABC так, что $AA_1 = A_1A_2 = A_2A_3$. Через эти точки проведены плоскости, параллельные основанию пирамиды, которые пересекают ребра VB и VC в точках B_1, B_2, B_3 и C_1, C_2, C_3 соответственно (рис. 8.23). Найдем периметры треугольников $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$, если периметры треугольников ABC и $A_3B_3C_3$ равны \mathscr{P} и \mathscr{P}_3 соответственно.

Решение:

Отрезок A_2B_2 является средней линией трапеции $A_1A_3B_3B_1$, то есть $\mathscr{T}_2 = \frac{\mathscr{T}_1 + \mathscr{T}_3}{2}$ (1), где \mathscr{T}_1 и \mathscr{T}_2 – периметры треугольников $A_1B_1\bar{C}_1$ и $A_2B_2C_2$ соответственно.

Аналогично, $\mathscr{T}_1 = \frac{\mathscr{T} + \mathscr{T}_2}{2}$ (2). Из (1) и (2) получаем:

$$\begin{split} \mathscr{T}_2 &= \frac{2\mathscr{T}_3 + \mathscr{T}}{3}, \quad \mathscr{T}_1 = \frac{2\mathscr{T} + \mathscr{T}_3}{3}. \\ Omsem: \ \mathscr{T}_1 &= \frac{2\mathscr{T} + \mathscr{T}_3}{3}, \quad \mathscr{T}_2 = \frac{2\mathscr{T}_3 + \mathscr{T}}{3}. \end{split}$$




Рис. 8.23

 \S 3. В правильном тетраэдре ABCD через точку $E \in AC$ проведено сечение, параллельное плоскости грани BCD. Найдем площадь сечения, если AE:EC=2:3 и ребро тетраэдра равно a (рис. 8.24).

Решение:

Очевидно, что стороны треугольника FGE параллельны сторонам грани BDC и что треугольник FGEравносторонний. Из $\Delta AEF \sim \Delta ACB$ получаем:

$$\frac{BC}{FE}=\frac{AC}{AE}=\frac{AE+EC}{AE}=1+\frac{EC}{AE},\ \, \frac{BC}{FE}=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2},$$
 откуда $FE=\frac{2a}{5}$.

Тогда
$$\mathcal{A}_{FGE} = \frac{(EF)^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{4a^2 \cdot \sqrt{3}}{25 \cdot 4} = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{25}.$$

Ответ: $\mathcal{A}_{FGE} = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{25}$.





Рис. 8.24

 4^* . Построим сечение прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскостью, проходящей через диагональ BD_1 и точку $M \in (CC_1)$.

Решение:

Очевидно, что двумя сторонами многоугольника искомого сечения являются отрезки BM и MD_1 (рис. 8.25). Точка $\{N\} = CD \cap D_1 M$ принадлежит как плоскости ABC, так и искомой плоскости сечения. Следовательно, точка $\{P\} = BN \cap AD$ принадлежит как плоскости ADD_1 , так и искомой плоскости сечения. Точка $\{L\} = AA_1 \cap PD_1$ является четвертой вершиной искомого многоугольника.




Ответ: Искомым сечением является четырехугольник BLD_1M .

Задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. Точки A, B, C, D некомпланарны. Точки M, N, P середины отрезков AD, BD и CD соответственно. Докажите, что плоскости MNP и ABC параллельны.
- - а) Докажите, что плоскости MNL и ABC параллельны.
 - б) Постройте точку I_1 пересечения прямой PM с плоскостью ABC.
 - в) Постройте точку I_2 пересечения прямой PN с плоскостью ABC.
 - г) Постройте пересечение плоскостей АВС и РМЛ.
- С 3. Точки A_1 , A_2 , A_3 , A_4 лежат на боковом ребре AV пирамиды VABC так, что $[AA_4] \equiv [A_4A_3] \equiv [A_3A_2] \equiv [A_2A_1]$. Через эти точки проведены плоскости, параллельные плоскости основания пирамиды, которые пересекают ребра VB и VC в точках B_1 , B_2 , B_3 , B_4 и C_1 , C_2 , C_3 , C_4 соответственно. Вычислите периметры треугольников, полученных в сечениях, если периметр треугольника $A_1B_1C_1$ равен 5 см, а периметр треугольника ABC равен 40 см.



- 4. Работайте в группах! Проект Приложения элементов параллельности прямых и плоскостей в строениях родного села/города.
- 5. Практическая работа. Выявление отношений параллельности в школьном дворе.

Реальный профиль

A₁ **1.** Тетраэдр ABCD пересечен плоскостью, проходящей через точку $M \in [AD]$ и параллельной плоскости основания ABC. Найдите периметр многоугольника, полученного в сечении, если AM = 5 см, AD = 15 см, AB = 20 см, BC = 19 см, AC = 18 см.

- ${f B_1}$ 2. Пусть ABCD выпуклый четырехугольник и точка E, не лежащая в плоскости четырехугольника ABCD. Точки M, N, P являются точками пересечения медиан треугольников ABE, BCE и CDE соответственно. Докажите, что плоскость MNP проходит через точку Q пересечения медиан треугольника ADE.
- **С**₁ 3. Треугольная прямая призма $ABCA_1B_1C_1$ пересечена плоскостью, проходящей через точку $M \in [AA_1]$ и параллельной прямым AB_1 и AC_1 . Найдите периметр многоугольника, полученного в сечении, если AM = 1 см, $AA_1 = 3$ см, AB = AC = 4 см, BC = 2 см.
 - **4.** На ребре VA треугольной пирамиды VABC взяты точки A_1 , A_2 , A_3 такие, что $A_1A_2=2AA_1$ и $A_2A_3=2A_1A_2$. Через эти точки проведены плоскости, параллельные плоскости основания пирамиды, которые пересекают ребро VB в точках B_1 , B_2 , B_3 , а ребро VC в точках C_1 , C_2 , C_3 . Найдите периметры \mathscr{P}_1 , \mathscr{P}_2 и \mathscr{P}_3 треугольников $A_1B_1C_1$, $A_2B_2C_2$ и $A_3B_3C_3$ соответственно, если периметр треугольника ABC равен \mathscr{P}_3 , а $AA_1:VA_3=\lambda$.
 - **5.** Работайте в парах! Пусть ABCD выпуклый четырехугольник и точка E, не лежащая в плоскости четырехугольника ABCD. Точки M, N, P, R лежат на отрезках AE, BE, CE, DE соответственно так, что 2AM = 3ME, 2BN = 3NE, 2CP = 3PE, 3DR = 2RE.
 - а) Докажите, что плоскость MNP параллельна плоскости четырехугольника ABCD. 6) Постройте точку I пересечения прямой NR с плоскостью четырехугольника ABCD.
 - 6. Работайте в группах! Проект Приложения элементов параллельности прямых и плоскостей в строениях родного села/города.
 - 7. Практическая работа. Выявление отношений параллельности в школьном дворе.

Задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **A** 1. Отрезок AB не пересекает плоскость α . Через концы отрезка и его середину, точку M, проведены параллельные прямые, которые пересекают плоскость α в точках A_1 , B_1 и M_1 соответственно. Найдите длину отрезка MM_1 , если:

 а) $AA_1 = 3.2$ м, $BB_1 = 2.3$ дм; б) $AA_1 = 19$ см, $BB_1 = 2$ дм; в) $AA_1 = 33$ см, $BB_1 = 75$ см.
 - **2.** Отрезок AB не пересекает плоскость α и делится точками M и N на три конгруэнтных отрезка: AM, MN, NB. Через точки A, B, M, N проведены параллельные прямые, которые пересекают плоскость α в точках A_1 , B_1 , M_1 и N_1 соответственно. Найдите длины отрезков MM_1 и NN_1 , если известно, что $AA_1 = 16$ см, $BB_1 = 4$ см.
- **В** 3. Плоскости α , β параллельны, а точка M такая, что она и плоскость β находятся в разных полупространствах, определяемых плоскостью α . Через точку M построены две прямые, которые пересекают плоскость α в точках A_1 и A_2 , а плоскость β в точках B_1 и B_2 . Найдите длину отрезка A_1A_2 , если $B_1B_2 = 20$ см и $MA_1:A_1B_1 = 3:2$.

Реальный профиль

A₁ 1. Через точку O, не лежащую ни в одной из двух параллельных плоскостей α и β , проведены прямые a_1 , a_2 , a_3 и a_4 , которые пересекают плоскость α в точках A_1 , A_2 , A_3 и A_4 соответственно, а плоскость β – в точках B_1 , B_2 , B_3 и B_4 соответственно.

Докажите, что
$$\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = \frac{A_2A_3}{B_2B_3} = \frac{A_3A_4}{B_3B_4} = \frac{OA_1}{OB_1} = \frac{OA_2}{OB_2} = \frac{OA_3}{OB_3} = \frac{OA_4}{OB_4}$$
.

- 2. Докажите, что если любая прямая, которая пересекает одну из двух плоскостей, пересекает и другую плоскость, то эти плоскости параллельны.
- 3. Прямая пересекает плоскость α в точке A. Через точки B и C заданной прямой (В находится между А и С), лежащих в одном и том же полупространстве, ограниченном плоскостью α , проведены две параллельные прямые, которые пересекают плоскость α в точках B_1 и C_1 соответственно. Найдите длину отрезка BB_1 , если:


a)
$$CC_1 = a$$
 if $AC:BC = \lambda;$ 6) $CC_1 = a$ if $AB:AC = \mu;$ 8) $AB = l$ if $AC:CC_1 = k;$ 7) $AC = a$, $BC = b$, $CC_1 = c$.


б)
$$CC_1 = a$$
 и $AB : AC = \mu$;

в)
$$AB = l$$
 и $AC : CC_1 = k$


$$C = a$$
, $BC = b$, $CC_1 = c$

- 4. \bigcirc Работайте в парах! Точки A, B, C, D некомпланарны и AC = 12 см, BD = 20 см. Вычислите периметр четырехугольника, вершинами которого являются середины отрезков AB, BC, CD, DA.
- 5. Точка E не принадлежит плоскости трапеции ABCD ($BC \parallel AD$). Точки M и L середины сторон AB и CD трапеции, а точки N и P – середины отрезков BE и CE. Докажите, что прямые MN и PL пересекаются.
- **6.** Точки A, B, C, D некомпланарны. На отрезках AC и BC взяты соответственно точки M и N такие, что AM:MC=BN:NC=m:n. Найдите длину отрезка, заданного серединами отрезков AD и BD, если MN = a.
- 7. Правильный тетраэдр ABCD пересечен плоскостью, которая проходит через вершину A и середины ребер BD и CD. Найдите площадь полученного сечения, если длина ребра тетраэдра равна 2а.
- В 8. Любая пара прямых из трех данных некомпланарных прямых имеет общую точку. Докажите, что данные прямые имеют общую точку.
 - 9. Плоскости α и β пересекаются по прямой a. Точки Aи B лежат в плоскости α , а точка C – в плоскости β . Постройте прямые, по которым плоскость АВС пересекает плоскости α и β .
 - **10.** Точка E не лежит в плоскости параллелограмма ABCD. Докажите, что плоскости ABE и CDE пересекаются по прямой, которая параллельна прямой DC.
 - 11. Через точку E, не лежащую в плоскости α , проведены прямые a и b, которые пересекают плоскость α в точках A и B соответственно. Точка D принадлежит прямой a, а точка C – прямой b. Постройте точку пересечения прямой DC с плоскостью α .







- **12.** Даны некомпланарные точки A, B, C и D. Пусть прямая a проходит через середины отрезков AB и DC, прямая b проходит через середины отрезков AD и BC, а прямая c проходит через середины отрезков AC и DB. Докажите, что прямые a, b и c имеют общую точку.
- 13. Плоскости α и β пересекаются по прямой c. Эти плоскости пересекают плоскость γ по прямым a и b соответственно. Точка A лежит в плоскости α , а точка B в плоскости β , $AB \not \parallel \gamma$. Постройте точку пересечения прямой AB с плоскостью γ .



- **14.** Выпуклый четырехугольник ABCD лежит в плоскости α . Пусть противолежащие стороны этого четырехугольника не параллельны. Точка E не лежит в плоскости α . Постройте пересечение плоскостей:
 - a) *EAB* и *EDC*;
- б) *EAD* и *EBC*;
- в) EAC и EBD.
- \mathbb{C}_1 15. При реконструкции крыши жилого дома было принято решение построить мансарду. Стропила AF, BF, CE и DE нужно отпилить в точках A_1 , B_1 , C_1 и D_1 так, чтобы плоскость прямоугольника $A_1B_1C_1D_1$ была параллельна плоскости потолка (рис. а)). Отпиленные концы стропил опираются на углы стен мансарды (рис. б)). На каком расстоянии от вершин углов должны быть отпилены стропила, чтобы ширина мансарды по внешней стороне была 9 м, если известно, что ширина потолка 12 м, а длина стропил 8 м?





- **16.** Точки A, B, C и D не лежат в одной плоскости. Точка M принадлежит отрезку DC. Постройте прямые, по которым пересекаются плоскости ADC, CBD, ABC и ABD с плоскостью, проходящей через точки M и A и параллельной прямой BD.
- 17. Точки A, B, C и D не лежат в одной плоскости, а точка E принадлежит отрезку AC так, что AE: EC = 3:2. Постройте прямые, по которым пересекаются плоскости ADC, ADB, ABC с плоскостью, проходящей через точку E и параллельной плоскости BCD.
- **18.** Даны некомпланарные точки A, B, C и D. Точка M середина отрезка AD, а точка G пересечение медиан треугольника ABC.
 - а) Постройте точку F пересечения прямой MG и плоскости BCD.
 - б) Докажите, что точки B, D, C, F вершины параллелограмма.
- **19.** Точки A, B, C и D не лежат в одной плоскости. Точки E, F и H лежат на прямых AD, DC и BC соответственно, так что $EF \not \parallel AC$ и $FH \not \parallel DB$. Постройте точки пересечения плоскости EFH с прямыми AB и DB.
- **20.** *Исследуйте!* Точки *A*, *B*, *C* и *D* не лежат в одной плоскости. Определите, сколько плоскостей, равноудаленных от этих точек, можно провести.

Итоговый тест

Время выполнения работы: 45 минут

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- 1. Через две различные точки A и B, принадлежащие одной из двух параллельных плоскостей, проведены параллельные прямые, которые пересекают другую плоскость в точках A_1 и B_1 соответственно. Найдите длину отрезка A_1B_2 , если AB=8 см.
- **2.** Укажите на изображении куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$:

7

7

6

4

- а) прямые, параллельные плоскости ВСД и не принадлежащие этой плоскости;
- б) плоскости, параллельные прямой A_1B_1 .
- **3.** Точка M является серединой ребра AD правильного тетраэдра ABCD, длина ребра которого равна a. Найдите периметр треугольника MNC, где N точка пересечения прямой BD с плоскостью, проходящей через прямую MC параллельно прямой AB.
- **4.** Параллелограммы ABCD и ABB_1A_1 лежат в разных плоскостях. Вычислите длину отрезка B_1C , если $A_1D=8$ см.

Схема опенивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	24–23	22–21	20–18	17–15	14–12	11-8	7–6	5–4	3–2	1-0

Время выполнения работы: 45 минут

Реальный профиль

1. Прямая a параллельна плоскости α , а прямая b пересекает эту плоскость. Установите взаимное расположение прямых a и b. **⑤**

2. Точки A, B, C, D некомпланарны. Установите взаимное расположение плоскости ABC и прямой:

7

- а) EF, где E середина отрезка AD, F середина отрезка BD;
- б) GH, где G лежит на отрезке BD, H лежит на отрезке CD и $\frac{BG}{GD} = \frac{CH}{HD} = \frac{1}{3}$.
- **3.** Точка E принадлежит ребру SD пирамиды SABCD. Нарисуйте сечение этой пирамиды, образованное плоскостью, проходящей через точку E и параллельной плоскости основания пирамиды.

3

4. Постройте сечение правильного тетраэдра ABCD с плоскостью, проходящей через точку $E \in (AD)$ так, что AE : ED = 1:2, и параллельную плоскости основания ABC. Вычислите площадь полученного сечения, если площадь одной грани тетраэдра равна \mathcal{A} .


8

Схема оценивания теста


Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	24–23	21–20	19–17	16–14	13–11	10-8	7–6	5–4	3–2	1-0

Взаимное расположение прямых и плоскостей


1. Взаимное расположение двух прямых



2. Взаимное расположение прямой и плоскости



3. Взаимное расположение двух плоскостей



Модуль



Перпенцикулярность в пространстве

Цели

- распознавание, описание, построение перпендикулярных прямых и прямой, перпендикулярной плоскости;
- вычисление длин отрезков, измерение двугранных углов с применением теоремы о трех перпендикулярах;
- □ использование признаков перпендикулярности двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей в реальных и/или смоделированных ситуациях;
- распознавание, описание и построение ортогональных проекций точек, отрезков и прямых на плоскости;
- ⇒ вычисление длин ортогональных проекций отрезков;
- применение перпендикулярности в пространстве для изучения и описания процессов, явлений из различных областей.

§1 Перпендикулярные прямые и плоскости

Лемма. Два угла с соответственно параллельными сторонами конгруэнтны или дополняют друг друга до 180° (рис. 9.1 а)).

Доказательство

Пусть AMB и $A_1M_1B_1$ — два собственных угла, причем $[MA \parallel [M_1A_1, [MB \parallel [M_1B_1, MA = M_1A_1 \text{ и } MB = M_1B_1$. Рассмотрим случай, когда точка A_1 лежит в полуплоскости, заданной прямой MM_1 и точкой A, а точка B_1 лежит в полуплоскости, заданной прямой MM_1 и точкой B (рис. 9.1 в)). При этих условиях MAA_1M_1 и MBB_1M_1 являются параллелограммами, то есть $MM_1 = AA_1 = BB_1$. Следовательно, ABB_1A_1 является параллелограммом и $AB = A_1B_1$. Заключение леммы следует из конгруэнтности треугольников AMB и $A_1M_1B_1$.




Рис. 9.1

Полученный результат позволяет рассматривать угол между двумя скрещивающимися прямыми. Назовем *углом между скрещивающимися прямыми* a и b такой угол BMA, в котором M – произвольная точка пространства, $MB \parallel b$, $MA \parallel a$ и $m(\angle BMA) \in [0^{\circ}, 180^{\circ}]$ (рис. 9.1 a), б)).

Определение. Прямые a и b в пространстве называются перпендикулярными, если величина угла между ними равна 90° (рис. 9.2).





Рис. 9.2

Обозначают: $a \perp b$.


Нетрудно заметить, что в кубе, изображенном на рисунке 9.3, прямые AA_1 и BC перпендикулярны. Прямые AD_1 и CB_1 также перпендикулярны.

В предыдущем модуле мы установили, что прямая и плоскость в пространстве либо параллельны, либо пересекаются.



Определения. • Прямая называется перпендикулярной плоскости, если она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости. В этом случае еще говорят, что плоскость перпендикулярна прямой.

• Прямая, которая не перпендикулярна плоскости и не параллельна этой плоскости, называется **наклонной** к этой плоскости (рис. 9.4).



На рисунке 9.4 прямая AO перпендикулярна плоскости α , а прямые AB, AC, AD являются наклонными к этой плоскости.

Теорема 1. Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в одной плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.

Доказательство

Пусть прямые a и b, лежащие в плоскости α , пересекаются в точке O, и прямая c перпендикулярна прямым a и b (рис. 9.5). Докажем, что прямая c перпендикулярна любой прямой d, лежащей в плоскости α .

В силу определения угла между двумя прямыми в пространстве можно предположить, что прямые c и d проходят через точку O. Возьмем на прямых a и b две произвольные точки A и B соответ-




Рис. 9.5

ственно, отличные от O, так, чтобы прямая d пересекала отрезок AB в точке D. На прямой c возьмем точки C и C' такие, что $[OC'] \equiv [CO]$ (рис. 9.5).

Поскольку $\Delta COA \equiv \Delta C'OA$ и $\Delta COB \equiv \Delta C'OB$ (как прямоугольные треугольники с соответствующими конгруэнтными катетами), то $[AC] \equiv [AC']$ и $[BC] \equiv [BC']$. Следовательно, $\Delta ACB \equiv \Delta AC'B$ и $\angle CAB \equiv \angle C'AB$. По признаку СУС устанавливаем, что $\Delta CAD \equiv \Delta C'AD$, откуда следует, что треугольник CDC' – равнобедренный. Отрезок DO является медианой треугольника CDC', проведенной к его основанию, поэтому [DO] является и высотой, то есть $c \perp d$.

Существование и единственность плоскости, проходящей через данную точку прямой и перпендикулярной этой прямой, следуют из следующей теоремы.

Теорема 2. Через любую точку данной прямой проходит плоскость, перпендикулярная этой прямой, и притом только одна.

Задание. Докажите теорему 2.

Задание с решением

 $\$ Докажем, что через произвольную точку A, не лежащую на данной прямой a, проходит плоскость, перпендикулярная прямой a, и притом только одна.

Решение:

В плоскости α , заданной прямой a и точкой A, проводим прямую AA' перпендикулярно прямой a (рис. 9.6). Согласно аксиоме ΠP_1 (модуль 8), существует точка B, не лежащая в плоскости α , которая вместе с прямой a задает плоскость β . В плоскост




Рис. 9.6

ти β через точку A' проводим прямую A'C, перпендикулярную прямой a. Плоскость, проходящая через точки A, A', C, является искомой плоскостью.

Единственность плоскости α можно доказать при помощи теоремы 2.

Теорема 3. Каковы бы ни были плоскость и точка, существует одна и только одна прямая, проходящая через данную точку и перпендикулярная данной плоскости.

Перечислим некоторые свойства перпендикулярности прямых и плоскостей.

Теорема 4. Если плоскость перпендикулярна одной из двух параллельных прямых, то она перпендикулярна и другой прямой (рис. 9.7 а)).

Теорема 5. Если две прямые перпендикулярны одной и той же плоскости, то они параллельны (рис. 9.7 б)).




Рис. 9.7

Задание. Докажите теоремы 4 и 5.

Задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. Прямоугольники *CDAB* и *CDEF* имеют общую сторону и их плоскости различны. Докажите, что $CD \perp BF$.
 - **2.** Треугольники CAD и BAD, где $\operatorname{m}(\angle A) = 90^\circ$, имеют общий катет и их плоскости различны. Докажите, что AD перпендикулярна прямой MN, где M середина отрезка CD, а N середина отрезка BD.
- **В** 3. Несущая прямая отрезка AB длиной 5 см перпендикулярна плоскости α и пересекает ее в точке C. Точка D плоскости α такая, что AD = 3 см, BD = 4 см. Найдите длину отрезка CD.
 - **4.** Из вершины A квадрата ABCD перпендикулярно к его плоскости проведена прямая AM. Найдите MB, MD и MC, если AB = 4 см, MA = 3 см.
 - **5.** Работайте в парах! Из вершины A острого угла прямоугольного треугольника ACB перпендикулярно к его плоскости проведена прямая AE. Найдите гипотенузу AB, если AE = CB = a, EC = b.
- **C** 6. Из вершины A прямоугольника ABCD перпендикулярно к его плоскости проведена прямая AE так, что AE = 4 см. Найдите DE, CE, BE и расстояние d от точки E до прямой BD, если AB = 6 см и AD = 4 см.

Реальный профиль

- **А**₁ **1.** Расстояния от точек A и B, расположенных по разные стороны от плоскости α , до этой плоскости равны a и b соответственно. Найдите длину отрезка AB, если $A_1B_1=c$, где A_1 , $B_1\in\alpha$ и $AA_1\bot\alpha$, $BB_1\bot\alpha$.
 - **2.** Точка D, $D \notin (ABC)$, равноудалена от вершин равнобедренного треугольника ABC (AB = AC). Найдите расстояние DE, где $DE \perp (ABC)$, $E \in (ABC)$, если BC = a, AD = b, $m(\angle CAB) = \alpha$.
- **В**₁ **3.** Точка *M* равноудалена от вершин многоугольника *ABCDE*. Докажите, что отрезки *OA*, *OB*, *OC*, *OD* и *OE* конгруэнтны, где $MO\bot(ABC)$, $O\in(ABC)$.
 - **4.** Точка *E*, не принадлежащая плоскости прямоугольника *ABCD*, равноудалена от вершин прямоугольника. Докажите, что прямая, проходящая через точку *O* пересечения диагоналей прямоугольника *ABCD* и точку *E*, перпендикулярна плоскости прямоугольника *ABCD*.
- **C**₁ **5.** Пработайте в парах! Из вершины A параллелограмма ABCD перпендикулярно к его плоскости проведена прямая AE так, что AE = c. Найдите BE, CE, DE, если AB = a, AD = b и $m(\angle BAD) = \alpha$.
 - **6.** Прямые d_1 и d_2 пересекаются в точке A. Через точку A проходят плоскости α и β так, что $d_1 \perp \alpha$, $d_2 \perp \beta$. Докажите, что прямая пересечения плоскостей α и β перпендикулярна плоскости, определяемой прямыми d_1 и d_2 .

§ 2 Ортогональные проекции.

Угол между прямой и плоскостью

Определение. Ортогональной проекцией точки M на плоскость α называется точка M_1 пересечения данной плоскости и прямой, проходящей через точку M перпендикулярно этой плоскости (рис. 9.8 а)).





Рис. 9.8

Ортогональная (прямоугольная) проекция геометрической фигуры F на плоскость – это множество F_1 ортогональных проекций всех точек данной фигуры на эту плоскость (рис. 9.8 б)).

Пусть даны прямая a и точка M. Известно, что существует единственная плоскость α , которая проходит через точку M и перпендикулярна прямой a. Обозначим точку пересечения прямой a и плоскости α через M_+ (рис. 9.9 a), б)).



Определение. Точка M_1 называется **ортогональной проекцией** точки M на прямую a, а длина отрезка MM_1 называется **расстоянием** от точки M до прямой a (рис. 9.9).

Замечание. В дальнейшем под проекцией будем подразумевать ортогональную проекцию.

Теорема 6. Проекцией прямой на плоскость является прямая или точка.


Доказательство

Если прямая a перпендикулярна плоскости α , то ее проекция совпадает с точкой пересечения прямой a и плоскости α .

Рассмотрим случай, когда прямая a не перпендикулярна плоскости α (рис. 9.10).

Отметим на прямой a две различные точки A и B и обозначим через A, и B, их проекции на плоскость α .

Согласно теореме 5, прямые AA_1 и BB_1 параллельны. Следовательно, они задают некоторую плоскость β .




Прямые a и $a_1=A_1B_1$ принадлежат плоскости β . Для любой точки $C\in a$, точка $C_1=pr_\alpha C$ принадлежит плоскости β ($CC_1\parallel AA_1$ и $C\in a\subset \beta$). Таким образом, C_1 лежит на прямой пересечения плоскостей α и β , то есть, на прямой A_1B_1 . Это и доказывает, что проекция любой точки прямой a является точкой, лежащей на прямой a_1 , то есть, $pr_\alpha a=a_1$.

Теорема 7 (теорема о трех перпендикулярах). Если проекция a_1 на плоскость α наклонной a перпендикулярна прямой b, лежащей в плоскости α , то и прямая a перпендикулярна прямой b.

Доказательство

Пусть прямая AA_1 перпендикулярна плоскости $a, A \in a, A_1 \in \alpha$. Тогда $AA_1 \perp b \subset \alpha$ (рис. 9.11). Из условия теоремы следует, что прямая b перпендикулярна прямой a_1 , то есть прямая b перпендикулярна и прямой AA_1 , и прямой BA_1 , откуда следует, что прямая b перпендикулярна плоскости, проходящей через точки A, B, A_1 . Следовательно, прямая b перпендикулярна и прямой AB = a, лежащей в этой плоскости.




Теорема 8 (обратная теореме 7). Если прямая a перпендикулярна прямой b, лежащей в плоскости α , и не перпендикулярна этой плоскости, то проекция a_1 на плоскости α прямой a перпендикулярна прямой b.

Доказательство

Прямая AA_1 (рис. 9.11) перпендикулярна плоскости a. Следовательно, $AA_1 \perp b \subset \alpha$ и из условия теоремы следует, что $AB \perp b$, то есть прямая b перпендикулярна плоскости ABA_1 . Значит, прямая b перпендикулярна прямой $a_1 = BA_1 = pr_a a$.

Пусть даны плоскость α и не лежащая на ней точка A (рис. 9.12).

Определения. • Перпендикуляром, опущенным из точки A на плоскость α , называется отрезок, соединяющий точку A с точкой плоскости α , лежащей на прямой, перпендикулярной плоскости α . Конец этого отрезка называется основанием перпендикуляра.



• Наклонной, проведенной из точки A, к плоскости α называется любой отрезок, соединяющий точку A с точкой плоскости α , не являющейся перпендикуляром к плоскости α . Конец отрезка, лежащий в плоскости, называется основанием наклонной (рис. 9.12).

Теорема 9. Пусть α – плоскость, A – точка, не лежащая в плоскости α , B – точка, лежащая в плоскости α , и $A_1 = pr_{\alpha}A$. Тогда $AA_1 \le AB$ (рис. 9.12).


Доказательство

Действительно, отрезок AA_1 перпендикулярен плоскости a, следовательно, и отрезку BA_1 . Значит, треугольник AA_1B — прямоугольный с прямым углом A_1 , откуда следует, что $AA_1 \le AB$, причем равенство имеет место, если B совпадает с A_1 $(AB \perp \alpha)$.

Определение. Расстоянием от точки до плоскости называется длина отрезка, соединяющего данную точку и ее проекцию на эту плоскость.

На рисунке 9.12 длина отрезка AA_1 является расстоянием от точки A до плоскости α .

Теорема 10. Если в треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ справедливы соотношения $AB \equiv A_1B_1$, $AC \equiv A_1C_1$ и $BC > B_1C_1$, то $m(\angle BAC) > m(\angle B_1A_1C_1)$ (рис. 9.13).




Если прямая не перпендикулярна плоскости, оправданно следующее определение:

Определение. Углом между наклонной и плоскостью называется острый угол между наклонной и ее проекцией на эту плоскость.

На рисунке 9.14, угол φ – это угол между наклонной a и плоскостью α .

Замечание. Углом между отрезком и плоскостью называется угол между несущей прямой этого отрезка и данной плоскостью.




Теорема 11. Длина проекции отрезка на плоскость равна произведению длины этого отрезка на косинус угла между отрезком и плоскостью.

Доказательство

Рассмотрим отрезок AB, плоскость α , $[AB] \not \mid \alpha$, проекции A_1 и B_1 на плоскость α точек A и B соответственно и точку D пересечения прямой AB с плоскостью α (рис. 9.15).

Пусть C – точка пересечения прямой BB_1 с прямой, проходящей через точку A и параллельной прямой A_1B_1 .

Треугольник ABC – прямоугольный с прямым углом C и $m(\angle BAC) = m(\angle ADA_1) = \varphi$. Таким образом, из треугольника ABC имеем $AC = AB\cos\varphi$ и, так как $AC = A_1B_1$, то $A_1B_1 = AB\cos\varphi$.



255

Пусть точки A и B расположены по разные стороны от плоскости α (рис. 9.16).

Тогда $A_1B_1 = A_1D + DB_1$, а из треугольников AA_1D и BB_1D имеем


$$A_1D = AD\cos\varphi$$
, $DB_1 = DB\cos\varphi$.

Тогда

$$A_1B_1 = AD\cos\varphi + DB\cos\varphi =$$

= $(AD + DB)\cos\varphi = AB\cos\varphi$.

Оставшиеся случаи ([AB] $\parallel \alpha$, ...) очевидны.




Задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. Отрезок A_1B_1 является проекцией отрезка AB на плоскость α . Найдите:
 - а) длину отрезка A_1B_1 , если $AA_1 = 9$ см, $BB_1 = 13$ см, AB = 5 см;
 - б) косинус угла между отрезком AB и плоскостью α .
 - 2. Работайте в парах! Из точки, не лежащей в некоторой плоскости, построены две наклонные длиной в 30 см и 25 см. Разность длин их проекций равна 11 см. Найдите расстояние от точки до плоскости.
- **В** 3. Балка установлена на двух столбах, высота которых 3 м и 5 м. Вычислите расстояние от пола до точки, делящей длину балки в отношении 2:3, считая от нижней точки балки.
 - **4.** (БАК, 2011) На рисунке изображен куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$.

Постройте ортогональную проекцию отрезка BD_1 на плоскость (ABB_1) .




- **С** 5. Расстояние от точки A до плоскости α равно 3 см. Длины наклонных AC и AB $(C, B \in \alpha)$ к плоскости α равны 6 см. Точка M середина отрезка CB, а $A_1 = pr_{\alpha}A$. Найдите длину отрезка A_1M , если:
 - a) $m(\angle CAB) = 90^{\circ}$;
- 6) $m(\angle CAB) = 60^{\circ}$.
- 6. Расстояния от точек A и B, которые расположены в одном полупространстве, ограниченном плоскостью α , до этой плоскости равны a и b соответственно. Найдите длину отрезка AB, если $A_1B_1=c$, где A_1 и B_1 точки пересечения перпендикуляров, проведенных из точек A и соответственно B на плоскость α .


Реальный профиль

A₁ **1.** (БАК, 2013) Заполните рамку так, чтобы полученное высказывание было истинным.

"Длина ребра куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равна 2 см. Тогда расстояние от вершины B_1 до плоскости (AA_1C) равно см".





- **В**₁ **2.** а) Если, преодолев расстояние 100 метров по горизонтали, мы поднимемся на высоту 15 м, то уклон дороги составит 15%. Найдите угол α .
 - б) Какой угол соответствует 100% уклону?





- 3. Найдите высоту телевизионного ретранслятора, если рост наблюдателя, находящегося в горизонтальной плоскости на расстоянии 50 м от основания ретранслятора, составляет 1,65 м, а угол *ABC*, образованный горизонтальной полупрямой *BC* и полупрямой *BA*, ориентированной от глаз наблюдателя до вершины ретранслятора, равен 37,8°.
- 4. Угол наклона горы 30°. Под каким углом к подножию горы (см. рисунок) должна быть построена прямолинейная дорога *АВ*, чтобы угол ее наклона к плоскости горизонта был равен 15°? (Угол наклона это линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью горы и горизонтальной плоскостью.)





- **5.** Точка D находится на расстоянии 9 см от вершин треугольника ABC, прямоугольного в точке C, AC = 8 см, BC = 6 см. Найдите расстояние DE, где $DE \perp (ABC)$, $E \in (ABC)$.
- **C**₁ **6.** Полупрямая [*OC* образует с полупрямыми [*OA* и [*OB* конгруэнтные углы. Найдите длину проекции отрезка *OC* на плоскость AOB, если $m(\angle AOC) = m(\angle BOC) = \alpha$, $m(\angle AOB) = 2\beta$, и OC = c.

§ 3 Угол между двумя плоскостями

Напомним, что любая прямая a, лежащая в плоскости α , делит множество точек плоскости, не лежащих на прямой a, на два подмножества α_1 и α_2 , которые называются *открытыми полуплоскостями*. В этом случае говорят, что прямая a задает полуплоскости α_1 и α_2 . Объединение открытой полуплоскости и прямой, задающей ее, называется *замкнутой полуплоскостыю*. Плоскость α называется *несущей плоскостыю* полуплоскостей α_1 и α_2 .

Определение. Объединение двух замкнутых полуплоскостей, заданных одной и той же прямой, называется двугранным углом (рис. 9.17).

Двугранный угол полуплоскостей α_1 , β_1 обозначается $\angle(\alpha_1\beta_1)$.

Прямая a называется ребром двугранного угла $\angle(\alpha_1\beta_1)$, а полуплоскости α_1 и β_1 называются гранями двугранного угла.

Если полуплоскости α_1 и β_1 совпадают, то двугранный угол между полуплоскостями α_1 и β_1 называется **нулевым**.

Если полуплоскости α_1 и β_1 имеют одну и ту же несущую плоскость и их объединение совпадает с несущей плоскостью, то двугранный угол называется *развернутым*.

Двугранным собственным углом называется двугранный угол, отличный от нулевого и развернутого.

Внутренней областью двугранного собственного угла называется пересечение полупространства, заданного несущей плоскостью полуплоскости α_1 , содержащей полуплоскость β_1 , с полупространством, заданным несущей плоскостью полуплоскости β_1 , содержащей полуплоскость α_1 .

Пусть $\angle(\alpha_1\beta_1)$ – двугранный собственный угол и A – произвольная точка на его ребре m. Из точки A в каждой из его граней α_1 и β_1 проводим полупрямые a и b, перпендикулярные ребру m (рис. 9.18 а)). Таким образом, получили угол с вершиной в точке A, сторонами которого являются полупрямые [AB] и [AC] ($C \in b$, $B \in a$).

Этот угол можно получить и как пересечение двугранного угла $\angle(\alpha_1\beta_1)$ с плоскостью γ , перпендикулярной его ребру m и проходящей через точку A (рис. 9.18 б)).




Рис. 9.18




Рис. 9.17

Определение. Пересечение двугранного угла плоскостью, перпендикулярной его ребру, называется линейным углом (плоским углом) двугранного угла.

Можно доказать, что все линейные углы одного и того же двугранного угла конгруэнтны.

Определение. Величиной двугранного угла называется величина его линейного угла.

Возвращаясь к рисунку 9.18 а), запишем: $m(\angle(\alpha_1\beta_1)) = m(\angle BAC)$.

Определения. • Полуплоскости α_1 и β_1 называются перпендикулярными, если $m(\angle(\alpha_1\beta_1)) = 90^\circ$.

• В этом случае соответствующие несущие плоскости α и β называются перпендикулярными плоскостями.

Обозначают: $\alpha_1 \perp \beta_1$, соответственно $\alpha \perp \beta$.

Теорема 12. Две плоскости перпендикулярны тогда и только тогда, когда одна из них содержит прямую, перпендикулярную другой плоскости.

Доказательство

Необходимость. Если две плоскости перпендикулярны, то несущая прямая любой стороны линейного угла перпендикулярна плоскости, которая ее не содержит.

Достаточность. Пусть плоскость α проходит через прямую a, перпендикулярную плоскости β (рис. 9.19).

Плоскости α и β пересекаются по прямой c, а прямые a и c пересекаются в точке A.

В плоскости β через точку A проводим прямую b, перпендикулярную прямой c. Устанавли-




Рис. 9.19

ваем, что угол BAC является линейным углом двугранного угла между плоскостями α и β . Поскольку $a\perp \beta$, то $a\perp b$. Значит, $m(\angle(\alpha\beta))=90^\circ$, откуда $\alpha\perp\beta$.

Теорема 13. Если φ – величина двугранного угла между плоскостью треугольника ABC и плоскостью α , \mathcal{A}_{Δ} – площадь треугольника ABC, $\mathcal{A}_{pr_{\alpha}\Delta}$ – площадь проекции треугольника ABC на плоскость α , $\mathcal{A}_{pr_{\alpha}\Delta} = \mathcal{A}_{\Delta} \cdot \cos \varphi$ (рис. 9.20).




Рис. 9.20

Задания с решением

5 1. Дан равнобедренный треугольник ABC, у которого AB = BC = 8 см и AC = 5 см. Через вершины A и B перпендикулярно к плоскости ABC проводим прямые AA_1 и BB_1 так, что A_1 и B_1 лежат в одном и том же полупространстве, ограниченном плоскостью ABC, причем $AA_1 = 12$ см и $BB_1 = 6$ см (рис. 9.21). Найдем:

- а) CD_1 , где D_1 середина отрезка A_1B_1 ;
- б) расстояние от точки C до прямой A_1B_1 ;
- в) величину двугранного угла между плоскостями ABC и A_1B_1C .

Решение:

а) Расстояние от точки C до середины D_1 отрезка A_1B_1 вычислим из прямоугольного треугольника DD_1C $(DD_1 \parallel AA_1 \Rightarrow DD_1\bot(ABC))$. Отрезок DD_1 является средней линией трапеции AA_1B_1B , значит, $DD_1=9$ см, а отрезок DC является медианой треугольника ABC. Используя формулу вычисления медианы треугольника $(m_c=\frac{1}{2}\sqrt{2a^2+2b^2-c^2})$, получаем, что $DC=\frac{1}{2}\sqrt{114}$ см.

Из прямоугольного треугольника CDD_1 , по теореме Пифагора, получаем:

$$D_1 C = \sqrt{DC^2 + DD_1^2} = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot 114 + 81} = \sqrt{109,5}$$
 (cm).

б) Расстояние от точки C до прямой $A_{\rm l}B_{\rm l}$ равно высоте треугольника $A_{\rm l}CB_{\rm l}$, проведенной из вершины C. По теореме




Рис. 9.21

Пифагора, для прямоугольного треугольника A_1AC получаем, что $A_1C=13$ см. Аналогично из прямоугольных треугольников B_1BC и A_1KB_1 следует, что $B_1C=10$ см и $A_1B_1=10$ см соответственно.

Расстояние от точки C до прямой A_1B_1 может быть вычислено следующим образом: $h_c = \frac{2\mathscr{A}_{A_1B_1C}}{A_1B_1}$.

По формуле Герона¹ вычисляем площадь треугольника:

$$\mathcal{A}_{A_1B_1C} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{\frac{33}{2} \cdot \frac{13}{2} \cdot \frac{13}{2} \cdot \frac{7}{2}} = \frac{13}{4}\sqrt{231} \text{ (cm)}.$$

Тогда
$$h_c = \frac{2 \cdot \frac{13}{4} \sqrt{231}}{10} = \frac{13}{20} \sqrt{231}$$
 (см).



в) Треугольник ABC является проекцией треугольника A_1B_1C на плоскость треугольника ABC. Следовательно, величина φ двугранного угла между плоскостями ABC и A_1B_1C вычисляется по формуле $\mathscr{A}_{ABC} = \mathscr{A}_{A_1B_1C} \cdot \cos \varphi$.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{5}{4}\sqrt{231} \text{ см}^2$$
. Отсюда $\cos \varphi = \frac{5}{13}$, а $\varphi = \arccos \frac{5}{13}$.

Omsem: a)
$$CD_1 = \sqrt{109.5}$$
 cm; 6) $\frac{13}{20}\sqrt{231}$ cm; B) $\varphi = \arccos \frac{5}{13}$.

Замечание. Задача 1 в) показывает, что величина двугранного угла может быть найдена без построения его линейного угла.

- $\$ 2. Некомпланарные полупрямые [OA, [OB, [OC с общим началом в точке O построены так, что
- $m(\angle AOC) = m(\angle BOC) = \alpha < 90^{\circ}, \ m(\angle AOB) = 2\beta \ (puc. 9.22).$
- а) Докажем, что проекция полупрямой [OC на плоскость OAB является биссектрисой угла AOB.




Рис. 9.22

¹ Герон Александрийский (10 г. от Р. Х.) – древнегреческий математик и механик.

- б) Найдем величину двугранного угла с ребром OA.
- в) Определим величину угла между прямой OC и плоскостью OAB. Peшение:
- а) Пусть M_1 проекция некоторой точки $M \in [OC]$ на плоскость OAB, а N и L точки пересечения прямых, проходящих через точку M и перпендикулярные прямым OA и OB соответственно. Прямые NM_1 и LM_1 являются проекциями прямых MN и соответственно ML на плоскость OAB. В силу теоремы о трех перпендикулярах $NM_1\bot OA$ и $LM_1\bot OB$.

Поскольку $\Delta ONM \equiv \Delta OLM$, то $[ON] \equiv [OL]$ и $[MN] \equiv [ML]$.

Так как $\Delta MNM_1 \equiv \Delta MLM_1$, то $[NM_1] \equiv [LM_1]$.

 $\Delta ONM_1 \stackrel{\text{KK}}{\equiv} \Delta OLM_1 \Rightarrow \angle NOM_1 \equiv \angle LOM_1$, то есть полупрямая $[OM_1]$ является биссектрисой угла AOB, ч. т. д.

б) В прямоугольных треугольниках *OMN*, *ONM*₁, *MNM*₁ получаем:

$$ON = OM \cos \alpha$$
, $NM = OM \sin \alpha$; $NM_1 = ON \operatorname{tg} \beta = OM \cos \alpha \operatorname{tg} \beta$; $\cos \gamma = \frac{NM_1}{NM} = \frac{OM \cos \alpha \operatorname{tg} \beta}{OM \sin \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha \operatorname{tg} \beta$. Тогда $\gamma = \operatorname{arccos}(\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{tg} \beta)$.

в) В прямоугольных треугольниках ONM_1 и MOM_1 имеем:

$$OM_1 = \frac{ON}{\cos \beta} = \frac{OM \cos \alpha}{\cos \beta}, \quad \cos \delta = \frac{OM_1}{OM} = \frac{\cos \alpha}{\cos \beta}, \quad \text{откуда } \delta = \arccos\left(\frac{\cos \alpha}{\cos \beta}\right)$$

Ombem: 6) $\gamma = \arccos(\operatorname{ctg}\alpha \operatorname{tg}\beta)$; B) $\delta = \arccos\left(\frac{\cos\alpha}{\cos\beta}\right)$.

 $\$ 3. Известно, что точка M, не лежащая в плоскости некоторого многоугольника, равноудалена от его вершин. Докажем, что около данного многоугольника можно описать окружность.

Решение:

Пусть точка M, не лежащая в плоскости многоугольника $A_1A_2A_3...A_n$, такая, что $[MA_1]\equiv [MA_2]\equiv \equiv [MA_3]\equiv ...\equiv [MA_n]$ (рис. 9.23). Точка O является проекцией точки M на плоскость многоугольника. Тогда треугольники OMA_1 , OMA_2 , OMA_3 , ...,




Рис. 9.23

 OMA_n — прямоугольные и конгруэнтны (признак ГК), откуда следует, что $[OA_1] \equiv [OA_2] \equiv ... \equiv [OA_n]$. Следовательно, точка O, лежащая в плоскости этого многоугольника, равноудалена от его вершин, то есть около многоугольника можно описать окружность, а точка O — центр этой окружности.

Замечание. Точки прямой OM равноудалены от вершин многоугольника $A_1...A_n$.

4. В грани α двугранного угла $\angle(\alpha\beta)$ величины φ проведена прямая AD, которая образует с ребром b двугранного угла угол величиной δ (рис. 9.24). Найдем величину γ угла между прямой AD и гранью β .

Решение:

Пусть $\angle ABC$ — линейный угол двугранного угла $\angle(\alpha\beta)$. По условию задачи $m(\angle ABC) = \varphi$, $m(\angle ADB) = \delta$. Так как $AC \perp \beta$, следует, что $\angle ADC$ является искомым углом. В прямоугольных треугольниках ABD, ACB и ACD имеем: $AB = AD\sin\delta$, $AC = AB\sin\varphi = AD\sin\delta$ оп $AC = AB\sin\varphi$.

Таким образом, $AD \sin \gamma = AD \sin \delta \sin \varphi$. Следовательно, $\sin \gamma = \sin \delta \sin \varphi$.




Рис. 9.24

5. Пусть точка $A \notin \alpha$, и из этой точки проведены к плоскости α наклонная AB и перпендикуляр AO, где точка B — основание наклонной, а точка O — основание перпендикуляра. Через основание наклонной в плоскости α построена прямая BC, которая образует с проекцией наклонной угол величиной δ . Пусть ϕ и γ — величины углов между наклонной AB и ее проекцией OB и соответственно прямой BC (рис. 9.25). Покажем, что $\cos \gamma = \cos \phi \cos \delta$.




Рис. 9.25

Решение:

В плоскости α построим прямую $OD \perp BC$. Тогда, в силу теоремы о трех перпендикулярах, имеем $AD \perp BC$. Пусть AB = x. Тогда из прямоугольных треугольников AOB, BDO и ADB получим: $BO = x\cos\varphi$, $BD = BO\cos\delta = x\cos\varphi\cos\delta$, $BD = x\cos\gamma$. Следовательно, $\cos\gamma = \cos\varphi\cos\delta$.

Задачи

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

- **А** 1. Равносторонние треугольники ABC и ABD имеют общую сторону AB, а их плоскости образуют прямой угол. Найдите длину отрезка CD, если AB = 2 см.
- **В** 2. Сторона правильного треугольника ABC равна 3 см. Сторона AB расположена в плоскости α . Двугранный угол между плоскостями ABC и α равен 30°. Найдите: а) длину проекции медианы треугольника ABC, проведенной из вершины C на плоскость α ;
 - б) расстояние от точки C до плоскости α .
- С 3. № Работайте в парах! Через меньшее основание трапеции проведена плоскость. Расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до этой плоскости равно 6 см, а отношение длин оснований равно 3:2. Найдите расстояние от большего основания до плоскости.
 - **4.** Через одну из сторон параллелограмма проведена плоскость. Расстояние от противолежащей стороны до этой плоскости равно 10 см. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей до этой плоскости.
 - **5.** *Практическая работа*. Выявление отношений перпендикулярности в строениях родного села/города.
 - 6. Проект Приложения элементов перпендикулярности в строениях родного села/города.

Реальный профиль

- **А**₁ **1.** Треугольник $A_1B_1C_1$ является ортогональной проекцией ΔABC на плоскость α . Найдите косинус двугранного угла между плоскостями ABC и α , если $AA_1=BB_1=3$ см, $CC_1=8$ см, $A_1B_1=13$ см, $A_1C_1=C_1B_1=12$ см.
- **В**₁ **2.** Точка E равноудалена от сторон ромба ABCD и не лежит в его плоскости. Докажите, что:
 - а) проекция точки E на плоскость ромба совпадает с точкой пересечения диагоналей ромба;
 - б) двугранные углы между плоскостями EAB, EBC, ECD, EDA и плоскостью ромба конгруэнтны.
 - 3. Пусть ABCD выпуклый четырехугольник и точка E такая, что углы между плоскостями EAB, EBC, ECD, EDA и плоскостью четырехугольника конгруэнтны. Докажите, что четырехугольник ABCD описанный, и проекция точки E на плоскость четырехугольника ABCD равноудалена от его сторон.
- **C**₁ **4.** Равнобедренный треугольник ABC (AB = AC) и равносторонний треугольник ADE находятся в разных плоскостях и имеют общую медиану AF. Докажите, что прямая AF перпендикулярна плоскости, проходящей через точки F, B, D.
 - **5.** Через один из катетов равнобедренного прямоугольного треугольника построена плоскость, которая образует с другим катетом угол в 45°. Найдите угол между гипотенузой и построенной плоскостью.
 - **6.** В трапеции ABCD, $m(\angle BAD) = 60^{\circ}$. Через большее основание AB проведена плоскость, которая образует со стороной AD угол в 45°. Найдите отношение площади трапеции к площади проекции этой трапеции на построенную плоскость.
 - 7. *Практическая работа*. Выявление отношений перпендикулярности в школьном дворе.
 - 8. Проект Приложения элементов перпендикулярности в пространстве в строениях родного села/города.

Задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт


- **А** 1. Прямые AB, AC и AD перпендикулярны. Найдите длину отрезка CD, если:
 - a) AB = 6 cm, BC = 14 cm, AD = 3 cm;
- 6) BD = 18 cm, BC = 32 cm, AD = 10 cm;
- B) AB = m, BC = n, AD = p;
- Γ) BD = s, BC = n, AD = p.
- **2.** Расстояние от точки M до вершин равностороннего треугольника равно b. Найдите расстояние от точки M до плоскости треугольника, если сторона треугольника равна a, а $b > \frac{a\sqrt{3}}{3}$.
- 3. Работайте в napax! Из вершины B равнобедренной трапеции ABCD $(AD \parallel BC)$ перпендикулярно к ее плоскости проведена прямая BE так, что BE = 4 см. Вычислите расстояния d_1 и d_2 от точки E до прямых CD и AD соответственно, если известно, что высота трапеции равна 4 см, а BC = 4 см и AD = 12 см.
- **В** 4. Через вершину A правильного шестиугольника ABCDEF перпендикулярно к его плоскости проведена прямая AM так, что AM = AB. Вычислите величину угла между плоскостями: a) MDC и AEF; б) DCM и DEM.


- **5.** Точка D равноудалена от несущих прямых сторон треугольника ABC. Вычислите расстояния от точки D до сторон треугольника, если расстояние от точки D до плоскости треугольника равно $\sqrt{2}$ см, а AB = AC = 6 см, BC = 4 см.
- **С 6.** Вычислите длину кабеля, который должен быть протянут от столба высотой 8 м до крыши здания высотой 20 м, если известно, что расстояние от дома до столба равно 9 м.

Реальный профиль


- A_1 1. Точка M, не лежащая в плоскости некоторого многоугольника, равноудалена от всех его сторон. Докажите, что многоугольник описанный.
 - **2.** Точка M равноудалена от сторон многоугольника ABCDE. Докажите, что величины двугранных углов между плоскостями AMB, BMC, CMD, DME, EMA и плоскостью многоугольника равны.
 - 3. Работайте в парах! Прямая a пересекает плоскость α , а точка P принадлежит плоскости α . Существует ли в плоскости α прямая, проходящая через точку P и перпендикулярная прямой a?
 - **4.** Через вершину острого угла прямоугольного треугольника проведена плоскость, параллельная одному из его катетов. Длина проекции большего катета на плоскость α равна $2\sqrt{31}$ см. Найдите длину проекции гипотенузы на плоскость α , если длины катетов треугольника равны 30 см и 40 см.
- ${f B_1}$ 5. Точка M равноудалена от вершин правильного шестиугольника со стороной, равной a. Найдите расстояние от точки M до плоскости шестиугольника, если расстояние от точки M до вершины шестиугольника равно b.

6. Точка C не лежит в плоскости прямого угла AOB и равноудалена от сторон угла. Найдите расстояние от точки C до плоскости угла, если CO=a, а расстояние от точки C до одной из сторон угла равно b.





9. Приемный бункер мельницы состоит из четырех стен в виде равнобедренных трапеций с основанием 0,4 м и 1,2 м. Расстояние между плоскостями верхнего и нижнего проемов равно 2 м. Для увеличения прочности стен бункера были приварены вдоль диагоналей каждой стенки железные уголки, а в точках пересечения диагоналей приварены вертикальные опоры до плоскости нижнего проема. Найдите высоту α вертикальных опор.



Итоговый тест

Время выполнения работы: 45 минут

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт

1. Найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, которая не пересекает этот отрезок, если расстояния от точек A и B до этой плоскости равны 2,4 см и 4,6 см соответственно.

4

2. Длина стороны равностороннего треугольника равна 6 см. Точка, не лежащая в плоскости треугольника, находится на расстоянии 3 см от каждой стороны треугольника. Вычислите расстояние от этой точки до плоскости данного треугольника.

6

3. Точка M равноудалена от вершин прямоугольника, длины сторон которого равны 4 см и 10 см. Найдите расстояние от точки M до прямых, на которых лежат стороны прямоугольника, если расстояние от точки M до плоскости прямоугольника равно 5 см.

6

4. Сторона равностороннего треугольника ABC равна 12 см. Прямые MA, MB, MC образуют с плоскостью треугольника ABC конгруэнтные углы величиной в 30°. Вычислите расстояние от точки M до плоскости треугольника ABC.

7

Схема оценивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	23–22	21–20	19–17	16–14	13–11	10-8	7–6	5–4	3–2	1-0

Время выполнения работы: 45 минут

Реальный профиль

- 3
- 1. Отрезок длины l пересекает плоскость. Концы отрезка расположены на расстоянии a и b от этой плоскости. Найдите расстояние от середины отрезка до этой плоскости.

6)

2. Через медиану треугольника проведена плоскость. Докажите, что вершины треугольника, которые не лежат в построенной плоскости, равноудалены от этой плоскости.

3. Длины сторон равнобедренного треугольника ABC равны 5 см, 5 см, 2 см. Расстояние от точки M до плоскости ABC равно 8 см, а ее проекция на плоскость ABC совпадает с серединой наибольшей высоты треугольника. Вычислите расстояние от точки M до сторон треугольника.

6

4. Найдите величину угла между боковым ребром и плоскостью основания правильной четырехугольной пирамиды, если все ее ребра конгруэнтны.

4

5. Двугранный угол $\angle(\alpha\beta)$ прямой. Точка $A \in \alpha$, прямая $d \subset \beta$. Постройте точку M – ортогональную проекцию точки A на прямую d, указав дополнительные построения на плоскостях α и β .

⑤






Схема опенивания теста


Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	24–23	22–21	20–18	17–15	14–12	11–8	7–6	5–4	3–2	1–0




 $(a \subset \alpha, b \subset \alpha, \alpha | b, c \perp a, c \perp b) \Rightarrow c \perp \alpha$




 $(a\perp\alpha,\ AB$ – наклонная, $B\in\alpha,\ A_1\in\alpha,\ A_1B\perp b)\Rightarrow AB\perp\alpha$




 $(a \perp \alpha, b \perp \alpha) \Rightarrow a \parallel b$




 $([A_1B_1] \equiv pr_\alpha[AB], \ AC \parallel A_1B_1) \Rightarrow$ \Rightarrow длина проекции [AB] равна $AB\cos\varphi$




 $(MM_{_{1}}\perp\alpha,\ M_{_{1}}\in\alpha)$ \Rightarrow длина $MM_{_{1}}$ равна расстоянию от точки M до плоскости α




 $(a \parallel b, a \perp \alpha) \Rightarrow b \perp \alpha$




 $\angle(\alpha_1\beta_1)$ – двугранный угол, $\alpha \cap \beta = m$, $(ABC) \perp m$, $m(\angle(\alpha_1\beta_1)) = m(\angle BAC)$



 $b \subset \alpha$ 1) $a \perp b \Rightarrow pr_{\alpha} a \perp b$ 2) $b \perp pr_{\alpha} a \Rightarrow a \perp b$



 $(F \subset \beta, F_1 = pr_{\alpha}F, m(\angle(\alpha\beta)) = \varphi) \Rightarrow$ $\Rightarrow \mathcal{A}_{F_1} = \mathcal{A}_F \cos \varphi$



 $a\perp \alpha, M, M_1\in \alpha, M_1\in a, MM_1$ — расстояние от точки M до прямой a

Модуль

Геометрическиепреобразования

Цели

- распознавание и применение в различных контекстах понятий: осевая симметрия, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, *параллельный перенос, *подобие в пространстве, *поворот вокруг прямой;
- применение терминологии, соответствующей геометрическим преобразованиям, в различных контекстах;
- ⇒ построение образов, полученных в результате изученных геометрических преобразований; ⇒ применение геометрических преобразований при решении задач;
- ⇒ применение геометрических преобразований для изучения и описания процессов, явлений из различных областей.

В предыдущих классах были изучены осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос, подобие в плоскости. Также было определено понятие конгруэнтности треугольников. Конгруэнтность более сложных фигур определяется с помощью геометрических преобразований, которые имеют широкое применение. Например, для составления программы, позволяющей увидеть на экране компьютера перемещение пространственной фигуры, необходимы геометрические преобразования.


§1 Понятие геометрического преобразования. Изометрические преобразования

Пусть X и Y – непустые множества точек пространства. Напомним, что если каждой точке x множества X ставится в соответствие одна и только одна точка y множества Y, то определено отображение множества X в множество Y.

Обозначаем: $f: X \to Y$ или $X \xrightarrow{f} Y$. Точка y = f(x) называется *образом* точки $x \in X$, а x является одним из **прообразов** точки $y \in Y$. Говорят, что точка x отображается в точку y при отображении f.


Примеры

1. Даны плоскость α и прямая d, пересекающая эту плоскость. Через произвольную точку M пространства проходит единственная прямая, параллельная прямой d. Пусть M' – точка пересечения этой прямой с плоскостью α (рис. 10.1).



Отображение пространства в плоскость α , при котором каждой точке M пространства соответствует точка $M' \in \alpha$ такая, что $MM' \parallel d$, называется *параллельным проектированием* пространства на плоскость α в направлении прямой d.

2. Пусть O — некоторая точка пространства. Отображение пространства на себя, при котором каждой точке M, отличной от O, соответствует точка M' такая, что точка O является серединой отрезка MM', а точка O соответствует себе, называется центральной симметрией пространства относительно центра O (рис. 10.2).



Обозначают: S_{o} .

Точка O называется *центром симметрии*.

Очевидно, если при центральной симметрии точка M' является образом точки M, то точка M является образом точки M'; говорят, что точки M и M' симметричны относительно центра симметрии.

Заметим, что при параллельном проектировании пространства на плоскость каждая точка плоскости имеет бесконечно много прообразов, а при центральной симметрии каждая точка имеет лишь один прообраз.

Определение. Отображение пространства на себя, при котором каждая точка имеет лишь один прообраз, называется **геометрическим преобразованием** пространства.

В дальнейшем для краткости изложения будем использовать слово "преобразование" вместо выражения "геометрическое преобразование".

Пусть F – пространственная фигура и g – преобразование пространства. Фигура F' = g(F), состоящая из образов всех точек фигуры F при преобразовании g, называется *образом* фигуры F при преобразовании g.

Так как преобразования являются частным случаем отображений, они обладают всеми основными свойствами отображений. Композиция преобразований является преобразованием; имеет место ассоциативный закон композиции преобразований; можно определить сужение преобразования на фигуру и т. д.

Если при преобразовании g фигура F отображается на себя, т. е. g(F) = F, то сужение преобразования g на фигуру F называется **преобразованием симметрии** фигуры F. Для краткости говорим, что g является преобразованием симметрии фигуры F.

Определение. Преобразование g пространства называется преобразованием изометрии (или изометрией) пространства, если для любых двух точек M и N пространства и их образов M' = g(M), N' = g(N) имеет место равенство MN = M'N'.

Таким образом, изометрия – это отображение пространства на себя, сохраняющее расстояния. Изометрии также называют *перемещениями* или *движениями* пространства.

Очевидно, что тождественное преобразование пространства, то есть преобразование, которое отображает каждую точку пространства на себя, является изометрией.

Две фигуры называются *конгруэнтными*, если существует изометрия, которая отображает одну из этих фигур в другую.

Теорема 1. При изометрии три коллинеарные точки отображаются в три коллинеарные точки, причем точка, лежащая между двумя другими, отображается в точку, лежащую между образами двух других точек.

Доказательство

Пусть A, B, C — коллинеарные различные точки. Тогда одна и только одна из них лежит между двумя другими. Пусть точка B лежит между точками A и C. Тогда имеет место равенство AB + BC = AC. Обозначим через A', B', C' образы точек A, B, C соответственно. Из определения изометрии следуют равенства AB = A'B', AC = A'C', BC = B'C', откуда получаем равенство A'B' + B'C' = A'C', то есть B' лежит между A' и C', а это означает, что точки A', B', C' коллинеарны.

Определение. Инвариантной точкой изометрии g называется такая точка A, что g(A) = A; инвариантной прямой изометрии g называется такая прямая d, что g(d) = d; инвариантной плоскостью изометрии g называется такая плоскость α , что $g(\alpha) = \alpha$.

Если все точки некоторой прямой являются инвариантными при изометрии g, то такая прямая называется **прямой инвариантных точек** этой изометрии.

Задание с решением


Предположим противное. Пусть a и b — две инвариантные непараллельные прямые данной изометрии g. Прямые a и b пересекаются или являются некомпланарными. Если прямые a и b пересекаются в точке M, то точка M' = g(M) принадлежит этим прямым (инвариантным), т. е. g(M) = M. Это противоречит условию задачи. В случае скрещивающихся прямых a и b существует их общий перпендикуляр AB, $A \in a$, $B \in b$. Так как AB — наименьшее расстояние между прямыми a и b, получаем, что точки A и B являются инвариантными точками изометрии g, что также противоречит условию задачи.

Задачи

Реальный профиль

- А₁ 1. Приведите примеры геометрических преобразований в пространстве.
 - 2. Является ли параллельное проектирование пространства на плоскость изометрией?
- **В**₁ 3. Дан угол AOB и отображение f пространства на себя такое, что:
 - а) образом любой точки M пространства, не принадлежащей углу AOB, является сама точка M;
 - б) образом любой точки, принадлежащей углу AOB, является точка, симметричная ей относительно биссектрисы этого угла.
 - Является ли данное отображение геометрическим преобразованием пространства? А изометрией?
 - **4.** При некотором геометрическом преобразовании фигура отображается на себя. Является ли данное преобразование изометрией пространства? Приведите примеры.
 - 5. Докажите, что изометрия отображает:
 - а) отрезок на конгруэнтный ему отрезок;
 - б) треугольник на конгруэнтный ему треугольник.
 - 6. Докажите, что изометрия отображает угол на конгруэнтный ему угол.

- 7. Докажите, что отображение, обратное изометрии, также является изометрией.
- **8.** Работайте в парах! Пусть $\Delta A'B'C'$ образ треугольника ABC при изометрии g. Постройте образ:
 - a) медианы *BK*;
- б) биссектрисы BL;
- в) высоты BM;
- Γ) центра тяжести G;
- д) центра I вписанной окружности;
- e) ортоцентра H;
- ж) центра O окружности, описанной около треугольника ABC при данной изометрии.



- **9.** а) Докажите, что если A и B различные инвариантные точки изометрии f, то любая точка прямой AB является инвариантной.
 - б) Допускает ли изометрия пространства ровно две различные инвариантные точки?
- **10.** *Исследуйте!* а) Докажите, что если A, B, C инвариантные неколлинеарные точки изометрии f, то любая точка плоскости ABC является инвариантной.
 - б) Допускает ли изометрия пространства ровно три инвариантные точки?
- C_1 11. Изометрия f имеет одну инвариантную точку.
 - а) Имеет ли изометрия f^{-1} одну инвариантную точку? 6) А изометрия $f \circ f$?
 - **12.** При изометрии f известно, что для некоторой точки A f(A) = B, а f(B) = A. Имеет ли изометрия $f \circ f$ инвариантные точки?

§2 Центральная симметрия

В §1 мы определили симметрию пространства относительно точки и назвали ее центральной симметрией.

Теорема 2. Центральная симметрия пространства является изометрией.

Доказательство

Пусть M и N – образы произвольных точек M' и N' соответственно при центральной симметрии S_O .

Если точки M, N и O неколлинеарны (рис. 10.3 а)), то истинность теоремы следует из конгруэнтности треугольников MON и M'ON' (признак СУС), т. е. MN = M'N'.






Рис. 10.3

Если точки $M,\ N$ и O коллинеарны и, например, M лежит между O и N (рис. $10.3\,$ б)), то

$$MN = ON - OM = ON' - OM' = M'N'.$$

Аналогично получаем равенство MN = M'N' и в других случаях расположения точек M, N и O на одной прямой. Таким образом, центральная симметрия сохраняет расстояния между точками и, следовательно, является изометрией.


Определение. Фигуры F и F' называются симметричными относительно точки O, если $S_O(F) = F'$.

В частности, если фигура F симметрична сама себе относительно точки O, то F называется **центрально-симметричной фигурой**, а O называется **центром симметрии фигуры** F. Например, окружность, квадрат, сфера являются центрально-симметричными фигурами.

Задание с решением

Решение:

Через точку $O' = S_A(O)$ проводим прямые O'C' и O'B', параллельные прямым OC и OB соответственно. Отрезок DE, где $\{D\} = O'C' \cap OB$ и $\{E\} = O'B' \cap OC$, является искомым отрезком.



Задачи


Реальный профиль

- А₁ 1. Приведите примеры центрально-симметричных геометрических фигур.
 - **2.** Симметричны ли любые две точки пространства относительно некоторой третьей точки пространства.
 - 3. *Работайте в парах!* Сколько центров симметрии имеет фигура, образованная двумя параллельными прямыми? Какую фигуру образуют эти центры симметрии?
 - 4. Могут ли два неконгруэнтных отрезка быть симметричными относительно точки?
 - **5.** Могут ли два пересекающихся отрезка быть симметричными относительно точки? А непересекающиеся?
- ${\bf B_1}$ **6.** Точки A, B, C, D расположены в пространстве так, что точки A и C симметричны относительно B, а B и D симметричны относительно C. Что можно еще сказать о расположении этих точек?
 - 7. Постройте фигуру, симметричную треугольнику относительно: а) некоторой вершины треугольника; б) середины некоторой стороны треугольника.
 - **8.** Существуют ли точки, прямые и плоскости, которые при центральной симметрии инвариантны?
 - **9.** Какое отображение получим в результате композиции $S_o \circ S_o$?
 - 10. *Работайте в парах!* Является ли треугольник центрально-симметричной фигурой?
 - 11. Докажите, что отображение, обратное центральной симметрии, есть та же симметрия.
 - 12. Докажите, что центральная симметрия отображает:
 - а) плоскость на параллельную ей плоскость;
 - б) две параллельные плоскости на две параллельные плоскости;
 - в) две пересекающиеся плоскости на две плоскости, пересечением которых является образ прямой, по которой пересекаются данные плоскости;
 - г) две перпендикулярные плоскости на две перпендикулярные плоскости.
 - 13. Покажите, что при центральной симметрии прямая и ее образ компланарны.
- **С**₁ **14.** Пработайте в парах! Даны точка A и фигура F, $A \notin F$. Найдите множество всех точек пространства, симметричных точке A относительно всех точек фигуры F, если F является: а) отрезком; б) прямой; в) плоскостью.
 - **15.** Покажите, что если фигура $F = [AB] \cup [CD]$ является центрально-симметричной, то и фигура $[AC] \cup [BD]$ является центрально-симметричной относительно того же центра.

§3 Осевая симметрия

Даны прямая d и точка $A \notin d$. Точка A' называется *симметричной* точке A относительно прямой d, если $AA' \perp d$, $AA' \cap d = \{M\}$ и AM = A'M. Точки прямой d симметричны сами себе относительно данной прямой.


Определение. Преобразование пространства, которое отображает каждую точку пространства в симметричную ей относительно прямой d, называется симметрией пространства относительно прямой d или осевой симметрией с осью d.



Теорема 3. Осевая симметрия пространства является изометрией.

Доказательство

Пусть осевая симметрия с осью d отображает различные точки A и B в точки A' и B B' соответственно. Докажем, что AB = A'B'. Если прямые AB и d компланарны, то очевидно, что AB = A'B'. Предположим, что прямые AB и d скрещивающиеся (рис. 10.6) и $BB' \cap d = \{N\}$. Через точку N проведем прямую, параллельную прямой AA', и от-



ложим на ней такие симметричные отрезки A_1N и NA_1' , что $A_1A_1' = AA'$. Четырехугольник $AA_1A_1'A'$ является прямоугольником, следовательно, $AA_1 = A'A_1'$. Так как ось d перпендикулярна прямым BB' и A_1A_1' , то она перпендикулярна и плоскости, проходящей через эти прямые. Из того, что $AA_1 \parallel d \parallel A'A_1'$ получаем, что $AA_1 \perp A_1B$ и $A'A_1' \perp A_1'B'$. Так как треугольники A_1NB и $A_1'NB'$ конгруэнтны, то $BA_1 = B'A_1'$. Итак, катеты прямоугольных треугольников AA_1B и $A'A_1'B'$ конгруэнтны, значит, и треугольники конгруэнтны, следовательно, AB = A'B'.

Если при осевой симметрии S_d фигура F' является образом фигуры F, то есть $F' = S_d(F)$, то фигуры F' и F называются симметричными относительно прямой d.

Прямая d является осью симметрии фигуры F, если осевая симметрия относительно оси d отображает фигуру F на себя, т. е. $S_d(F) = F$. Например, несущие прямые диагоналей и медиатрис сторон квадрата являются его осями симметрии; любая прямая, проходящая через центр окружности и лежащая в плоскости окружности или перпендикулярная к ней, является ее осью симметрии.

Задание с решением

७ На сторонах AB и AC треугольника ABC с m(∠A) < 90° даны точки P и Q соответственно (рис. 10.7). Найдите на стороне BC такую точку X_1 , что периметр ΔPQX наименьший.

Решение:

Пусть $P_1 = S_{BC}(P)$, тогда $P_1X = PX$, $\forall X \in (BC)$.

Периметр ΔPQX наименьший, если сумма $P_1X + XQ$ наименьшая, что возможно, если $X = X_1$, где $\{X_1\} = BC \cap P_1Q$.





Рис. 10.7

Задачи

Реальный профиль

- A_1 1. Приведите примеры фигур, которые:
 - а) имеют хотя бы одну ось симметрии;
 - б) не имеют оси симметрии.
- В₁ 2. Какие оси симметрии имеет куб.
 - 3. Постройте образ куба при осевой симметрии относительно:
 - а) несущей прямой ребра куба;
 - б) несущей прямой диагонали грани.
 - **4.** Даны две различные точки A и B. Укажите оси всех осевых симметрий, которые отображают A в B. Какую фигуру образуют все оси?
 - 5. Работайте в парах! Укажите все оси симметрии:
 - а) отрезка;
- б) полупрямой;
- в) прямой;

- г) плоскости;
- д) параллелограмма.
- 6. Каково взаимное расположение при осевой симметрии:
 - а) прямой и ее образа;
- б) плоскости и ее образа?
- 7. Работайте в парах! Найдите
 - а) инвариантные прямые при симметрии S_d ;
 - б) прямые, состоящие из инвариантных точек при симметрии S_d .
- **C**₁ **8.** Определите взаимное расположение оси симметрии d и образа α' плоскости α при симметрии S_d , если:
 - a) $\alpha \supset d$;
- 6) $d \perp \alpha$;
- в) d наклонная к плоскости α .
- Постройте образ данной фигуры при симметрии относительно прямой AB, если A, B, C, D – некомпланарные точки, ABC и ABD – равнобедренные треугольники с общим основанием AB.
- 10. Исследуйте! Приведите примеры приложения осевой симметрии в биологии, физике, в природе, в технике, в искусстве, в строительстве и в других областях.



§4 Симметрия относительно плоскости

Даны плоскость α и точки A, A', не лежащие в этой плоскости. Точки A и A' называются симметричными относительно плоскости α , если эта плоскость перпендикулярна отрезку AA' и делит его пополам. Любая точка B плоскости α считается симметричной самой себе относительно этой плоскости (рис. 10.8).




Рис. 10.8

Определение. Преобразование пространства, которое отображает любую точку пространства в точку, симметричную ей относительно плоскости α , называется **симметрией пространства относительно плоскости** α .

Обозначают: S_{α} .

Плоскость α называется плоскостью симметрии.

Если для фигуры F выполняется равенство $F = S_{\alpha}(F)$, то плоскость α называется *плоскостью симметрии фигуры* F, а фигура F называется *фигурой, симметричной относительно плоскости* α .

Например, прямой круговой цилиндр симметричен относительно любой плоскости, содержащей его ось.

Задание с решением

 $\begin{array}{l} \begin{array}{l} \be$

Решение:


Замечаем, что при симметрии S_{α} ,

 $S_{\alpha}([FB]) = [BE], S_{\alpha}([FD]) = [DE].$

Следовательно, $[FB] \equiv [BE]$, $[FD] \equiv [DE]$.

Аналогично, при симметрии S_{β} ,

 $S_{\beta}([FB]) = [FD]$, откуда следует, что [FB] = [FD]. Таким образом, у четырехугольника EBFD все стороны конгруэнтны, т. е. он является ромбом.



Задачи

Реальный профиль

- Приведите примеры геометрических фигур, которые имеют плоскость симметрии.
 - 2. Укажите инвариантные прямые при симметрии относительно плоскости.
- В 3. Укажите плоскости симметрии (если они существуют):
 а) отрезка;
 б) прямой;
 в) плоскости;
 г) двух пересекающихся прямых;
 двух параллельных плоскостей.
 - **4.** *Работайте в парах!* Известно, что отрезки *AB* и *A'B'* симметричны относительно плоскости. Компланарны ли или скрещивающиеся несущие прямые этих отрезков?
 - **5.** Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Постройте точку, симметричную точке A относительно плоскости: a) CC_1D_1 ; b) BDD_1 ; b) CDA_1 ; г) BDC_1 ; д) BCB_1 .


6. Две перпендикулярные плоскости пересекаются по прямой d. Точки A и B симметричны точке C относительно этих плоскостей. Найдите расстояние от точки C до прямой d, если AB = 10 ì

- 7. Докажите, что симметрия пространства относительно плоскости α :
 - а) является изометрией;
 - б) совпадает с обратной ей симметрией, то есть $S_{\alpha} = S_{\alpha}^{-1}$;
 - в) отображает прямую на прямую и плоскость на плоскость.
- C_1 8. Плоскость α симметрична плоскости β относительно плоскости γ . Каково взаимное расположение этих плоскостей?
 - **9.** Точки A и B расположены по одну сторону от плоскости α . Найдите в плоскости α такую точку M, чтобы сумма AM + MB была наименьшей.
 - 10. Работайте в парах! Точки A и B расположены по разные стороны от плоскости α . Найдите на плоскости α такую точку M, чтобы модуль разности AM-MB был наибольшим.
 - **11.** *Исследуйте!* Через прямую *d* проведены всевозможные плоскости. Точка *A* не лежит на прямой *d*. Какую фигуру образуют все точки, симметричные точке *A* относительно этих плоскостей?
 - 12. Докажите, что композиция трех симметрий относительно трех взаимно перпендикулярных плоскостей является центральной симметрией.
 - 13. *Исследуйте!* Приведите примеры приложения симметрии относительно плоскости в различных областях.

§5 Параллельный перенос

Две полупрямые, лежащие на одной прямой, называются *одинаково направленными* (или *сонаправленными*), если их пересечением является полупрямая, и соответственно *противоположно направленными*, если их пересечением не является полупрямая.

Полупрямые [AC и [BC на рисунке 10.10 сонаправленные, а [BA и [AC – противоположно направленные. Обозначают: [$AC \uparrow \uparrow$ [BC, [$BA \uparrow \downarrow$ [AC.




Если полупрямые параллельны и не лежат на одной прямой, то они принадлежат одной плоскости. Прямая, проходящая через начала этих полупрямых, делит плоскость на две полуплоскости. Если данные полупрямые находятся в одной полуплоскости, то они называются *одинаково направленными полупрямыми* (рис. 10.11 а)), а если лежат в разных плоскостях – *противоположно направленными* (рис. 10.11 б)).



Рис. 10.11

Очевидно, что две полупрямые, одинаково направленные третьей полупрямой, будут одинаково направленными.

Определение. Параллельным переносом, заданным упорядоченной парой точек (A, A'), называется пре-M образование пространства, которое отображает каждую точку M пространства в такую точку M', что $[MM' \uparrow \uparrow \uparrow AA']$ и MM' = AA' MM' = AA' (рис. 10.12).



Параллельный перенос, заданный парой (A, A'), обозначается $t_{AA'}$. Таким образом, $M' = t_{AA'}(M)$, $C' = t_{AA'}(C)$ и т. д.

Очевидно, если $t_{{\scriptscriptstyle AA'}}(M)=M'$, то $t_{{\scriptscriptstyle MM'}}(A)=A'$, и в этом случае $t_{{\scriptscriptstyle AA'}}=t_{{\scriptscriptstyle MM'}}$. Это означает, что параллельный перенос может быть задан любой парой точек, одна из которых является образом другой при данном параллельном переносе.

Тождественное преобразование пространства можно рассматривать как параллельный перенос, заданный любой парой совпадающих точек: $t_{AA}(M) = t_{BB}(M) = M$, $\forall M$ и $\forall A, B$.

Если $M' = t_{AA'}(M)$ и $M \notin AA'$, то четырехугольник AA'M'M является параллелограммом.

Задание с решением

 $\$ Два села, A и B, разделены рекой, берега которой считаются параллельными прямыми. Где следует построить мост через реку, чтобы путь между этими селами был кратчайшим (мост строится перпендикулярно берегам реки)?

Решение:

Рассмотрим вектор \overline{a} , перпендикулярный берегам реки, модуль которого равен ширине реки (рис. 10.13). Если $B_1=t_{\overline{a}}(B)$, то точка M пересечения прямой AB_1 с тем берегом реки, где находится точка A, является точкой, из которой следует построить мост. Для любой другой точки M_1 этого берега

 \overline{a} M M_1 M_1 M_1 M_1 M_1

имеем $M_1 \neq M$, $AM_1 + M_1B_1 > AM + MB_1 = AB_1 = AM + NB$.


Задачи

Реальный профиль

- **A**₁ **1.** Постройте образ параллелограмма ABCD при параллельном переносе t_{AM} , если точка M совпадает с:
 - а) вершиной B; б) вершиной C; в) вершиной D; г) точкой пересечения диагоналей.
 - **2.** Постройте образ куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ при параллельном переносе t_{AM} , если точка M совпадает с:
 - a) вершиной B;
- б) вершиной B_1 ;
- в) вершиной C_1 ;

- Γ) серединой ребра AB;
- д) центром куба O.
- **3.** Три различные параллельные прямые пересекают две различные параллельные плоскости в вершинах треугольников ABC и $A_1B_1C_1$ соответственно. Докажите, что эти треугольники конгруэнтны.

4. Даны некомпланарные точки A, B, C, D такие, что треугольники ABD и ABC – равнобедренные с общим основанием AB (см. рисунок). Постройте образ фигуры ABCD при параллельном переносе t_{AC} .



- **В**₁ **5.** *Исследуйте!* Существуют ли инвариантные точ- *В* ки, прямые и плоскости при параллельном переносе, отличном от тождественного.
 - **6.** Определите параллельный перенос, обратный для t_{AB} .
 - 7. Докажите, что:
 - а) параллельный перенос является изометрией пространства;
 - б) параллельный перенос отображает прямую на параллельную ей прямую, полупрямую на сонаправленную ей полупрямую, плоскость на параллельную ей плоскость:
 - в) композиция двух параллельных переносов является параллельным переносом.
 - **8.** *Работайте в парах!* Существует ли параллельный перенос, отображающий одну из двух данных плоскостей на другую, если эти плоскости:
 - а) пересекаются; б) параллельные?
 - **9.** Докажите, что если стороны одного угла сонаправлены со сторонами другого угла, то эти углы конгруэнтны.
- C_1 10. Докажите, что $S_B \circ S_A = t_{AA_1}$, где $A_1 = S_B(A)$.
 - 11. Докажите, что композиция двух симметрий относительно двух параллельных плоскостей является параллельным переносом в направлении, перпендикулярном данным плоскостям, от первой плоскости ко второй, на расстоянии, равном удвоенному расстоянию между этими плоскостями.
 - 12. Докажите, что параллельный перенос является композицией двух симметрий относительно плоскостей. Как построить такие плоскости?
 - 13. Докажите, что композиция двух осевых симметрий, оси которых параллельны, является параллельным переносом. Как задать этот параллельный перенос?
 - **14.** *Исследуйте!* Приведите примеры приложения параллельного переноса в различных областях.

§6 Преобразование подобия. Гомотетия

Определение. Пусть k – действительное положительное число. Преобразованием подобия с коэффициентом k (или подобием с коэффициентом k) пространства назы-



вается отображение пространства на себя, при котором для любых двух точек A, B и их образов A', B' соответственно выполнено условие A'B' = kAB.

Заметим, что изометрия – это подобие с коэффициентом k = 1.

Из равенства A'B' = kAB получаем, что если $A \neq B$, то $A' \neq B'$, то есть подобие пространства является биективным отображением пространства.

Теорема. 1) Композиция двух подобий с коэффициентами k_1 и k_2 является подобием с коэффициентом k_1k_2 .

2) Преобразование, обратное подобию с коэффициентом k, является подобием с коэффициентом $\frac{1}{k}$.


Доказательство

- 1) Пусть различные точки A, B отображаются при подобии с коэффициентом k_1 в точки A', B' соответственно, а эти точки отображаются при подобии с коэффициентом k_2 в точки A'', B''. Тогда $A'B' = k_1 AB$ и $A''B'' = k_2 A'B'$. Из этого получаем, что $A''B'' = k_1 \cdot k_2 AB$, то есть преобразование, отображающее точки A, B в точки A'', B'' соответственно, является подобием с коэффициентом k_1k_2 .
- 2) При подобии с коэффициентом k для различных точек A и B пространства и их образов A' и B' соответственно имеет место равенство A'B' = k AB. Из этого получаем, что $AB = \frac{1}{k}A'B'$, то есть преобразование, отображающее точки A', B' в точки A, B соответственно, является подобием с коэффициентом $\frac{1}{k}$.

Две фигуры называются *подобными*, если существует преобразование подобия пространства, отображающее одну фигуру на другую. Конгруэнтность фигур – это частный случай подобия (k=1).

Определение. Даны точка O и ненулевое действительное число k. Гомотетией с центром O и коэффициентом k называется преобразование пространства на себя, удовлетворяющее условиям:

- 1. Точка O отображается на себя.
- 2. Если $M \neq O$ и M' образ точки M, то точки O, M и M' коллинеарны. Точка O является внешней точкой отрезка MM' при k>0 и внутренней точкой этого отрезка при k<0.
- 3. Для любой точки M пространства и ее образа M' имеет место равенство OM' = |k|OM (рис. 10.14).






Рис. 10.14

Две фигуры называются *гомотетичными*, если существует гомотетия пространства, отображающая одну фигуру на другую.

Гомотетия – это частный случай подобия.

Задание с решением

\(\) Дан куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$ (рис. 10.15). Построим сечение куба плоскостью так, чтобы сечение было правильным шестиугольником.

Решение:

Сечением куба плоскостью A_1DB является правильный треугольник A_1DB . Рассмотрим гомотетию с центром A и коэффициентом $k=\frac{3}{2}$. Образом плоскости A_1DB при этой гомотетии является плоскость $A_2D_2B_2$, которая

 $A_{1} = \begin{bmatrix} D_{2} & M & C \\ M & D_{2} & M \\ M & D_{3} & M \\ M & D_{4} & M \\ M & D_{1} & M \\ M & D_{1} & M \\ M & D_{2} & M \\ M & D_{3} & M \\ M & D_{4} & M \\ M & D_{4} & M \\ M & D_{5} & M \\ M$


Рис. 10.15

пересекает куб по правильному шестиугольнику MNPQRS. Точки M, N, P, Q, R, S являются серединами ребер DC, CB, BB_1 , A_1B_1 , A_1D_1 и D_1D соответственно.

Задачи

Реальный профиль

- A₁ 1. *Исследуйте!* Приведите примеры подобия из различных областей.
 - 2. Может ли сфера быть подобной кубу?
 - 3. Являются ли подобными куб и его фотография?
 - **4.** $\frac{1}{k \neq 1}$ Сколько инвариантных точек имеет гомотетия с коэффициентом $k \neq 1$? А инвариантных прямых?
- В₁ 5. Ребро одного куба в три раза больше ребра другого куба. Для покраски граней меньшего куба использовали банку краски. Сколько банок краски необходимо для покраски большего куба?
 - **6.** При гомотетии с центром O точка A' является образом точки A. Найдите образы точек B и C (рассмотрите случаи а) и б) данного рисунка).



- 7. Работайте в парах! Три прямые, проходящие через точку O, пересекают параллельные плоскости α и β в точках A, B, C и A_1 , B_1 , C_1 соответственно. Докажите, что треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ гомотетичны.
- **С**₁ **8.** Докажите, что в результате преобразования подобия пересечение и объединение двух фигур отображаются соответственно на пересечении и объединении их образов.
 - 9. Исследуйте! Дано преобразование подобия. Какой фигурой является образ:
 - а) окружности;
- б) круга;
- в) параллелограмма;

- г) квадрата;
- д) куба;
- е) сферы?

§7 Поворот вокруг прямой


Определение. Поворотом с осью l и углом ϕ (или вокруг прямой

І на угол φ) называется такое отображение пространства на себя, при котором каждая точка прямой l отображается на себя, а каждая точка A, не лежащая на прямой l, отображается на такую точку A', что A и A' принадлежат плоскости α , перпендикулярной l, $A_0A = A_0A'$ и $m(\angle AA_0A') = \varphi$, где $A_0 = \alpha \cap l$.

Обозначают: R_l^{φ} .

Считается, что направление поворота (в плоскости α) от точки A к точке A' является одним и тем же для всех точек A, если смотреть в одном и том же заданном направлении прямой l (рис. 10.16).

Прямая l называется осью поворота, а угол φ – углом поворота.



Если $R_l^{\varphi}(F) = F$, то прямая l является осью поворота фигуры F. Можно показать, что поворот вокруг прямой является изометрией.

Определение. Фигура называется фигурой вращения, если существует прямая, любой поворот вокруг которой отображает фигуру саму на себя. Такая прямая называется осью вращения фигуры.

Например, окружность, круг, сфера, цилиндр, конус являются фигурами вращения.

Задание с решением

🕓 Определим оси поворота куба.

Решение:

Рассмотрим куб $K = ABCDA_1B_1C_1D_1$ (рис. 10.17).

Если M – центр грани ABCD, а N – центр гра-

ни
$$A_1B_1C_1D_1$$
, то $R_{MN}^{90^\circ}(K)=R_{MN}^{180^\circ}(K)=R_{MN}^{270^\circ}(K)=$ $=R_{MN}^{360^\circ}(K)=K$.

Таким образом, MN является осью поворота куба. Куб имеет еще две такие оси поворота.

Прямая AC_1 является осью поворота куба на углы в 120°, 240° и 360°.




Рис. 10.17

Такими осями являются еще прямые DB_1 , CA_1 , DD_1 .

Куб имеет еще шесть осей поворота на углы 180° и 360°. Это прямые, которые проходят через середины противоположных ребер куба.

Итак, куб имеет 13 осей поворота.

Задачи

Реальный профиль

- A₁ 1. *Работайте в парах!* Сколько осей вращения имеет:
 - а) сфера;

- б) сфера без одной точки;
- в) сфера без двух точек;
- г) сфера без трех точек?
- В₁ 2. Докажите, что поворот вокруг оси является изометрией.
 - 3. Докажите, что осевая симметрия является поворотом вокруг оси.
 - **4.** Докажите, что любая прямая a, перпендикулярная оси поворота, отображается при данном повороте на прямую a', лежащую в той же плоскости, что и прямая a; угол, образованный прямыми a и a', конгруэнтен углу поворота.
- \mathbb{C}_1 5. Покажите, что если изометрия имеет по крайней мере две инвариантные различные точки A и B и не имеет инвариантных точек, не лежащих на прямой AB, тогда эта изометрия является поворотом вокруг оси AB.
 - **6.** *Исследуйте!* Даны две точки A и B. Укажите поворот, отображающий точку A на точку B. *Какую фигуру образуют оси всех таких поворотов?
 - 7. Даны прямая l и точки A и B такие, что прямые l и AB скрещиваются. Найдите на прямой l такую точку M, чтобы сумма AM + MB была наименьшей.

Задачи на повторение

Реальный профиль


- **A**₁ **1.** Даны две прямые d_1, d_2 и две точки A, C. Найдите точки B, D ($B \in d_1, D \in d_2$) такие, чтобы четырехугольник ABCD был параллелограммом. Обсуждение.
 - **2.** Даны прямая d, окружность $\mathscr C$ и точки A, C. Найдите точки B и D ($B \in d$, $D \in \mathscr C$) такие, чтобы четырехугольник ABCD был параллелограммом. Обсуждение.

В₁ 3. Практическая работа. Изготовление упаковки


Упаковка в форме тетраедра для некоторых молочных продуктов изготавливается путем деформации (трансформации) боковой поверхности картонного цилиндра. Выполните практически следующие преобразования:


Расплющите нижнюю часть цилиндра и приклейте по диаметру AB. Получается ребро A'B' тетраедра. Расплющите верхнюю часть цилиндра и приклейте по диаметру CD, перпендикулярно диаметру AB. Таким образом получается ребро C'D' и сам тетраедр A'B'C'D'.

Пусть AB = CD = 2R, а h – высота цилиндра.



- а) Выразите высоту h цилиндра как функцию от переменной R так, чтобы тетраедр A'B'C'D' был бы правильным. (Внимание! $A'B'=C'D'=\pi R$)
- б) Считая, что тетраедр A'B'C'D' правильный, найдите радиус R основания цилиндра и длину ребра тетраедра так, чтобы вместимость была 1 л. Выразите ответ в сантиметрах, округлив до десятых.
- С₁ 4. В некоторых румынских церквях колокольня построена на квадратном фундаменте и заканчивается правильной восьмиугольной крышей в форме пирамиды (см. рисунок). Зная, что сторона квадрата равна *l*:
 - а) вычислите длину x стороны правильного восьмиугольника;
 - б) предложите способ геометрического построения стороны восьмиуголь-






5. На стороне AB остроугольного треугольника ABC дана фиксированная точка P, а на сторонах AC и BC – переменные точки X и Y соответственно. Найдите точки X_1 и Y_1 такие, чтобы периметр треугольника PX_1Y_1 был наименьшим.

- 6. На бильярдном столе расположены белый шар E и черный шар Y. Определите точки на бортах стола, при отскоке от которых белый шар попадет в черный шар.
- 7. Даны вершины A, B треугольника ABC и прямая d, содержащая биссектрису угла Cтреугольника. Найдите вершину C.



- **8.** Даны пересекающиеся прямые d_1 и d_2 и вектор \overline{a} , неколлинеарный ни с одной из этих прямых. Найдите точки $M_1 \in d_1$ и $M_2 \in d_2$ такие, что $\overline{M_1 M_2} = \overline{a}$.
- **9.** Даны пересекающиеся прямые d_1, d_2 и две различные точки A, B, не лежащие на этих прямых. Постройте параллелограмм ABB_1A_1 так, чтобы $A_1 \in d_1$, $B_1 \in d_2$.
- 10. Дана пирамида ЕАВСD, основанием которой является параллелограмм АВСD.
 - а) Обозначив середины ребер EB и EC соответственно B'и C', покажите, что прямые B'C' и BC параллельны.
 - б) Пусть F точка на ребре AB, $F \neq A$. Покажите, что прямая B'C' пересекает плоскость EDF в точке G. Постройте точку G.
 - в) На плоскости EBC обозначим через B'' точку, симметричную точке B' относительно точки C'. Покажите, что прямые AB' и DB'' параллельны.



Работайте в группах! Проект Приложения геометрических преобразований в искусстве.

Итоговый тест

Время выполнения работы: 45 минут

(3)

(3)

(5)

4

5

(5)

Реальный профиль

- 1. Укажите плоскости симметрии двух пересекающихся плоскостей.
- 2. Укажите оси симметрии двух параллельных прямых.
- 3. Докажите, что две скрещивающиеся прямые имеют три оси симметрии.
- 4. Докажите, что плоскость, проходящая через диагональное сечение куба, является его плоскостью симметрии.
- 5. Какие из следующих фигур являются подобными:
 - а) два куба;
- б) два правильных тетраэдра;
- в) две сферы;

- г) два цилиндра;
- д) два параллелепипеда?
- **6.** На плоскости с ортогональной системой координат xOy даны точки A(2, 1), B(-1, 4), C(-3, -1), D(0, -4). Найдите координаты точек, симметричных этим точкам относительно:
 - a) начала координат O;

 δ) точки A;

в) осей координат;

 Γ) прямой AB.

Схема опенивания теста

Отметка	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Сумма баллов	25–24	23–22	21–19	18–15	14–12	11–8	7–6	5–4	3–2	1-0

Геометрические преобразования пространства

Изометрии

Центральная симметрия

Параллельный перенос

Осевая симметрия Поворот вокруг прямой

Симметрия относительно плоскости Другие геометрические преобразования


Подобие

Осевая симметрия: S_d



- 1. $S_o(O) = O$;
- 2. $\forall M \neq O, S_O(M) = M',$ где O середина отрезка MM'.


Осевая симметрия: 5



Гомотетия


- 1. $\forall M \in d$, $S_d(M) = M$;
- 2. $\forall A \notin d$, $S_d(A) = A'$, где $AA' \perp d$, и если $AA' \cap d = M$, то M середина [MM'].

Симметрия относительно плоскости: S_{α}



- 1. $\forall B \in \alpha$, $S_{\alpha}(B) = B$;
- 2. $\forall A \notin \alpha$, $S_{\alpha}(A) = A'$, где $AA' \perp \alpha$ и точка $\{M\} = AA' \cap \alpha$ середина отрезка AA'.


Параллельный перенос, заданный упорядоченной парой точек (A, A'): $t_{AA'}$




 $\forall M \notin (AA'), \ t_{AA'}(M) = M', \$ где AA'M'M - параллелограмм. $t_{AA'}(C) = C'$

Подобие с коэффициентом k, k > 0


Для любых точек A, B пространства и их образов A', B' имеет место равенство $A'B' = k \cdot AB$.




Поворот с осью l и углом φ : R_i^{φ}



Гомотетия с центром O и коэффициентом k





Ответы и указания

Модуль 1

- § 1. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. А: 2. Например, $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = \frac{1}{n}$. **3.** a) $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{6}$, 1, $\frac{9}{8}$, $\frac{11}{9}$; 6) возрастающая. **В: 5.** Например, a) $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = (-1)^{2n-1} \cdot n$;
- б) $(x_n)_{n\geq 1}, x_n = n+2$. **6.** а) Возрастающая, ограниченная; б) возрастающая, ограниченная;
- в) убывающая, ограниченная. **С:** 7. a) $(a_n)_{n\geq 1}$, $a_n=2n-1$; б) $(a_n)_{n\geq 1}$, $a_n=\frac{1}{2^n}$. **8.** a) Да; б) да; в) нет.

Реальный профиль. A₁: 3. $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{9}{12}$, $\frac{9}{15}$. 4. a) $\frac{11}{10}$, $\left(\frac{11}{10}\right)^2$, $\left(\frac{11}{10}\right)^3$, $\left(\frac{11}{10}\right)^4$, $\left(\frac{11}{10}\right)^5$; б) возрастающая, ограниченная снизу. **6.** a) $\sup X = +\infty$, $\inf X = \frac{1}{2}$; б) $\inf X = -\infty$, $\sup X = -\frac{1}{2}$.

В₁: 7. а) $x_n = 1 - 2n$, $n \in \mathbb{N}^*$; б) строго возрастающая, ограниченная сверху. **8.** а) $x_n = 5n - 15$, $n \in \mathbb{N}^*$, возрастающая, ограниченная снизу; б) $x_n = 4 \cdot 2^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}^*$, возрастающая, ограниченная снизу. C_1 : 10. a) $x_n = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)$, $n \in \mathbb{N}^*$; б) строго возрастающая; в) $1 \le x_n < \frac{3}{2}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

11. a) $\inf A = -\infty$, $\sup A = +\infty$; 6) $\inf B = -\infty$, $\sup B = \sqrt[3]{7}$.

- § 2. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. a) 7, 9, 11, 13;
- 6) -3, 2, 7, 12; B) 1,3; 1,6; 1,9; 2,2; Γ) $\frac{2}{7}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{4}{35}$, $\frac{1}{35}$. **2.** a) $a_1 = 23$; 6) $a_1 = 597$.
- 3. a) -10, -5, $-\frac{5}{2}$, $-\frac{5}{4}$; б) $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. **В:** 5. 23 дм. 6. 1900 мест. 7. 1600 м.

С: 8. 4154,28 лея. **9.** 5760 леев. **10.** 1024 бактерий.

Реальный профиль. A₁: 1. 484. 2. a) $a_n = \frac{n-13}{3}$, $S_{14} = -\frac{77}{3}$; 6) $a_n = \frac{5n+16}{35}$, $S_{25} = \frac{405}{7}$.

- **3.** а) $b_n = 9 \cdot 2^{n-1}$; б) $b_n = 10 \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$. **4.** $S_9 = 70$. **B1: 7.** а) $b_1 = \frac{768}{125}$; $q = -\frac{5}{4}$; б) $b_1 = \frac{1}{2}$; $q = -\frac{1}{2}$. **8.** Указание. Находим числа x, y, z из системы $xz = y^2, x + z = 2(y + a), x(z + b) = (y + a)^2$.
- 9. $\frac{47 \pm \sqrt{1993}}{4}$. 10. a) $b_1 = 0.3$; 6) $b_1 = -\frac{1}{21}$. C₁: 11. $S = \{55\}$. 12. Меньше, чем 2.
- **13.** Haпример, 180 = 12 + 24 + 48 + 96; $180 = \frac{9}{2} + \frac{27}{2} + \frac{81}{2} + \frac{243}{2}$.
- §3. *Реальный профиль*. A₁: 1. Например $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = \frac{1}{2^n}$ сходяшаяся, а $(x_n)_{n\geq 1}$, $x_n = (-1)^{n-1}$ расходящаяся. $\mathbf{B_{1}:5.a}(0,6)(0,8)(0,7)(\frac{1}{3};\pi)(0,e)(0,\pi)(0,3)(2)$. $\mathbf{C_{1}:6.a}(e^{-4};6)(-1,8)(\frac{1}{2};r)(e^{-2})$.

Упраженения и задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. a) $\frac{1}{3}$, 1, $\frac{7}{5}$, $\frac{5}{3}$, $\frac{13}{7}$;

6)
$$\frac{1}{2}$$
, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 1, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}$; B) -6 , $\frac{15}{2}$, $-\frac{20}{3}$, $\frac{29}{4}$, $\frac{-34}{5}$. **2.** a) $x_n = \frac{n}{n+1}$; 6) $x_n = 2n$; B) $x_n = 3 \cdot (-1)^{n-1}$;

г) $x_n = \frac{1}{3^n}$. 3. Например, a) 22, 24, 26, 28, 30; б) 1, -1, 1, -1, ...; в) $x_n = \frac{n}{n+1}$, $n \ge 1$. 4. Не явля-

ется монотонной. **B: 5.** a) $a_n = -4n + 2$; б) $a_n = 2n - 1$; в) $a_n = 5n - 15$; г) $a_n = 7n - 4$. **6.** a) -24550;

6) 4850. **7.** a)
$$b_n = 2 \cdot 6^{n-1}$$
; 6) $b_n = -10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$; B) $b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$. **8.** a) $x_n = 2 \cdot 3^{n-1}$, $q = 3$; 6) $x_n = 2n + 2$,

$$r=2$$
; в) $x_n=-4\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$, $q=\frac{1}{3}$; г) $x_n=5n-6$, $r=5$. **9.** а) $n=10$, $S_n=140$; б) $a_1=4$, $n=8$ или

 $a_1 = -2$, n = 11. **C: 10.** a) q = 2, $S_9 = 2555$; б) $b_1 = 3$, $S_8 = 765$. **11.** За 5 часов. **12.** 313,6 м. **13.** $-1 \pm \sqrt{6}$.

Реальный профиль. $\mathbf{B_1}$: **4.** a) 0; б) 0; в) 0; г) $\frac{1}{3}$; д) 0; е) + ∞ . $\mathbf{C_1}$: **5.** 24 л. ед. **6.** 243 л. **7.** 1224.

8.
$$S_n = n[x^2 + (3-n)ax + a^2]$$
. **9.** a) $+\infty$; б) $+\infty$; в) $-\infty$; г) $-\frac{2}{3}$; д) $\frac{2}{3}$; е) $\frac{1}{2}$; ж) e^{-1} ; з) e ; и) 0.

Итоговый тест

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. 1. a) $\frac{1}{3}$, 1, $\frac{7}{5}$; б) 0, $\frac{2}{3}$, 0.

2. Строго убывающая. **3.** $a_1 = 2$, r = 3 или $a_1 = 14$, r = -3. **4.** $b_1 = 1$, q = -3. **5.** На 6 этаж.

Реальный профиль. 2. $a_1 = \frac{1}{3}$, $r = \frac{1}{4}$. **3.** $b_1 = \frac{30}{7}$, $q = \frac{3}{4}$ или $b_1 = -\frac{30}{7}$, $q = -\frac{3}{4}$. **4.** 9 колец.

Модуль 2

- §1. **Реальный профиль.** A₁: 1. Указание. Покажите, что $(2-r, 2+r) \cap E \neq \emptyset$, $\forall r > 0$.
- **2.** Указание. Покажите, что $\exists \, \varepsilon > 0 \, ; \, (x_1 \varepsilon, \, x_1 + \varepsilon) \cap E \setminus \{x_1\} = \emptyset$. **5.** a) 2; б) $\frac{3}{7}$; в) $-\frac{1}{2}$.

B₁: 6. a) -2, 2; 6) 2, 4; B)
$$\frac{1}{2}$$
, $\frac{1}{2}$, -1, 1. **7.** a) $x_n = 4 + \frac{1}{n}$; 6) $x'_n = -1 + \frac{2}{2n+1}$, $x''_n = \frac{n}{n+1}$.

9. Указание. Исследуйте $\lim_{n\to\infty} f(x_n')$ и $\lim_{n\to\infty} f(x_n'')$ для последовательностей $(x_n')_{n\geq 1}, x_n'\to x_0$, и $(x_n'')_{n\geq 1}, x_n''\to x_0$, которые определяются из условия, что функция синус или косинус принимает, например, одно из значений 0, 1 или –1, и используйте замечание 3. **10.** a) $l_n(2) = 5$, $l_n(2) = 6$; б) $l_n(-1) = l_n(-1) = 1$; $l_n(1) = -\infty$, $l_n(1) = +\infty$. **11.** a) l(0) = 1, $\exists l(1)$; б) l(0) = -2, l(2) = -4.

C₁: 12. a)
$$l_n(k\pi) = -1$$
, $l_n(k\pi) = 1 \Rightarrow \exists \lim_{x \to k\pi} f(x)$; 6) $l_n(k) = k - 1$, $l_n(k) = k \Rightarrow \exists \lim_{x \to k} f(x)$.

- **13.** a) $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$; б) $x_0 \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$; B) $x_0 \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. **14.** a) a = 1, $\lim_{x \to 1} f(x) = 4$; a = -2, $\lim_{x \to 1} f(x) = 1$; б) a = 2, $\lim_{x \to 2} f(x) = 0$; a = -3, $\lim_{x \to 2} f(x) = 5$. **15.** a = 1.
- § 2. *Реальный профиль.* A₁: 1. a) -1; б) $+\infty$; в) $+\infty$; г) $-\infty$; д) $+\infty$; е) ∞ . 2. a) 4; б) $-\infty$; в) $+\infty$;

г)
$$-\infty$$
; д) 55; e) -3 . 3. a) $\frac{1}{2}$; б) $e(e-1)^2$; в) $\frac{1}{2}e$. 4. a) $-\infty$; б) $-\infty$; в) $-\infty$. 5. a) 1; б) 2.

B₁: 6. a)
$$-\frac{2}{5}$$
; б) 0; в) $+\infty$. **7.** a) $-\infty$; б) $+\infty$; в) $+\infty$. **8.** a) $+\infty$; б) 2; в) $-\frac{1}{3}$. **9.** a) $(-1)^n$; б) $3 \cdot (-1)^{n+1}$.

C₁: 11. a)
$$f(\pm 0) = 0$$
, $f(1+0) = f(-1-0) = +\infty$, $f(1-0) = f(-1+0) = -\infty$;

6)
$$f(1+0) = f(-1-0) = 0$$
, $f(1-0) = f(-1+0) = +\infty$; B) $f(-1-0) = 1$, $f(-1+0) = 0$.

- **12.** Указание. См. указание к упражнению 7 из $\S 1$. а) И; б) Л; в) И. **13.** m = -1, m = 2.
- **14.** $m \in [-1, 3]$. **15.** a) 1; б) $-\infty$; в) 0; г) $-\infty$; д) $+\infty$; е) $-\infty$; ж) $-\infty$; з) $-\infty$.
- § 3. Реальный профиль. A₁: 1. a) 3; б) –3; в) $\frac{3}{4}$; г) $\frac{1}{2}$; д) –2; е) $\frac{3}{4}$. 2. a) $\frac{4}{3}$; б) $\frac{5}{4}$; в) $\frac{3}{4}$;

г) 2; д) 3; е)
$$-\frac{1}{2}$$
; ж) $\frac{1}{2}$; з) 3; и) $\frac{1}{2}$. $\mathbf{B_1}$: 3. а) $\frac{3}{2}$; б) $\frac{8}{3}$; в) $e^{\frac{1}{2}}$; г) e^{2} ; д) e^{3} ; е) e^{-1} . 4. а) 2; б) $\frac{9}{2}$;

B)
$$-\frac{2}{3}$$
; Γ) $-\frac{5}{6}$; π) $-\frac{5}{2}$; e) $-\frac{9}{4}$. C_1 : 5. a) $\frac{1}{2}$; 6) $-\frac{1}{3}$; B) -1 ; Γ) $-\frac{1}{3}$; π) $\frac{5}{6}$; e) $-\frac{5}{12}$. 6. a) $+\infty$; 6) $+\infty$;

- B) $-\infty$, Γ) $+\infty$. 7. a) m = -1, n = 4; 6) $n = 2 + \pi$, m = -2.
- § 4. *Реальный профиль.* A₁: 1. a) $\frac{12}{25}$; б) $\left(\frac{3}{2}\right)^5$; в) $\frac{1}{3}$; г) –3; д) 1; е) 0; ж) 2 $\log_2 3$; з) $\frac{3}{5}$;

и)
$$\frac{1}{2}$$
. **2.** a) $-\infty$; б) $\frac{5}{4}$; в) $\frac{1}{5}$; г) 3; д) $-\frac{1}{2}$; е) $\frac{1}{3}$; ж) -1 ; з) -3 ; и) 1. **В**₁: **3.** a) $-\frac{7}{2}$; б) $\frac{2}{3}$; в) $\frac{3}{2}\ln 2$;

г) 0; д) e^{-2} ; е) e^{3} ; ж) $\sqrt{6}$; з) e^{5} ; и) $-\frac{1}{4}$. **4.** а) $\sqrt[3]{e}$; б) $e^{10} \cdot \sqrt{e}$; в) $\sqrt[3]{e}$; г) $\sqrt[4]{e^{3}}$; д) $\sqrt[3]{e^{2}}$; е) C_{n+1}^{2} ; ж) $2^{n(n+1)}$; з) $\frac{n(n-1)}{2}$. **C**₁: **5.** a=1, b=-1. **6.** $+\infty$, если a+2b>0; $-\infty$, если a+2b<0; $-\frac{3b}{4}$, если a+2b=0. **7.** a=2, b=5, $f(-1\pm 0)=\pm\infty$. **8.** a=-3, b=-1.

Упражнения и задачи на повторение

Реальный профиль. A₁: 1. a)
$$\frac{2}{5}$$
; б) $-\frac{1}{2}$; в) $\frac{7}{12}$; г) -3 ; д) -14 ; е) $-\infty$; ж) $\frac{5}{28}$; з) -1 ; и) $\frac{1}{12}$. **2.** a) $-\frac{3}{4}$; б) $-\frac{3}{4}$; в) $-\frac{1}{4}$; г) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; д) $\frac{2}{3}$. **3.** a) $\frac{1}{2}$; б) 1; в) $\frac{4}{3}$; г) $\frac{2}{3}$; д) $\log_{72}\frac{8}{9}$; е) $\frac{1}{3}$.

B₁: **4.** a) 2; б)
$$\frac{2}{5}$$
; в) 3; г) 4; д) e^2 ; е) e^{-1} ; ж) $e^{-\frac{3}{2}}$; з) $\frac{3}{5}$. **5.** a) $-\infty$; б) 0; в) $\frac{1}{2}$; г) $+\infty$; д) $+\infty$;

e) 0.
$$C_1$$
: 6. a) $a \in \{-\frac{1}{2}, 1\}$; 6) $a \in \{\pm 1, \pm 4\}$; B) $a = 5$; r) $a = 0$. 7. a) $a = 1$, $b = -2$;

б) a = -2, b = 3; в) a = 2, b = 4. **8.** а) x = -1, x = 3; б) 600 м; в) 400 м; г) 5,7°; д) 200 м. **9.** а) 5200 м; б) 621 км 480 м; в) 10 м.

Итоговый тест

Реальный профиль. 1. a) -1; б) $\frac{1}{2}$. **2.** a) $l_{\pi}(0) = l_{\pi}(0) = 2$; б) $\lim_{x \to 0} f(x) = 2$. **3.** a) $l_{1} = 2$, $l_{3} = -3$; б) $l = \frac{3}{2}$; в) $l_{2} = 1\frac{1}{4}$; г) $S = \{5, 8\}$. **4.** C.

Модуль 3

- §1. Реальный профиль. А₁: 2. а), б), в) Непрерывна, как элементарная функция.
- **3.** а), б) Непрерывна; в) непрерывна в точке $x_0 = 0$; г) разрывна в точке $x_0 = 0$.
- **4.** а) Непрерывна в точках $x_1 = -1$, $x_2 = 1$; б) непрерывна на множестве $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, $x_0 = 0$ точка разрыва второго порядка.

B₁: **5.** a) *Указание*.
$$\forall x_0 \in \mathbb{R} \Rightarrow |\sin x - \sin x_0| = \left| 2\sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \le 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \le |x - x_0| \Rightarrow$$

 $\forall \varepsilon \ge 0 \;\; \exists \delta > 0 \;\; (\delta < \varepsilon)$ такое, что $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon, \;\; \forall x \in \mathbb{R}, \;\; |x - x_0| < \delta; \; б), \, в)$ и г) выполня-

ется аналогично a). 6. a) $f(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{если } x < 0, \\ 1, & \text{если } x = 0, \\ |x - 1|, & \text{если } x > 0; \end{cases}$ б) f непрерывна на \mathbb{R} . 7. a = 0,

 $a=-\sqrt{2},\ a=\sqrt{2}.$ **8.** a) $x_0=1;\ f(1+0)-f(1-0)=-e$, б) $x_0=-1,\ x_1=0;\ f(-1+0)-f(-1-0)=2,$ f(+0)-f(-0)=1. **C1: 9.** a), б) Непрерывна на [a,b]; в) непрерывна на промежутках $[a,x_0)$ и $(x_0,b].$ **10.** a) Непрерывна на промежутках $[-3,-2),\ [-2,-1),\ (-1,2],\ (2,4]$ и (4,5]; б) $f(-1)\cdot f(0)=2\cdot 1=2,\ f(2)\cdot f(4)=1\cdot 3=3,\ f(0)\cdot f(5)=1\cdot 2=2.$ **11.** a) Непрерывна; б) разрывна в точках $x_1=-1,\ x_2=1.$ **12.** a) $a+be=2,\ a,b\in\mathbb{R};$ б) a=-1. **13.** a) a=3; б) $S=\{e\}.$

§ 2. *Реальный профиль.* A₁: 2. *Указание*. $\lim_{\substack{x \to x_0 \\ x \to x_0}} f_{\pm}(x) = f_{\pm}(x_0), \ \forall x_0 \in I$. 4. а) *Указание*. Пусть $\alpha = -1$, $\beta = 0$. Тогда f(-1) = -1, f(0) = 1 и функция f не принимает на (-1, 0) значений из интервала (0, 1); б) имеем f(0,5) = -0,5 и f(1) = 0, но функция f не принимает на (0,5;1) значений из интервала (-0,5;0); в) функция f принимает только целые значения.

5. Теорема о прохождении функции через нуль неприменима. **B**₁: **8.** a) $S = (e^{-4}, 3)$;

6)
$$S = (-\infty, -4)$$
; B) $S = \left(\frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, 1\right) \cup (10^{10}, +\infty)$. 9. a) $f(x) > 0$ Ha $(-\infty, 0) \cup (a, b) \cup (c, +\infty)$

и f(x) < 0 на $(0, a) \cup (b, c)$; б) f(x) > 0 на $(1, +\infty)$ и f(x) < 0 на $(-\infty, -4) \cup (-4, 1)$.

10. a) f(x) < 0 на $(-\infty, \ln 4)$ и f(x) > 0 на $(\ln 4, +\infty)$; б) f(x) > 0 на $(0, e^2)$ и f(x) < 0 на $(e^2, +\infty)$; в) f(x) < 0 на $(-\infty, \log_2 5)$ и f(x) > 0 на $(\log_2 5, +\infty)$; г) f(x) > 0 на $(-\infty, \log_3 2)$ и f(x) < 0 на $(-\log_3 2, 0)$. C_1 : 11. Указание. Пусть (a, b) – конечный промежуток.

 \widetilde{f} : $[a, b] \to \mathbb{R}$, $\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), \text{ если } a < x < b, \\ \alpha, \text{ если } x = a, \\ \beta, \text{ если } x = b, \end{cases}$ непрерывная на [a, b], значит и ограниченная:

 $m \le (\widetilde{f}(x)) \le M$, $\forall x \in [a,b] \Rightarrow m \le f(x) \le M$, $\forall x \in (a,b)$. Если $(a,b) = (a,+\infty)$ $(a \ne -\infty)$, то $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta > a$, так как $\beta - \varepsilon < f(x) < \beta + \varepsilon$, $\forall x \ge \Delta$. На промежутке (a, Δ) функция f ограниченная: $m \le f(x) \le M, \forall x \in (a, \Delta) \Rightarrow \min(\beta - \varepsilon, m) \le f(x) \le \max(\beta + \varepsilon, M), \forall x \in (a, +\infty).$

Аналогично на промежутках $(-\infty, b)$ и $(-\infty, +\infty)$. 12. $f: (a, b) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{(x-a)(b-x)}$.

Аналогично на промежутках
$$(-\infty, b)$$
 и $(-\infty, +\infty)$. 12. $f: (a, b) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{(x-a)^2}$. 14. Например: a) $f: (0, 1) \to [0, 1]$, $f(x) = \begin{cases} 1, \text{ если } x \in \left(0, \frac{1}{2}\right], \\ -4x + 3, \text{ если } x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right], \\ 0, \text{ если } x \in \left(\frac{3}{4}, 1\right); \end{cases}$

б) $f: (0, 1) \to (0, 1)$, $f(x) = x$; в) $f: (0, 1) \to (0, 1]$, $f(x) = \begin{cases} 2x, \text{ если } x \in \left(0, \frac{1}{2}\right], \\ -2x + 2, \text{ если } x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right). \end{cases}$

б)
$$f: (0,1) \to (0,1), \ f(x) = x; \ в) \ f: (0,1) \to (0,1], \ f(x) = \begin{cases} 2x, \text{ если } x \in \left[0,\frac{1}{2}\right], \\ -2x + 2, \text{ если } x \in \left(\frac{1}{2},1\right) \end{cases}$$

§3. *Реальный профиль.* **A₁: 1.** a) Не имеет асимптот; б) y = x; в) x = 0, y = 3. **2.** Например, $f: \mathbb{R} \setminus \{k\} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{1}{x - \lceil x \rceil}, \ k \in \mathbb{Z}.$ **B**₁: **4.** $a = 3, \ b = -5, \ c = 2.$ **5.** $a = -6, \ b = 4.$

 C_1 : 6. a) y = 0 при $+\infty$ и $-\infty$, $x = \pm 1$; б) y = x при $+\infty$ и y = -x la $-\infty$; в) y = 1 при $+\infty$ и $-\infty$. x = 0. 7. a) x = 0, y = 0; 6) $x = \pm 2$; B) y = 0 при $+\infty$, x = 0; Г) y = x при $+\infty$ и $-\infty$.

Упражнения и задачи на повторение

Реальный профиль. A₁: 2. a) x=1 – точка разрыва первого рода; б) x=1 – точка разрыва второго рода; в) x = -1 – точка разрыва первого рода; г) x = 0 – точка разрыва второго рода. **B**₁: **3.** $a = \frac{1}{2}$, b = 1. **4.** a), б), г) Ограничены; в) неограничена. **6.** a = -1. **C**₁: **9.** a) $S = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$; б) S = (1, 4); в) $S = \left(0, \frac{1}{e^2}\right) \cup (1, +\infty)$. **11.** $a = \frac{1}{4}$.

$$C_1$$
: 9. a) $S = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$; б) $S = (1, 4)$; в) $S = \left(0, \frac{1}{e^2}\right) \cup (1, +\infty)$. 11. $a = \frac{1}{4}$

Реальный профиль. 1. Л, теорема Вейерштрасса. 2. 1) а) b=1 и $\forall a, c, d \in \mathbb{R}$; б) c+d=1и $\forall a, b \in \mathbb{R}$; в) b=1, c+d=1 и $\forall a \in \mathbb{R}$. 2) В случае а) c+d-1; в случае б) 1-b. **4.** a) $S = (-2, 2) \setminus \{0\}$; 6) $S = (0, 1) \cup (2, +\infty)$. **5.** y = 0, x = -1.

Модуль 4

§ 1. Реальный профиль. A₁: 1. a) $\Delta x = 1.5$, $\Delta f = 3.75$; в) $\Delta x = -0.5 - \sqrt{3}$, $\Delta f = 2.75$; r) $\Delta x = -4.7$, $\Delta f = 17.39$. **2.** B) $f'(x) = 6x^2$; r) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. **3.** a) $f'(-1) = f'(0) = f'(0.5) = -\frac{1}{x^2}$ y = f'(10) = 0,5. **4.** а) y = -x + 4, тупой угол; $y = \sqrt{3}x + (3 - \sqrt{3})$, острый угол; б) y = x + 2, острый угол; $y = -\sqrt{3}x + (3+\sqrt{3})$, тупой угол; в) y = 0, нулевой угол; $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{9-\sqrt{3}}{3}$, острый угол.

- **B₁: 5.** б) Функция f не дифференцируема в точках $x_0 = -2$ и $x_1 = 2$. **7.** а) Функция f не дифференцируема в $x_0 = 0$; б) функция f дифференцируема в $x_0 = 0$.
- **C**₁: **8.** а) $m \in \mathbb{Z}$, m > 1; б) $n \in \mathbb{N}^*$, $n \ge 2$. **9.** n = 0, $m = \frac{2}{e}$. Указание. Для нахождения параметров m и n рассмотрите условия непрерывности и дифференцируемости функции в точке $x_0 = e$. **10.** $a \in \mathbb{R}$, b = 1, c = 1.
- § 2. *Реальный профиль*. **A**₁: **1**. a) f дифференцируема в точках x_0 и x_1 ; б) f дифференцируема в x_1 и не дифференцируема в x_0 ; в) f дифференцируема в x_1 и не дифференцируема в x_0 и x_2 . **3**. a) y = 3x 2; б) y = -1; в) y = 4x + 6. **4**. a) 0°; б) 60°. **B**₁: **6**. a) f не дифференцируема в $x_0 = -3$ и $x_1 = 3$; б) f не дифференцируема в $x_0 = 10$. **7**. a) 1) y = x + 0.75;
- 2) y = 6x 3; 3) y = -8x 24; 6) 1) $y = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{(4 \pi)\sqrt{2}}{8}$; 2) $y = \frac{1}{2}x + \frac{3\sqrt{3} \pi}{6}$;
- 3) $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{\pi\sqrt{3} 6}{12}$. **8.** a) 1) Функции f, g, h непрерывны на множестве \mathbb{R} ; 2) f дифференцируема на множестве $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; g дифференцируема на множестве $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; h дифференцируема на множестве $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$. **9.** (2, -1). **10.** (2, 4). **11.** arctg3. **12.** (1, -1); $\left(-\frac{1}{9}, -\frac{13}{243}\right)$. **13.** y = 10x 12, y = 12 2x. \mathbb{C}_1 : **14.** b = 4, c = 1. **15.** б) $y = \frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4} \frac{1}{2}$.
- § 3. Реальный профиль. A₁: 1. a) $f'(x) = 8x^7$, $D_{f'} = \mathbb{R}$; б) $f'(x) = -7x^{-8}$, $D_{f'} = \mathbb{R}^*_+$;
- в) $f'(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$, $D_{f'} = \mathbb{R}^*_+$; г) $f'(x) = 3^x \ln 3$, $D_{f'} = \mathbb{R}$; д) $f'(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \ln \frac{1}{2}$, $D_{f'} = \mathbb{R}$;
- e) $f'(x) = \frac{1}{x \ln 3}$, $D_{f'} = \mathbb{R}^*$; \mathbf{x}) $f'(x) = -\frac{1}{x \ln 3}$, $D_{f'} = \mathbb{R}^*$; \mathbf{x}) $f'(x) = \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}}$, $D_{f'} = \mathbb{R}^*$.
- **2.** a) $\frac{1}{7 \ln 7}$; 6) $\frac{10}{\ln 10}$; B) 120; Г) $\frac{1}{14}$; Д) 32 ln 2; e) 0. **3.** a) $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$; 6) $y = x \ln 2 + 1$;
- B) $y = x \log_8 \sqrt{e} + \log_8 \frac{2}{e}$; r) y = 5x + 4. **4.** a) f'(0) = 1, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$; 6) f'(0) = 0, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$.
- **B**₁: **5.** a) $f'(x) = 1,5\sqrt{x}$, $D_{f'} = \mathbb{R}_+$; 6) $f'(x) = 3,4x^2$, $D_{f'} = \mathbb{R}$. **6.** a) $f'(x) = \frac{1}{7\sqrt[3]{x^6}}$, $D_{f'} = \mathbb{R}^*$;
- 6) $f'_{\pi}(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \ x > 0; \ f'_{\pi}(x) = \frac{1}{-2\sqrt{-x}}, \ x < 0; \ D_{j'} = \mathbb{R}^*; \ \text{B)} \ f'(x) = \frac{1}{x^2 \ln 0.4}, \ D_{j'} = \mathbb{R}^*;$
- $\Gamma(x) = 2^{x} \ln 2, \ x > 0; \ f'_{\pi}(x) = 2^{-x} \ln 2, \ x < 0; \ D_{f'} = \mathbb{R}. \ 7. \ a) \ f'_{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, \ f'_{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1;$
- 6) $f'_n(0) = 2$, $f'_n(0) = -2$; B) $f'_n(0) = 3$, $f'_n(0) = -2$. **8.** a) y = -42x 63; 6) $y = \frac{1}{2}x + \frac{3\sqrt{3} \pi}{6}$;
- B) $y = \frac{3x}{27 \ln 27} + \frac{\ln 9 1}{\ln 3}$; r) $y = 2.5x \ln 2.5 + 2.5(1 \ln 2.5)$. C₁: 9. m = 1, n = 0. 10. a) m = n;
- 6) m = n = 1. **11.** $a \in [-2, 0] \cup [\sqrt{2}, 2]$.
- **§ 4.** *Реальный профиль.* **A₁: 1.** a) 1) $f'(x) = 30x^5$; 2) $f''(x) = 150x^4$; 3) $f'''(x) = 600x^3$;
- 6) 1) $f'(x) = \pi e^x$; 2) $f''(x) = \pi e^x$; 3) $f'''(x) = \pi e^x$; B) 1) $f'(x) = \frac{1}{x \ln 9}$; 2) $f''(x) = -\frac{1}{x^2 \ln 9}$;
- 3) $f'''(x) = \frac{2}{x^3 \ln 9}$; r) 1) $f'(x) = 3x^2 10x$; 2) f''(x) = 6x 10; 3) f'''(x) = 6.
- **2.** a) $D_f = \mathbb{R}_+$, $f'(x) = \frac{2\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x}}$, $D_{f'} = \mathbb{R}_+^*$; 6) $D_f = \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{1}{x \ln 3} + 5x^4$, $D_{f'} = \mathbb{R}_+^*$;
- B) $f'(x) = e^x(1+x)$, $D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$; Γ) $D_f = \mathbb{R}^*_+$, $f'(x) = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x}$, $D_{f'} = \mathbb{R}^*_+$;

д)
$$D_f = \mathbb{R}_+^*$$
, $f'(x) = -\frac{\log_3 x}{3\sqrt[3]{x^2}} - \frac{\sqrt[3]{x}}{x \ln 3}$, $D_{f'} = \mathbb{R}_+^*$; e) $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}$, $D_f = D_{f'} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$;

ж)
$$D_f = \mathbb{R}^*$$
, $f'(x) = -\frac{2x}{(x^2+2)^2}$, $D_{f'} = \mathbb{R}$; з) $f'(x) = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$, $D_f = D_{f'} = \mathbb{R}^*_+ \setminus \{1\}$; и) $f'(x) = \frac{e^x(x-4)}{(x-3)^2}$,

$$D_f = D_{f'} = \mathbb{R} \setminus \{3\}; \ \kappa) \ f'(x) = \frac{4x-1}{2\sqrt{2x^2-x}}, \ D_f = (-\infty; 0] \cup [0,5; +\infty), \ D_{f'} = (-\infty; 0) \cup (0,5; +\infty);$$

л)
$$D_f = \mathbb{R}_+^*$$
, $f'(x) = -\frac{4}{x \ln 2}$, $D_{f'} = \mathbb{R}^*$. 3. a) $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$; б) $\log_5 0.5 + \frac{2}{\ln 5}$. 4. a) $v(t) = -t^2 + 6t + 7$;

6) 15 m/c; B) 7 c. **5.** a)
$$t_1 = 1$$
 c, $t_2 = 2$ c; 6) $v_1(t) = 12t + 4$, $a_1(t) = 12$; $v_2(t) = 3t^2 + 6t + 6$,

$$a_2(t) = 6t + 6$$
; B) $v_1(1) = 16$ m/c, $v_1(2) = 26$ m/c, $a_1(1) = a_1(2) = 12$ m/c²; $v_2(1) = 15$ m/c, $v_2(2) = 30$ m/c,

$$a_2(1) = 12 \text{ м/c}^2$$
, $a_2(2) = 18 \text{ м/c}^2$; г) $v_1(t) = v_2(t)$ в моментах времени $t_1 = \frac{3 - \sqrt{3}}{2}$ с и $t_2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$ с,

 $a_1(t) = a_2(t)$ в моменте времени t = 1 с.

B₁: **6.** a)
$$f'(x) = 25x^{24} - \frac{1}{2\sqrt{x}} - \sin x$$
; б) $f'(x) = \cos x + \frac{1}{x \ln 0.3} - \frac{1}{5 \cdot \sqrt[5]{x^4}}$; в) $f'(x) = \frac{5}{x} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3x}} + \frac{10}{x^3}$;

$$\Gamma(x) = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[6]{32x^5}} + 7e^x + \frac{3}{x^{10}}; \text{ д}) f'(x) = -\sqrt{5}\sin x - 7\cos x - \frac{4}{x}; \text{ e) } f'(x) = 5\left(\frac{\sin x}{4\sqrt[4]{x^3}} + \sqrt[4]{x}\cos x\right);$$

ж)
$$f'(x) = 8x^2(3\ln x + 1)$$
; 3) $f'(x) = 3x^{-6}(\log_3 x - 0.2\log_3 e)$; и) $f'(x) = \frac{10x - 15}{x^2 - 3x}$;

κ)
$$f'(x) = \frac{6\sqrt{2}\log_3^2 \operatorname{tg} x}{\sin 2x \ln 5}$$
; π) $f'(x) = 3 \cdot 6^{3x} \cdot \ln 6 \cdot \sin^2 4x + 4 \cdot 6^{3x} \cdot \sin 8x$;

M)
$$f'(x) = \frac{-6x^2 \cdot \ln x \cdot \sin(3x^2 - 1) - 2 \cdot \cos(3x^2 - 1)}{x \ln^3 x}$$
. 7. a) $y = \sqrt{3}x + \left(\frac{1}{4} - \frac{\pi\sqrt{3}}{3}\right)$; 6) $y = 0$;

в)
$$y = \sqrt{3} \cdot x + 1 - \sqrt{3}$$
. **8.** $a \in \mathbb{R}$, $b = 2$, $c = 1$. **9.** Например, a) $f(x) = 2x - \sin x + 2008$;

6)
$$f(x) = -e^{2x} - 100$$
. **10.** a) $S = \{(-1)^{n+1} \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2} | n \in \mathbb{Z}\}; \text{ 6) } S = \{(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2} | k \in \mathbb{Z}\}.$

11. a)
$$S = (-\infty, 2 - \sqrt{3}) \cup (2 + \sqrt{3}, +\infty)$$
; б) $S = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(-\frac{\pi}{36} + \frac{k\pi}{3}, \frac{7\pi}{36} + \frac{k\pi}{3} \right)$. Указание. Решите нера-

венство $\sin(6x-\pi) < \frac{1}{2}$. 12. a) f''(x) = 12x - 10; б) $f''(x) = -18\sin 3x$; в) $f''(x) = 20e^{-2x}$;

$$f''(x) = -\frac{3}{(3-x^2)\sqrt{3-x^2}}; \text{ } \text{ } \text{ } f''(x) = -\frac{1}{x^2}; \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } f''(x) = -\frac{x}{27\sqrt{\left(1-\frac{x^2}{9}\right)^3}}; \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } \text{ } f''(x) = -\frac{4}{(x+1)^3};$$

и)
$$f''(x) = (\sqrt{x})^{x-1} \cdot \left[\left(\ln \sqrt{x} + \frac{x-1}{2x} \right)^2 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2} \right]$$
. Указание. Примените дважды формулу

$$(\ln x)' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$
. 13. $-\frac{2x}{(x^2+1)^2} - \frac{5}{x^2+1} + 3 \operatorname{arctg} x$. 14. a) 24; 6) $\frac{3}{8} \sin \frac{x}{2}$; B) $-27\sqrt{2}e^{-3x}$;

r)
$$-\frac{6}{(x-2)^4}$$
; e) $\frac{2}{x^3}$. **16.** 70m N. **17.** a) 28 m/c; 6) 10 m/c²; B) 24010 kr²/c².

18. a) ≈10,2 c; б) ≈ 510,204 c; в) ≈10,2 c; г) ≈100 м/с. **C**₁: **21.**
$$x \in \left\{0, \frac{\pi}{6}\right\}$$
. **23.** $m = 1, n = -1$.

§ 5. **Реальный профиль.** A₁: 1. a)
$$df(x) = (3x^2 + 2)dx$$
; б) $df(x) = \frac{dx}{(1-x)^2}$;

B)
$$df(x) = \cos(x+1)dx$$
; π $df(x) = -2\sin 2x dx$. **2.** a) $df(x) = (\log_2 x + \log_2 e)dx = \log_2(ex)dx$;

6)
$$df(x) = 2xe^{4x}(1+2x)dx$$
, B) $df(x) = \left[ctg(x+5) - \frac{x}{\sin^2(x+5)} - \frac{1}{x}\right]dx$; Γ $df(x) = \frac{9}{x}dx$

3. a)
$$-\frac{2}{3}dx$$
; 6) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}dx$; B) $\frac{1}{\ln 4}dx$. **B**₁: **4.** a) $df(x) = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 20x^3 + \frac{7}{x^8}\right)dx$;

6)
$$df(x) = \left(-2 \cdot e^{-x} \cdot \ln 3 - \frac{2x}{x^2 - 1}\right) dx$$
; B) $df(x) = \left(\frac{2\sin x}{\cos^3 x} - \frac{2x - 1}{5\sqrt[5]{(x^2 - x)^4}}\right) dx$. **5.** a) $2\frac{1}{8} dx$;

б) не существует; в)
$$\frac{1}{3}$$
 d x ; г) $28e^4$ d x . 6. а) $\frac{2\ln(x-1)}{x-1}$ d x ; б) $\frac{2x}{x^2-5}$ d x . 7. а) $4x^3\sin 2x^4$ d x ;

6)
$$\frac{1}{x(1+\ln^2 x)} dx$$
; B) $\frac{10\text{ctg}\frac{2}{x}\ln 5}{\left(x\sin\frac{2}{x}\right)^2} dx$ C_1 : 8. a) $(x^{\sin x}(\cos x) \cdot \ln x + x^{\sin x - 1} \cdot \sin x) dx$; 6) $(x^{\ln x - 1} \cdot \ln^x \sqrt{x^2}) dx$;

в)
$$((x-1)^{3x} \cdot 3\ln(x-1) + 3x(x-1)^{3x-1}) dx$$
. **9.** a) 1) Функция f не дифференцируема в $x=1$;

2)
$$\mathrm{d}f(x) = -e^{-|x-1|} \frac{x-1}{|x-1|} \mathrm{d}x, \ x \neq 1; \ 6)$$
 2) $\mathrm{d}f(x) = \begin{cases} -(x+2)e^x \mathrm{d}x, \ \mathrm{если} \ x \in (-\infty, -1), \\ (x+2)e^x \mathrm{d}x, \ \mathrm{если} \ x \in (-1, 0), \\ -xe^{-x} \mathrm{d}x, \ \mathrm{если} \ x \in (0, +\infty). \end{cases}$

§ 6. *Реальный профиль*. **A**₁: **1**. a) x_0 ; б) x_0 , x_2 ; в) x_2 ; г) x_2 ; д), е) ни в одной из указанных точек. **2**. a) 1) $S = \left\{\frac{1}{4}\right\}$; выполняются условия теоремы Ферма; б) 1) $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$; выполняются условия теоремы Ферма. **3**. a) Да; б) нет. **B**₁: **6**. б) $c_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $c_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **7**. a) c = 1; б) функтировия теоремы Ферма.

условия теоремы Ферма. 3. а) Да; б) нет. В₁: 6. б) $c_1 = -\frac{\pi}{3}$, $c_2 = \frac{\pi}{3}$. 7. а) c = 1; б) функция f не дифференцируема в $x_0 = 2$; в) c = 0; г) $c = \frac{\pi}{2}$. 8. а) a = 7, b = -3, d = -1; б) $c = -\frac{3}{14}$.

9. Указание. Примените следствие теоремы Ролля. **10.** Указание. Исследуйте функцию $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x \cdot 2^x - 2 \cdot x^{10} + 2.$ **12.** a) c = -0.5; б) $c = \frac{3\sqrt{3}}{e}$; в) теорема Лагранжа не может быть применена к функции f, так как она не дифференцируема на интервале (0, 3);

г) $c = \ln \frac{e^5 - 1}{5e}$. 14. f'(x) = 7. Указание. Примените следствие 3 теоремы Лагранжа.

16. f дифференцируема в $x_0 = 1$ и f'(1) = 2. **17.** а) -2; б) ∞ ; в) $-\frac{1}{3}$; г) 1; д) 0; е) 0; ж) 1; з) 0. **18.** а) 1; б) 1; в) e^3 . **19.** а) 0; б) 0; в) 0.

Упражнения и задачи на повторение

Реальный профиль. A₁: 1. B. 2. D. 3. a) И; б) y = 2x - 1; в) $S = \mathbb{R}^*$; д) O(0, 0).

4. a)
$$S = \{0, 1\frac{1}{3}\}$$
; 6) $S = \{e^{-1}\}$; B) $S = \{0\}$. **5.** $S = [0, +\infty)$. **6.** a) 4 c; 6) 6 c.

B₁: 7. a)
$$(\cos x)\sin(\sin x)dx$$
; 6) $(-\sin x)\cos(\cos x)dx$; B) $\frac{1}{x\ln x}dx$. 8. a) $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$;

6)
$$S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$
; B) $S = \{0\}$. **9.** a) 1) $f'_{n}(0) = f'_{n}(0) = 0$; 2) $f'_{n}(3) = 0$, $f'_{n}(3) = 3$;

3) $f_n'(0) = 2$, $f_n'(0) = 0$. 11. Указание. Примените следствия теоремы Ролля. 12. Функция f непрерывна на $[1, +\infty)$, но не дифференцируема в точке $x_0 = 2$. 14. $c = \frac{1}{2}$. 15. а) Функция f удовлетворяет условиям теоремы Ролля и c = 2; б) функция f удовлетворяет условиям теоремы Ролля и $c = \frac{\pi}{2}$; в) функция f удовлетворяет условиям теоремы Ролля и $c = \frac{12 \pm \sqrt{3}}{3}$.

16.
$$\frac{2}{3}$$
. **C**₁: **18.** $S = \{0, 1\}$. **19.** a) $m = -1$; 6) в момент времени $t = 0$, $v(0) = -1$, $a(0) = -3$; в момент времени $t = \frac{\pi}{4}$, $v\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2e^{-\frac{\pi}{4}}$, $a\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4e^{-\frac{\pi}{4}}$. **20.** $a \in \left\{1, \frac{9}{7}\right\}$.

Итоговый тест

Реальный профиль. 1. a) И; б)
$$S = \left\{ (k+1)\frac{\pi}{6} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$
; в) $y = 6x - (6\pi + 1)$; г) $\frac{18}{\cos^2 \left(3x - \frac{\pi}{4}\right)} dx$.
2. $e^{-\frac{1}{2}}$. **3.** a) $a = \ln 2$, $b = 0$, $d = 1$; б) $c = 0$. **4.** 1,5 c.

Модуль 5

§ 1. **Реальный профиль.** A_1 : 1. a) f(-2) = f(2) = -4 – минимум, f(0) = 12 – максимум; б) f(1) = 4 – минимум; в) f(-5) = 0 – максимум, f(1) = -324 – минимум; г) $f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$ – максимум, $f(\sqrt{2}) = -4\sqrt{2}$ – минимум; д) f(1) = 0 – минимум, f(-1) = 4 – максимум; е) f строго возрастающая. 2. a) m = -7, M = 9; б) $m = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$, M = 120.

В₁: 3. а) $(-\infty, 1]$ /, [1, 3] \(, $[3, +\infty)$ /; [6] $(0, \frac{1}{\sqrt{e}}]$ \(, $[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty)$ /; [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (3, +\infty) \); [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{3}, \sqrt{3}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{3}, \sqrt{3}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{3}, \sqrt{3}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{3}, \sqrt{3}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{3}, \sqrt{3}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{3}, \sqrt{3}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{3}, \sqrt{3}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{3}, \sqrt{4}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{6}, \sqrt{6}) \) /, [6] (0, $-\infty, 3$) \(, (\sqrt{6}, \sqrt{7}) \) /, [6] (0,

С₁: **10.** a) $f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}(x-1)^{-\frac{1}{3}}$, $x \neq 0$, $x \neq 1$; 6) $(-\infty, 0) \setminus$, $(0, 1) \nearrow$, $(1, +\infty) \setminus$; в) из 6) следует, что $f(3) > f(5) \Rightarrow \sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{4} > \sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{16} \Rightarrow \sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{16} > \sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{4}$. **12.** $m = -\pi$, $M = \pi$.

§2. *Реальный профиль*. A_1 : 1. а) Выпукла вверх на $(-\infty, -3)$ и выпукла вниз на $(-3, +\infty)$; б) выпукла вниз на $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ и выпукла вверх на $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$; в) выпукла вверх

на интервалах $(2k\pi,(2k+1)\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$, и выпукла вниз на интервалах $((2k+1)\pi,(2k+2)\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$; г) выпукла вверх на $(-\infty,0)$ и выпукла вниз на $(0,+\infty)$; д) выпукла вниз на $(-\infty,0)$ и выпукла вверх на $(0,+\infty)$; е) выпукла вверх на $\left(0,e^{-\frac{3}{2}}\right)$ и выпукла вниз на $\left(e^{-\frac{3}{2}},+\infty\right)$; ж) выпукла вниз на интервалах $\left(e^{2k\pi-\frac{\pi}{4}},e^{2k\pi+\frac{3\pi}{4}}\right)$, $k\in\mathbb{Z}$, и выпукла вверх на интервалах $\left(e^{2k\pi+\frac{3\pi}{4}},e^{2k\pi+\frac{7\pi}{4}}\right)$, $k\in\mathbb{Z}$, и выпукла вверх на интервалах $\left(e^{2k\pi+\frac{3\pi}{4}},e^{2k\pi+\frac{7\pi}{4}}\right)$, $k\in\mathbb{Z}$, и выпукла вверх на интервалах $\left(e^{2k\pi+\frac{3\pi}{4}},e^{2k\pi+\frac{7\pi}{4}}\right)$, $k\in\mathbb{Z}$. 2. Указание. Сначала определите точки, в которых f''=0, и

точки, в которых f'' не существует или равна бесконечности, а затем исследуйте знак f'' в окрестности найденных точек.

§ 3. Реальный профиль. B_1 : 3. в) $\mathcal{A}_{max} = \frac{a^2}{2}$.

§ 4. *Реальный профиль.* A_1 : 1. a) v(0) = s'(0) = 12 м/с. б) Через 2 с. Расстояние равно 16 м. 2. $v(t) = 3at^2 + b$; a(t) = v'(t) = 6at. 3. Указание. $v(t) = 3t^2 - 12t$; a(t) = 6t - 12, $a(t) = 0 \Rightarrow t = 2$, $v_{\min} = v(2) = -12$. B_1 : 4. R = r, $P_{\max} = P(r) = \frac{E^2}{4r}$. C_1 : 6. 4 225 леев. 7. Указание. Доход $B(x) = p(x) \cdot x - C(x)$. x = 11 ед., $B_{\max} = 479$ д. ед. 8. AM = 64 км.

Упражнения и задачи на повторение

A₁. 1. а)
$$(-\infty, -4]$$
 /, $[-4, 0] \setminus$, $[0, +\infty)$ /; б) $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right]$ /, $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right] \setminus$, $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right]$ /.

2. а) $(-\infty, -1] \setminus$, $[-1, +\infty)$ /; б) $(-\infty, 0]$ /, $[0, 1] \setminus$, $[1, +\infty)$ /; в) $(-\infty, -2] \setminus$, $\left[-2, -\frac{1}{2}\right]$ /, $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right]$ /; г) $\left(-\infty, \frac{4}{5}\right]$ /, $\left[\frac{4}{5}, 2\right] \setminus$, $[2, +\infty)$ /; д) $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right] \setminus$, $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$ /, $\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right] \setminus$; е) $(-\infty, 1] \setminus$, $[1, +\infty)$ /. 3. а) $(-\infty, -1] \setminus$, $[-1, +\infty)$ /; б) $\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right] \setminus$, $\left[-\frac{3}{2}, 0\right]$ /, $\left[0, \frac{3}{2}\right] \setminus$, $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right]$ /; в) $\left(-\infty, -2\right]$ /, $\left[-2, 2\right] \setminus$, $\left[2, +\infty\right]$ /; г) $\left(-\infty, +\infty\right)$ /; д) $\left(-\infty, -1\right]$ /, $\left[-1, 1\right] \setminus$, $\left[1, +\infty\right]$ /; е) $\left(-\infty, -\frac{2}{5}\right]$ /, $\left[-\frac{2}{5}, 0\right] \setminus$, $\left[0, +\infty\right]$ /. 4. а) $m = -3$, $M = 2$; б) $m = \frac{6-2\sqrt{3}}{3}$, $M = 8$.

6. а) $a = 2$; б) $a = -\frac{3}{2}$. 7. $B_{\text{max}} = B(39) = 4$ 443 лея. B₁. 9. а) $\left(-\infty, -1\right] \setminus$, $\left[-1, +\infty\right]$ /; б) $\left(-\infty, -1\right] \setminus$, $\left[-1, 1\right]$ /, $\left[1, +\infty\right] \setminus$; в) $\left(0, e^{-\frac{1}{2}}\right) \setminus$, $\left[e^{-\frac{1}{2}}, +\infty\right]$ /. 10. $m \in (-\infty, -1] \setminus$ 11. а) Выпукла вверх на $\left(-\infty, -1\right)$ и выпукла вниз на $\left(-\infty, -1\right)$ и выпукла вниз на $\left(-\infty, 0, 1\right)$ и $\left(0, \sqrt{3}\right)$ и выпукла вниз на $\left(-\sqrt{3}, 0\right)$ и $\left(\sqrt{3}, +\infty\right)$; г) выпукла вниз на $\left(-\infty, 0\right)$ и $\left(0, +\infty\right)$. 12. а) $x = 0$; б) $x = 0$; в), г) не имеет точек перегиба; д) $x = e$; е) $x = 0$, $x = 4$. 16. а) $m \in [0, 1]$; б) $m \in \emptyset$; в) $m \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$; г) $m = 1$. 17. $x = 26$, $B_{\text{max}} = B(26) = 336$ леев. 18. $a \in (-\infty, -1] \cup \{0\} \cup [1, +\infty)$. 19. Ширина $\frac{40}{3}$ м, длина 30 м.

Итоговый тест

Реальный профиль. 1. A. 3. $m = -\infty$, $M = 2 \ln 2$. **5.** $V_{\text{max}} = 1000$ д. ед. и получается для налога в 50 д. ед. на единицу продукции.

Модуль 6

§ 1. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. a) 3+2i; б) 2-2i; в) $\sqrt{3}+\sqrt{2}+(1-\sqrt{3})i$; г) 14+2i; д) $\sqrt{6}+\sqrt{3}+(\sqrt{2}-3)i$; е) $\frac{1}{13}(8-i)$; ж) $\frac{1}{10}(3-i)$; 3) 25-22i; и) -2+2i. 2. 1) а) i; б) -1; в) 1; г) -i; д) 1; г) -i; д) 1; г) k=2n, k=2n. B: 3. а) k=3n, k=3

6)
$$S = \left\{\frac{1}{2}((2+i)z_z - i, z_z), z_z \in C\right\}$$
 8. a) $\{-1\pm i\}$; 6) he cymectbyet; 8) he cymectbyet.
Peathboli produmb. A₁: 1. a) $-1+2i$; 6) $6-2i$; 8) $\sqrt{3}+\sqrt{2}-(1+\sqrt{3})i$; r) $-10-10i$; a) $\sqrt{6}-\sqrt{3}-(3+\sqrt{2})i$; e) $\frac{2}{5}-\frac{1}{5}i$; x) $\frac{3}{10}+\frac{1}{10}i$; 3) $21-20i$; n) $2+2i$. 2. 1) a) $-i$; 6) 1; b) 1; r) $-i$; a) -1 ; 2) $k=2n$, $n\in\mathbb{Z}$. 3. a) $x=\frac{37}{17}$, $y=\frac{20}{11}$; 6) $x=\frac{1}{7}$, $y=-\frac{2}{7}$; B) $x=-\frac{7}{5}$, $y=-\frac{8}{5}$; r) $x=-\frac{3+4\sqrt{3}}{3}$, $y=8+\sqrt{3}$. 4. a) $S=\left\{\frac{3-i\sqrt{15}}{4},\frac{3+i\sqrt{15}}{4}\right\}$, 6) $S=\left\{\frac{1-i\sqrt{5}}{2},\frac{1+i\sqrt{5}}{2}\right\}$, e) $S=\left\{-\frac{-1-i\sqrt{4}\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}},\frac{-1+i\sqrt{4}\sqrt{2}-1}{2\sqrt{2}}\right\}$, n) $S=\left\{\frac{1-3i}{2},\frac{1+3i}{2}\right\}$, e) $S=\left\{\frac{-2-i\sqrt{31}}{5},\frac{-2+i\sqrt{31}}{5}\right\}$, x) $S=\left\{\frac{5-i\sqrt{127}}{4},\frac{5+i\sqrt{127}}{4}\right\}$, 3) $S=\{1-i,1+i\}$; ii) $S=\{-2-i,-2+i\}$. 5. a) 4; 6) $-52i$. 6. a) $S=\{1+2i\}$; 6) $S=\left\{\frac{1}{5}(2-4i)\right\}$, b) $S=\{-\frac{5}{3}+5i\}$, r*) $S=\left\{\frac{1}{2}(4-3i)\right\}$. B): 7. a) $S=\{1-i,-\frac{1}{3}\}$; 6) $S=\left\{\frac{1}{2}((2+i)z_2-i,z_2),z_2\in C\}$. 8. a) $\{1\pm i\}$; 6) he cymectbyet; 8) (3i). 9. a) 0; 6) $\frac{1}{130}(19-3077i)$. 10. a) z^4+4 ; 6) z^4-1 ; 8) a^2-ab+b^2 . C₁: 13, $\frac{1\pm\sqrt{2}}{2}+\frac{1\pm\sqrt{2}}{2}$. 14. a) A ₁; 6) her; b) $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$. 82. **Peathboli in produmb.** A₁: 1. 6) A ₂ decomposite bilinear unchase un

C: 6. a) $S = \{2 - i\}$; 6) $S = \{\frac{-1}{29}(1 + 12i)\}$; B) $S = \{\frac{1}{3}(9 - 13i)\}$; Γ^*) $S = \{2 + i\}$. 7. a) $S = \{1 - i, -\frac{1}{3}\}$;

4. a)
$$S = \left\{ -i, i, \frac{-5 - \sqrt{21}}{2}, \frac{-5 + \sqrt{21}}{2} \right\}$$
; 6) $S = \left\{ 2 \pm \sqrt{3}, -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$; B) $S = \left\{ -1, \frac{5 - \sqrt{21}}{2}, \frac{5 + \sqrt{21}}{2} \right\}$

С₁: **6.** а) –5i; б) 5; в) не принадлежит.

Упражнения и задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. a) 1+2i; б) 2-2i;

в)
$$-10-10i$$
; г) $\frac{2}{5}-\frac{1}{5}i$; д) $-i$; е) 1; ж) $-i$. 3. а) $S = \{\pm 2i\}$; б) $S = \{\pm 4+3i\}$; в) $S = \{\frac{1}{2}(-1\pm i)\}$.

B: 4. 1. **5.** a)
$$-4(\sqrt{3}+i)$$
; 6) $-\frac{1}{4}$. **C: 6.** a) $2+i$; 6) $\frac{127}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$; B) $-i$; Γ) $\frac{12}{13}+\frac{5}{13}i$. **7.** $z=\frac{\sqrt{3}}{3}-i$.

Реальный профиль. A₁: 1. a) 1-2i; б) 2+2i; в) -10+10i; г) $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i$; д) i; е) 1; ж) i.

3. a)
$$S = \{\pm 3i\}$$
; 6) $S = \{\pm 4 + 2i\}$; B) $S = \{\frac{1}{2}(1 \pm i)\}$. **4.** 1. **5.** a) $-4(\sqrt{3} - i)$; 6) $-\frac{1}{4}$. **6.** a) $2 + i$;

6)
$$\frac{127}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$
; B) $-i$; r) $\frac{12}{13} + \frac{5}{13}i$. **B**₁: 7. $z = \frac{\sqrt{3}}{3} + i$. **8.** -64 . **9.** a) $S = \left\{ \frac{-3 + \sqrt{21}}{2}i, \frac{3 - \sqrt{21}}{2}i \right\}$;

б)
$$S = \left\{ \frac{\sqrt{3}}{3} + i \right\}$$
; в) $S = \{1 + i\}$; г) $S = \{0, \pm i\}$; д) $S = \{1 - i; 0, 8 - 0, 4i\}$.

10. a)
$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$$
; 6) $\cos\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$

11. a)
$$\left\{ \sqrt[3]{4} (\cos \varphi_t + i \sin \varphi_t) | \varphi_t \in \left\{ \frac{2\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}, \frac{14\pi}{9} \right\} \right\}$$

6)
$$\left\{ \sqrt[3]{\frac{3}{4}} (\cos \varphi_t + i \sin \varphi_t) \mid \varphi_t \in \left\{ \frac{7\pi}{18}, \frac{19\pi}{18}, \frac{31\pi}{18} \right\} \right\}$$
. **12.** a) -2^6 ; 6) -2^7 ; B) 2^9 .

C₁: **13.** –1. *Указание*. Умножьте равенство на z-1; получим $z^4=z$. **14.** n=4k, $k \in \mathbb{N}$. **15.** б) Точки M_1 и M_3 . **16.** а) $S = \{-1 \pm i\sqrt{2}\}$; б) $\sqrt{3}$; в) образ решения $-1+i\sqrt{2}$ принадлежит окружности, а образ решения $-1-i\sqrt{2}$ — нет.

Итоговый тест

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. 1. $x=1, y=\frac{1}{5}$

2. a)
$$\frac{5}{3} - \frac{17}{5}i$$
; 6) $\frac{11}{50} - \frac{23}{50}i$. **3.** $S = \left\{\frac{2}{17}(4-i)\right\}$. **4.** 6) $S = \left\{\frac{1 \pm 3i\sqrt{10}}{7}\right\}$. **5.** a) 2i; 6) **C**.

Реальный профиль. 1. a) $-\frac{11}{3} - \frac{8+\sqrt{3}}{2}$ i; б) $-\frac{23}{53} + \frac{1}{53}$ i. **2.** a) Не имеет; б) $S = \left\{ \frac{-\sqrt{7} \pm 7i}{4} \right\}$

3.
$$z_1 = -i$$
, $z_2 = -1 - i$. **4.** $2^4 + 2^4 \cdot i$. **5.** а) При $z \in \mathbb{R}$ число $2z^3$ действительное;

6)
$$S = \left\{ \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \left(\pm \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right), -\sqrt[3]{\frac{3}{2}}i \right\}$$
. **6.** 6) Het.

Модуль 7

§ 1. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. a) $\begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$

$$6) \begin{pmatrix} 5 & 8 & 2 \\ 1 & -3 & -1 - i \end{pmatrix}, B) \begin{pmatrix} 3 + i & 1 + i \\ i & 2 + 2i \end{pmatrix}, \Gamma) \begin{pmatrix} 3 & 2i \\ -2 + i & -1 + i \end{pmatrix}, A) \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 0 & 6 \\ 9 & 3i \end{pmatrix}, e) \begin{pmatrix} 2 & 2i & 4 \\ 4 & 0 & -2i \\ -2 & 14 & 6 \end{pmatrix},$$

BA не существует; е)
$$AB = BA = A$$
. 4, а), б) $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ в) $\begin{pmatrix} 46 & -10 \\ 32 & -8 \end{pmatrix}$ г) $\begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$ д) $\begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 9 & -69 & 144 \\ 27 & 27 & -63 \end{pmatrix}$ д) $\begin{pmatrix} 6 & 2 & -1 \\ 15 & 22 & 10 \\ 15 & 24 & 10 \\ 15 & 22 & 10 \\ 15 & 24$

6) $(x-a)^2(2a+x)$; B) $-2(x^3+y^3)$. 7. a) $S = \{1, 2\}$; 6) $S = \{0, 3a\}$.

Реальный профиль. A₁: 1. 1) а) –10; б) 24; в) –*a*; г) –17і; д) 9–10і; е) –374; ж) –11; з) –22; и) 4; к) –18. **2.** 1) а)–и) может быть применен. 2) а) $S = \left\{ \left(\frac{11}{7}, \frac{-2}{7} \right) \right\}$; б) $S = \left\{ \left(\frac{13}{23}, \frac{-2}{23} \right) \right\}$; в) $S = \left\{ \left(\frac{19}{14}, \frac{3}{14} \right) \right\}$; г) $S = \left\{ \left(\frac{21}{8}, \frac{-27}{8} \right) \right\}$; д) $S = \left\{ \left(\frac{ac - bd}{a^2 + b^2}, \frac{ad + bc}{a^2 + b^2} \right) \right\}$; е) $S = \left\{ (1, 0, 1) \right\}$; ж) $S = \left\{ (1, 3, 2) \right\}$; 3) $S = \{(2, 1, 3)\};$ и) $S = \left\{\left(\frac{5}{3}, 0, -\frac{2}{3}\right)\right\};$ к) правило Крамера не применимо. **3.** a) -20; б) 0; 3) $S = \{(2, 1, 3)\}$, и) $S = \{(\frac{1}{3}, 0, -\frac{1}{3})\}$, к) правиле храниче и P (8 4 -4) P (8 9 0; г) -15; д) 36. **4.** 1) а)—ж) обратимы; 2) а) $\frac{1}{5}\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, б) $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, в) $\frac{1}{20}\begin{pmatrix} 8 & 4 & -4 \\ 1 & -7 & 2 \\ -6 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ **B**₁: 5. $S = \left\{ \frac{-3 \pm i\sqrt{3}}{8} \right\}$. 6. a) $f(x) = x^2 - 3x + 8$; 6) He cymectryet; B) $x_0 = \frac{3}{2}$, $f(x_0) = \frac{23}{4}$ **8.** а) $S = \{(1+i, i)\}; б)$ $S = \{(2+i, 2-i)\}; в)$ $S = \{(3-11i, -3-9i, 1-7i)\}.$ **9.** а) 4 кв. ед.; б) коллинеарные; в) $\frac{27}{2}$ кв. ед.; г) 13 кв. ед. **10.** $X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $Y = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$. **11.** a) $S = \{1, 2\}$; б) $S = \{0, 3a\}$. С₁: 12. a) Изменится на противоположное значение; б) не изменится. **13.** Изменится на сопряженное комплексное число. **14.** Умножится на α^3 . **15.** Указание. Разложите определитель по третьему столбцу. 16. а) Указание. Прибавьте ко второй и третьей строкам первую строку, умноженную на -1. (a-b)(c-a)(c-b); б) $(x-a)^2(2a+x)$; в) $ab(a^2+b^2-cb)+c(c^3-b^2c-a^3)$. 17. a) Указание. Прибавьте к первой строке третью строку и вынесите общий множитель. $(a^2 + b^2 + c^2)(a - b)(a - c)(c - b)(a + b + c)$; 6) (a-b)(b-c)(c-a)(ab+ac+bc).

§ 3. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. а), б), г) не является решением; в) является решением. 2. а) $S = \{(1, 1)\}$; б) $S = \{(1, -1)\}$; в) $S = \{(1, 2)\}$; г) $S = \{(1, 0)\}$; д) $S = \{(1, 0, 1)\}$; е) $S = \{(1, -3, 3)\}$; ж) $S = \{(1, 1, -2)\}$; з) $S = \{(1, 2, -2)\}$. В: 3. 4,5 д. ед.; 4 д. ед. 4. а) Почленно складываются уравнения 1 и 3; б) почленно складываются уравнения 2 и 3. С: 5. а) $\begin{cases} 2x + y + z = 28,3, \\ x + 2y + z = 24,6, \text{ Цены: 9 д. ед.; 5,3 д. ед.; 5 д. ед.} \end{cases}$

от F_1 , F_2 , F_3 соответственно; б) цены определяются неоднозначно. **6.** Указание. a) Замените третье уравнение на 2x-z=2; б) замените третье уравнение, например, на уравнение, полученное при почленном сложении первых двух уравнений.

Реальный профиль. A₁: **1.** a), б), г) не является решением; в) является решением. **2.** a) $S = \{(1, 1)\};$ б) $S = \{(1, -1)\};$ в) $S = \{(1, 2)\};$ г) $S = \{(1, 0)\};$ д) $S = \{(1, 0, 1)\};$ е) $S = \{(1, -3, 3)\};$ ж) $S = \{(1, 1, -2)\};$ з) $S = \{(1, 2, -2)\}.$ **3.** a) $S = \left\{\left(\frac{-2+4\mathrm{i}}{15}, \frac{1-2\mathrm{i}}{3}, \frac{-4+3\mathrm{i}}{15}\right)\right\};$ б) $S = \{(1, 2, -2)\};$ в) $S = \{(-1, -1, 0, 1)\}.$ **4.** a) $S = \{(-3\alpha, \alpha, -\alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\};$ б) $S = \{(\alpha, 3\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\};$ в) $S = \{(0, 0, 0)\}, \lambda \neq 0;$ $S = \{(-\alpha, -2\alpha, \alpha)\}, \lambda = 0;$ г) $S = \{(0, 0, 0)\}, \lambda \in \mathbb{R}$

В₁: 5. а) 4,5 д. ед.; 4 д. ед. 6. а), г), д), е) – совместны; б), в) – несовместны.

7. a)
$$S = \left\{ \left(\frac{1}{5} (11 - \alpha), \frac{2}{5} (-1 + \alpha), \alpha \right) | \alpha \in \mathbb{C} \right\};$$
 частное решение: $(3, -2, -4); \Gamma$) $S = \{(1, 2, -2)\};$

д)
$$S = \{(1, 2, 1)\}; e)$$
 $S = \{(\lambda, 1, 0)\}, \lambda \neq 0;$ $S = \{(-\alpha, 1 - 2\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{C}\}, \lambda = 0.$

8.
$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ a - b & b \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$$
. C_1 : 9. a) $\left\{ \begin{aligned} 2x + y + z &= 28,3, \\ x + 2y + z &= 24,6, \text{ Цены: 9 д. ед.; 5,3 д. ед.; 5 д. ед.} \\ x + y + 2z &= 24,3. \end{aligned} \right.$

от F_1 , F_2 , F_3 соответственно; б) соответствующая система совместна и неопределена, следовательно, цены определяются неоднозначно. 10. Указание. а) Замените третье уравнение на 3x + 2z = 3; б) замените третье уравнение на уравнение, полученное при

почленном сложении первых двух уравнений. 11. $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$

Упражнения и задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. a) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -i & 3 & 1+2i \end{pmatrix}$

б)
$$\begin{pmatrix} 2i & 0 & -i \\ 1 & 3i & -2+i \end{pmatrix}$$
. **2.** 1) а) 2 × 2; б) 3 × 3; в) 2 × 2; г) 1 × 3; д) 3 × 3; е) не существует

$$\begin{pmatrix} 2i & 0 & -i \\ 1 & 3i & -2+i \end{pmatrix}$$
 2. 1) а) 2×2 ; б) 3×3 ; в) 2×2 ; г) 1×3 ; д) 3×3 ; е) не существует.
2) а) $\begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} i & 2 \\ -2i & -6 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} -5 & 52 & -33 \end{pmatrix}$; д) $\begin{pmatrix} 11 & -7 & 29 \\ 9 & -9 & 32 \\ 13 & -5 & 26 \end{pmatrix}$; е) не су-

ществует. **3.** a) x = -1, y = 2; б) x = 5, y = 11 или x = -1, y = 5. **4.** a) -i; б) 0; в) -70; г) -88;

д) 0; e)
$$-21i$$
; ж) 0; з) 0. **5.** a) $S = \{(2,1)\}$; б) $S = \{(i,1)\}$; в) $S = \{(1,1,1)\}$; г) $S = \{(3,2,1)\}$;

д)
$$S = \emptyset$$
; e) $S = \left\{ \left(1, \frac{1}{2}\right) \right\}$; ж) $S = \left\{ (4, 5, 0); 3 \right\}$ $S = \left\{ (2, 3, -1) \right\}$. **B:** 6. $\begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ **7.** 1×2 . **8.** 5 жуков

и 3 паука. С: 9. $\alpha \neq \pm 2$. 10. Сосуд I – 1,5 л, сосуд II – 9 л. 11. Ì вкладчик – 2000 д. ед., II вкладчик – 3000 д. ед., III вкладчик – 5000 д. ед.

Реальный профиль. A₁: 1. a) $\begin{pmatrix} 5 & i & -3 \\ -2i & 8 & 2+7i \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 3i & 1 & -i \\ 2 & 4i & -1+2i \end{pmatrix}$. 2. 1) a) 2×2 ; б) 3×3 ;

3. a) x = 1, y = -3; б) x = 1, y = 2, u = 0, v = 3. **4.** a) -i; б) 0; в) -70; г) -88; д) 0; е) -21i;

$$\mathbf{x}$$
) 0; 3) 0. **5.** 1) д), \mathbf{x}) – несовместные. 2) а) $S = \{(2,1)\};$ б) $S = \{(i,1)\};$ в) $S = \{(1,1,1)\};$

г)
$$S = \{(3, 2, 1)\};$$
д) $S = \emptyset;$ е) $S = \{(1, \frac{1}{2})\};$ ж) $S = \emptyset;$ з) $S = \{(2, 3, -1)\}.$ **6.** a) 1; б) 36; в) -15.

г)
$$S = \{(3, 2, 1)\};$$
 д) $S = \emptyset;$ е) $S = \left\{ \left(1, \frac{1}{2}\right)\right\};$ ж) $S = \emptyset;$ з) $S = \{(2, 3, -1)\}.$ **6.** a) 1; б) 36; в) -15.
7. a) $\begin{pmatrix} 2 & -i \\ 3 & -i \end{pmatrix};$ б), д), ж), з) не существует A^{-1} ; в) $\frac{1}{70}\begin{pmatrix} 8 & 7 & 3 \\ 14 & -14 & 14 \\ -34 & 14 & -4 \end{pmatrix};$ г) $\frac{1}{88}\begin{pmatrix} -6 & 20 & -15 \\ 30 & -12 & 31 \\ -20 & 8 & -6 \end{pmatrix};$

e)
$$\frac{1}{21} \begin{pmatrix} 17 & -8 & 5 \\ -16 & 10 & -1 \\ 6i & -9i & 3i \end{pmatrix}$$
 8. a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 4 & -1 \\ -6 & 14 & -11 & 3 \\ 4 & -11 & 10 & -3 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, 6) $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{13}{36} & \frac{7}{18} & -\frac{1}{18} \\ \frac{1}{4} & -\frac{11}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{7}{9} & -\frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ -\frac{1}{4} & \frac{7}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

B)
$$A^{-1} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 2 & 7 & 0 & -8 \\ 7 & 2 & -15 & 17 \\ 2 & -8 & 0 & 7 \\ -8 & 2 & 15 & -13 \end{pmatrix}$$
 9. a) $S = \left\{ \left(\frac{5}{3} - \frac{4}{3}t, \frac{19}{6} + \frac{1}{6}t, \frac{11}{6} + \frac{11}{6}t, t \right) | t \in \mathbf{C} \right\};$

6)
$$S = \{(5-3t, -5+2t, 1-t, t) \mid t \in \mathbb{C}\}; \text{ B} \ S = \{(-5+2\lambda+4t, -1+\lambda+t, \lambda, t) \mid \lambda, t \in \mathbb{C}\};$$

г)
$$S = \left\{ \left(\frac{1}{6} + 5t, \frac{1}{6} - \frac{7}{6}t, \frac{1}{6} + 5t, 6t \right) | t \in \mathbf{C} \right\}$$
. **10.** Сосуд I – 7,5 л, сосуд II – 45 л. **В**₁: **11.** $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$

12.
$$1 \times 2$$
. **13.** a) $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{16}{3} \right\}$; 6) $\alpha \in \mathbb{C}^*$. **14.** a) $S = \left\{ \frac{1}{2} (1 \pm i) \right\}$; 6) $S = \{-2, 0, 1 \pm i\}$.

15. a)
$$S = \{(-5\alpha, \alpha, t, -3\alpha + t) \mid \alpha, t \in \mathbb{C}\}; \text{ б) при } \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{1, -2\}, S = \{(0, 0, 0)\};$$

при
$$\lambda = -2$$
, $S = \{(t, t, t) | t \in \mathbb{C}\}$; при $\lambda = 1$, $S = \{(\alpha, t, -\alpha - t) | \alpha, t \in \mathbb{C}\}$; в) при $\lambda \neq 1$, $S = \{(0, 0, 0)\}$; при $\lambda = 1$, $S = \{(2t, -3t, 5t, 4t) | t \in \mathbb{C}\}$. **16.** I велосипедист – 15 км/ч, II велосипедист – 9 км/ч.

при
$$\lambda = 1$$
, $S = \{(2i, -3i, 3i, 4i) | i \in C\}$. 16. 1 велосипедист – 13 км/ч, 11 велосипедист – 9 км/ч

C₁: **17.** 2. **18.**
$$\begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
. **19.** б) Наименьшее значение: -4, наибольшее значение: 4. **20.** $\mathcal{V} = 6$ (куб. ед.). **21.** $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. **22.** При $\alpha \neq \pm 2$ система совместна и определена; при

 $\alpha = 2$ система имеет бесконечное множество решений; при $\alpha = -2$ система несовместна.

24.
$$X = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$
 25. $\alpha \in (-1, 1) \setminus \{0\}$.

Итоговый тест

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. 1. 1) а), б) можно вычис-

лить; 2) а) $\begin{pmatrix} 8 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 16 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 9 & -2 \end{pmatrix}$. 2. а) Определитель системы не равен нулю;

Реальный профиль. 1. 1) а), б) можно вычислить; 2) а)
$$\begin{pmatrix} -1 & 3i & 5+6i \\ 4i & 2 & 4+2i \end{pmatrix}$$
; б) $\begin{pmatrix} 4+7i & 4+5i \\ 12-9i & -8+5i \\ 6-9i & -7+i \end{pmatrix}$

2. а) **C**; б)
$$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & -1 \\ \frac{6}{4} & \frac{5}{4} & -\frac{7}{4} \end{pmatrix}$$
; в) $X = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 22 & 15 & -21 \\ 16 & 14 & -18 \\ -4 & -6 & 6 \end{pmatrix}$. **3.** а) Совместна и неопределена;

б)
$$S = \left\{ (1 - \frac{1}{19}\alpha, \frac{3}{38}\alpha, 1 - \frac{12}{19}\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$
, частное решение (1, 0, 1, 0). **4.** C_1 –1200 д. ед.;

$$C_2 - 550$$
 д. ед.; $C_3 - 400$ д. ед.

Модуль 8

§ 1. *Гуманитарный профиль*, *профили искусство и спорт*. **А:** 1. Нет. 2. Л. 3. а) Нет; б) нет; в) да. **В:** 4. а) PQ; б) PC; в) QC. 5. 3 плоскости. 6. а) 6; б) 4. 7. а), б) Ни одной точки, точку, бесконечное множество точек; в) ни одной точки, точку, две точки, бесконечное множество точек. 8. Да, если точки неколлинеарны. **С:** 9. $\frac{a^2}{16}\sqrt{3}$ кв.ед. 10. 6 плоскостей. 11. а) 10; б) 10.

Реальный профиль. A₁: **2.** Указание. Пересекающиеся прямые d_1 и d_2 определяют плоскость α . Прямая d_3 пересекает прямые d_1 и d_2 в двух различных точках плоскости α . **3.** Указание. Прямые AD и CB лежат в одной плоскости. **B**₁: **4.** Указание. Примените метод доказательства от противного. **5.** Указание. $A \in \alpha$ и $A \notin \beta$, $B \in \beta$ и $B \notin \alpha \Rightarrow$ искомая прямая AB. **6.** Указание. Точка $D \notin (ABC)$.

C₁: **8.** *Указание*. Если две различные плоскости α и β имеют общую точку, то они пересекаются по прямой. **9.** *Указание*. $a \cap AB = C \subset \beta \Rightarrow \beta$ разделяет точки A и B.

§ 2. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. А: 1. Нет. 2. Да.

В: 3. *а*∦*с*. **С**: 5. Скрещивающиеся.

Реальный профиль. B₁: **3.** $d \not \mid d_2$. **4.** Прямые d и AB скрещивающиеся. **C**₁: **5.** $a \not \mid c$. **6.** Все пространство без точек плоскости (A, d).

§3. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. А: 1. $d \parallel MN$.

B: 2. $EL \parallel FM$. **C:** 3. a) 10 cm; б) 6 cm; в) 16 cm; г) $\frac{bc}{a+c}$.

Реальный профиль. A₁: 1. Указание. $\Delta A_1 B B_1 \sim \Delta A B C \Rightarrow A_1 B_1 \parallel A C$ и $\Delta D_1 D C_1 \sim \Delta A D C \Rightarrow D_1 C_1 \parallel A C$. **B₁: 2.** $MN \parallel (ABC)$. **C₁: 3.** Указание. Примените теорему Менелая. $\frac{1}{abc}$. **4.** Указание. $\{M_1\} = DM \cap AB, \ \{N_1\} = DN \cap BC, \ \text{тогда} \ \Delta DMN \sim \Delta DM_1 N_1$.

§4. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. Указание. $MN \parallel AB$, $NP \parallel BC$. B: 2. Указание. a) $LM \parallel AB$ и $MN \parallel BC$; б) $\{I_1\} = PM \cap AB$; в) $\{I_2\} = PN \cap AC$; г) $(ABC) \cap (PMN) = I_1I_2$. C: 3. $\mathcal{P}_{A_2B_2C_2} = 13,75$ см, $\mathcal{P}_{A_3B_3C_3} = 22,5$ см, $\mathcal{P}_{A_4B_4C_4} = 31,25$ см.

Реальный профиль. A₁: **1.** 38 см. **B**₁: **2.** Указание. $(MNP) \parallel (ABC) \Rightarrow (MNP) \cap (AED)$ есть прямая $d \parallel AD$ и $Q \in d$. **C**₁: **3.** 8 см. **4.** $\mathscr{S}_1 = \frac{6\lambda + 1}{7\lambda + 1}\mathscr{F}$, $\mathscr{S}_2 = \frac{4\lambda + 1}{7\lambda + 1}\mathscr{F}$, $\mathscr{S}_3 = \frac{\mathscr{F}}{7\lambda + 1}$.

5. Указание. a) $\Delta MEN \sim \Delta AEB$ и $\Delta NEP \sim \Delta BEC$; б) $\{I\} = NR \cap BD$.


Задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профиль искусство и спорт. **А: 1.** а) 17,15 дм; б) 19,5 см; в) 54 см. **2.** $MM_1 = 12$ см, $NN_1 = 8$ см. **B: 3.** 12 см. **C: 4.** *Указание*. Если M_1 – середина отрезка AB, то $\Delta MDL \sim \Delta M_1DC \Rightarrow ML \parallel M_1C$.

Реальный профиль. A₁: 3. a) $\frac{a}{\lambda}(\lambda-1)$; б) μa ; в) $\frac{l}{k}$; г) $\frac{c}{a}(a-b)$. 4. 32 см. 6. $\frac{m+n}{2n}a$. 7. $0.25a^2 \cdot \sqrt{11}$ кв. ед. B₁: 8. Указание. Пусть I — точка пересечения каких-либо двух прямых из данных. Если предположим, что третья прямая пересекает одну из этих прямых в некоторой точке, отличной от I, то эти три прямые будут компланарными, что противоречит гипотезе. 9. Прямые AB и DC, где $\{D\} = a \cap AB$. 10. Указание. Примените теорему 8′. 11. Точка существует, если $AB \not \mid DC$, то есть, если $AD : DE \neq BC : CE$. 12. Указание. Примените свойство средней линии и свойства параллелограмма. 13. Указание. Возьмите точку $M \in c$ ($M \notin \gamma$, $AM \not \mid \gamma$, $BM \not \mid \gamma$). Постройте (ABM) $\cap \alpha$ — это прямая A_1B_1 , где $\{A_1\} = a \cap AM$,

 $\{B_1\} = b \cap BM$ и точка пересечения есть $AB \cap A_1B_1$. C_1 : 15. 2 м. 16. AM, $MN \parallel DB$, AN и $AL \parallel DB$; см. рисунок.

17. *Указание*. Пересечение двух плоскостей, которые проходят через две параллельные прямые, есть прямая, параллельная этим двум прямым. **18.** *Указание*. Пусть BE = EC, тогда [MF] – медиана



 ΔADF . Из условия имеем AG:GE=2:1, следовательно, [AE] – медиана ΔADF .

19. Указание. Если $\{I\} = AC \cap EF$, то $IH \cap AB$ – одна из точек пересечения, а $FH \cap DB$ – вторая точка пересечения. **20.** 7 плоскостей.

Итоговый тест

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. 1.8 см.

2. a) A_1B_1 , A_1D_1 , D_1C_1 , B_1C_1 , A_1C_1 , D_1B_1 ; 6) (ADB), (DCC_1) , (ABA_1) , $(D_1A_1B_1)$. **3.** $a(0.5+\sqrt{3})$. **4.** 8 cm.

Реальный профиль. 1. $a \| b$. **2.** a) $EF \| (ABC)$, 6) $GH \| (ABC)$. **4.** $\frac{4}{9} \mathcal{A}$.

Модуль 9

§ 1. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. Указание. $CD \perp CB$, $CD \perp CF \Rightarrow CD \perp (CBF)$. 2. $DA \perp CB$, $CB \parallel MN \Rightarrow MN \perp AD$. B: 3. 2,4 см. 4. MB = MD = 5 см, $MC = \sqrt{41}$ см. 5. AB = b. C: 6. $DE = 4\sqrt{2}$ см, $CE = 2\sqrt{17}$ см, $BE = 2\sqrt{13}$ см, $d = \frac{4}{13}\sqrt{286}$ см.

Реальный профиль. A₁: 1. $AB = \sqrt{(a+b)^2 + c^2}$. **2.** $\sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4\sin^2 \alpha}}$. **B₁: 4.** Указание. $\triangle AEC$ – равнобедренный $\Rightarrow EO \perp AC$; аналогично $\triangle BED$ – равнобедренный $\Rightarrow EO \perp BD$.

C₁: **5.** $\sqrt{a^2+c^2}$, $\sqrt{a^2+b^2+c^2+2ab\cos\alpha}$, $\sqrt{b^2+c^2}$. **6.** Указание. Если $d=\alpha\cap\beta$, то из $d_1\perp\alpha\Rightarrow d_1\perp d$, а из $d_2\perp\beta\Rightarrow d_2\perp d\Rightarrow d\perp(d_1d_2)$.

§ 2. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. a) 3 см; б) 0,6.

2. 24 см. **B**: **3.** 3,8 м. **4.** Указание. а) ΔAVD – равнобедренный, [VO] – медиана; ΔBVE – равнобед-ренный, [VO] – медиана $\Rightarrow VO \perp (ABC)$; б) $\Delta AOV \equiv \Delta BOV \equiv \Delta COV \equiv \Delta DOV \equiv \Delta EOV \equiv \Delta FOV$. **C**: **5.** а) 3 см; б) $3\sqrt{2}$ см. **6.** $AB = \sqrt{(a-b)^2 + c^2}$.

Решльный профиль. A₁: 1. $\sqrt{2}$ см. **B₁: 2.** a) $\alpha \approx 0,15^{\circ}$; б) 45°. **3.** $1,65+50 \cdot \text{tg}37,8^{\circ} = 40,43$ (м). **4.** $\approx 32^{\circ}$. **5.** $2\sqrt{14}$ см. **C₁: 6.** $c\frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$.

§3. Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. А: 1. $\sqrt{6}$ см.

B: 2. a) $\frac{9}{4}$ cm; б) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ cm. **C**: 3. 15 cm. 4. 5 cm.

Реальный профиль. A₁: 1. $\frac{\sqrt{1221}}{39}$. B₁: 2. Указание. a) Если $O = pr_{(ABC)}E$, a [EM], [EN], [EP], [EQ] – высоты треугольников AEB, BEC, CED и DEA соответственно, то OM = ON = OP = OQ т. е. точка O равноудалена от сторон ромба; б) $\Delta MOE \equiv \Delta NOE \equiv \Delta POE \equiv \Delta QOE \Rightarrow$ $\Rightarrow \angle EMO \equiv \angle EPO \equiv \angle EQO$. 3. Если $O = pr_{(ABC)}E$ и [EM], [EN], [EP], [EQ] – высоты треугольников AEB, BEC, CED и DEA соответственно, то $\Delta MOE \equiv \Delta NOE \equiv \Delta POE \equiv \Delta QOE$, значит, MO = NO = PO = QO. C₁: 5. 30°. 6. √3.

Задачи на повторение

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. A: 1. a) 13 см; б) 30 см; в) $\sqrt{p^2 + n^2 - m^2}$; г) $\sqrt{2p^2 + n^2 - s^2}$. **2.** $\sqrt{b^2 - \frac{1}{3}a^2}$. **3.** $d_1 = 2\sqrt{6}$ см, $d_2 = 4\sqrt{2}$ см. **B: 4.** a) 30°; б) $\operatorname{arccos}\left(-\frac{7}{8}\right)$. **5.** 2 см. **C: 6.** 15 м.

Реальный профиль. A₁: 3. Указание. Прямая из плоскости α перпендикулярна $pr_{\alpha}a$. **4.** 32 см. **B₁: 5.** $\sqrt{b^2 - a^2}$. **6.** $\sqrt{2b^2 - a^2}$. **C₁: 8.** $\frac{ab}{a+b}$. **9.** 0,5 м.

Итоговый тест

Гуманитарный профиль, профили искусство и спорт. 1. 3,5 см. 2. $\sqrt{6}$ см. 3. $5\sqrt{2}$ см, $\sqrt{29}$ см. 4. 4 см.

Реальный профиль. 1. $\frac{1}{2}|a-b|$. **3.** $\sqrt{70}$ см, $2\sqrt{16,06}$ см. **4.** 45°. **5.** $AA' \perp a$, $A' \in a$; $A'D \perp d$, $D \in d$; $AD \perp \alpha$.

Модуль 10

- §1. *Реальный профиль*. **A**₁: 2. Нет. **B**₁: 3. Является геометрическим преобразованием, но не изометрическим. 4. Не всегда (например, параллельное проектирование).
- 8. а) B'K', где A'K' = K'C'; б) B'L', где $\angle A'B'L' \equiv \angle L'B'C'$ и т. д. 9. Если $C \in [AB]$ и f(C) = C', то AC = AC', CB = C'B и AC + CB = AC' + C'B, следовательно, $C \equiv C'$. Аналогично получаем $C \notin [AB]$. 10. а) См. задачу 9; б) нет. С₁: 11. а) Да, если f(A) = A, то $f^{-1}(A) = f^{-1}(f(A)) = I(A) = A$. б) да, так как $(f \circ f)(A) = f(A) = A$. 12. Да, так как $(f \circ f)(A) = f(A) = A$.
- § 2. Реальный профиль. A_1 : 2. Да. 3. Бесконечное множество; центры симметрии образуют прямую, параллельную заданным прямым. 4. Нет. 5. Нет. B_1 : 6. Точки коллинеарны. 8. Да (центр симметрии, любая прямая, любая плоскость, проходящие через центр центральной симметрии). 9. Идентичное. 10. Нет. C_1 : 14. а) Отрезок, параллельный заданному отрезку; б) прямая, параллельная заданной прямой; в) плоскость, параллельная заданной плоскости.
- § 3. Реальный профиль. А₁: 1. а) Равнобедренный треугольник, прямоугольник; б) треугольник со сторонами разной длины, параллелограмм. В₁: 2. Прямые, проходящие через центры двух противоположных граней; прямые, проходящие через середины двух параллельных ребер, которые не принадлежат одной грани. 4. Любая медиатриса отрезка АВ. Все оси образуют медиальную плоскость отрезка АВ. 5. а) Несущая прямая отрезка и любая его медиатриса; б) несущая прямая полупрямой; в) сама прямая и любая перпендикулярная к ней прямая; г) любая прямая, лежащая в плоскости, и любая прямая, перпендикулярная плоскости; д) прямая, перпендикулярная плоскости параллелограмма и проходящая через точку пересечения его диагоналей. 6. а) Образ прямой, параллельной оси, есть прямая, параллельная заданной прямой; образ прямой, пересекающей ось, есть прямая, проходящая через точку пересечения заданной прямой с осью, причем ось является несущей прямой биссектрис вертикальных углов, образованных прямой и ее образом; образ прямой, не пересекающей ось, есть прямая, не пересекающая заданную прямую. 7. а) Любая прямая, перпендикулярная оси симметрии, и сама ось; б) ось симметрии.
- C₁: 8. a) $\alpha \equiv \alpha'$ и $d \in \alpha'$; б) $\alpha \equiv \alpha'$ и $d \perp \alpha'$; в) $d \cap \alpha' \neq \emptyset$.
- § 4. *Реальный профиль*. A_1 : 2. Любая прямая, лежащая в плоскости, и любая прямая, перпендикулярная плоскости. B_1 : 3. а) Любая плоскость, содержащая отрезок, и медиальная плоскость отрезка; б) любая плоскость, проходящая через прямую, и любая плоскость, перпендикулярная заданной прямой; в) сама плоскость и любая плоскость, перпендику-

лярная заданной плоскости; г) плоскость, содержащая заданные прямые, и две плоскости, перпендикулярные плоскости, проходящей через эти прямые и которые содержат биссектрисы углов, образованных этими прямыми; д) плоскость, проходящая через заданные прямые, плоскость, перпендикулярная плоскости, определенной заданными прямыми, и равноудаленная от этих прямых, и любая плоскость, перпендикулярная заданным прямым; е) плоскость, равноудаленная от заданных плоскостей, и любая плоскость, перпендикулярная заданным плоскостям. 4. Прямые компланарны. 6. 5 м. C_1 : 8. $\alpha \parallel \beta$, если $\alpha \parallel \gamma$; $\alpha \parallel \beta$, если $\alpha \parallel \gamma$ 9. Точка M – точка пересечения прямой AB' с плоскостью α , где B' – точка, симметричная точке B относительно плоскости α . 10. Точка M – точка пересечения прямой AB' с плоскостью α , где B' – точка, симметричная точке B относительно плоскости α . 11. Окружность, лежащая в плоскости, проходящей через точку A и перпендикулярной прямой A, центр которой есть точка пересечения прямой A с этой плоскостью, а радиус – расстояние от точки A до прямой A.

- § 5. *Реальный профиль*. B_1 : 5. Не существует инвариантных точек. Любая прямая и любая плоскость, параллельные прямой, проходящей через точку и ее образ при данном параллельном переносе. 6. t_{BA} .
- § 6. *Реальный профиль*. **A**₁: **2**. Нет. **3**. Нет. **4**. Одна точка центр гомотетии. Любая прямая, проходящая через центр гомотетии. **B**₁: **5**. 9 банок. **6**. а) Стороны треугольника A'B'C' параллельны сторонам треугольника ABC; б) см. 6 а). **7**. $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$.
- С₁: 9. а) Окружность; б) круг; в) параллелограмм; г) квадрат; д) куб; е) сфера.
- §7. *Реальный профиль*. A₁: 1. а) Бесконечное число осей; б) одну ось; в) одну ось или не имеет осей; г) не имеет осей. C₁: 7. *Указание*. Рассмотрите поворот вокруг прямой l, при котором точка B отображается в такую точку B', что: 1) $B' \in (lA)$; 2) Точки A и B' расположены по разные стороны прямой l. Тогда $\{M\} = AB' \cap l$ искомая точка.

Задачи на повторение

Реальный профиль. A₁: **1.** Указание. Если O – середина [AC], то $S_o(d_1) \cap d_2$ – вершина параллелограмма. **2.** Указание. Если O – середина [AC], то $S_o(d) \cap \mathscr{C}$ – вершина параллелограмма. **B**₁: **3.** а) $h = \frac{\pi^2 R \sqrt{2}}{12}$; б) R = 6,5 см; A'B' = 20,4 см. **C**₁: **4.** а) $x = l(\sqrt{2} - 1)$; б) $BD = l\sqrt{2}$, $GD = l = AD \Rightarrow BG = x = l(\sqrt{2} - 1)$. **5.** Если $P_1 = S_{AC}(P)$ и $P_2 = S_{BC}(P)$, то $\{X_1\} = AC \cap P_1P_2$ и $\{Y_1\} = BC \cap P_1P_2$. **6.** Точка отскока – это пересечение борта стола с отрезком, соединяющим одну из этих точек с точкой, симметричной другой точке относительно борта. **7.** Вершина C – точка пересечения прямых d и BA_1 , где $A_1 = S_d(A)$. **8.** Fie $\overline{a} \not\parallel d_1$, $\overline{a} \not\parallel d_2$. Если $d_3 = t_{\overline{a}}(d_1)$, то $\{M_2\} = d_3 \cap d_2$, а $M_1 = t_{-\overline{a}}(M_2)$. **9.** Пусть $B_2 \in d_2$ и $BB_2 \parallel d_1$, $A_2 \in d_1$ и $AA_2 \parallel d_2$, $\overline{a} = \overline{AA_2}$, $\overline{b} = \overline{BB_2}$, тогда $t_{\pi+\overline{b}}(A) = A_1$, $t_{\pi+\overline{b}}(B) = B_1$.

Итоговый тест

Реальный профиль. 1. Биссектральные плоскости заданной фигуры и любая плоскость, перпендикулярная прямой, по которой пересекаются плоскости. **2.** Прямая, лежащая в плоскостях, проходящих через заданные прямые, и равноудаленная от них. Любая прямая, лежащая в плоскости, проходящей через заданные прямые, и перпендикулярная к ним, и любая прямая, перпендикулярная плоскости, проходящей через заданные прямые, и пересекающая первую ось симметрии. **3.** Пусть a и b — заданные скрещивающиеся прямые. Прямая AB — общий перпендикуляр к прямым a и b (таковой существует, и он — единственный), где $A \in a$, $B \in b$. Пусть точка C — середина отрезка AB. Рассмотрим прямые a_1 , b_1 проходящие через точку C и параллельные прямым a и b соответственно. Тогда оси симметрии заданной фигуры — это прямая AB и несущие прямые биссектрис углов, образованных прямыми a_1 и b_1 . **5.** а) Да; б) да; в) да; г) в общем случае, нет; д) в общем случае, нет.

Содержание

Предисловие		
Модуль 1. Последовательности	Модуль 6. Комплексные числа	164
действительных чисел5	§1. Операции над комплексными числами	ī,
§ 1. Последовательности действительных	заданными в алгебраической форме	. 164
чисел. Повторение и дополнения 5	§ 2. Геометрическое изображение	
§ 2. Арифметические прогрессии и	комплексных чисел.	
геометрические прогрессии	Тригонометрическая форма	
§ 3. Предел последовательности.	комплексных чисел	
Сходящиеся последовательности,	§ 3. Приложения комплексных чисел	
расходящиеся последовательности 22	Упражнения и задачи на повторение	
Упраженения и задачи на повторение 30	Итоговый тест	. 183
Итоговый тест	Модуль 7. Матрицы. Определители.	
Модуль 2. Предел функции	Системы линейных уравнений	185
§1. Предел функции в точке 34	§ 1. Матрицы	. 185
§ 2. Операции над пределами функций.	§ 2. Определители	. 196
Пределы элементарных функций 44	§ 3. Системы линейных уравнений	. 213
§ 3. Вычисление пределов функций 54	Упражнения и задачи на повторение	224
§ 4. Неопределенности в операциях над	Итоговый тест	228
пределами функций	Модуль 8. Параллельность прямых	
Упражнения и задачи на повторение 64	и плоскостей	231
Итоговый тест 66	§ 1. Аксиомы геометрии в пространстве	
Модуль 3. Непрерывные функции 68	§ 2. Взаимное расположение двух	0 .
§ 1. Функции, непрерывные в точке.	прямых в пространстве	234
Функции, непрерывные на множестве 68	§ 3. Прямые и плоскости	
§ 2. Свойства непрерывных функций 77	§ 4. Параллельные плоскости	
§ 3. Асимптоты функций	Задачи на повторение	
Упражнения и задачи на повторение	Итоговый тест	
<i>Итоговый тест</i>	Модуль 9. Перпендикулярность	
		249
Модуль 4. Дифференцируемые функции	§ 1. Перпендикулярные прямые и	
	плоскости	249
§ 1. Производная функции	§ 2. Ортогональные проекции. Угол	27)
§ 2. Геометрический смысл производной	между прямой и плоскостью	253
	§ 3. Угол между двумя плоскостями	
§ 3. Производные некоторых элементарных функций103	Задачи на повторение	
§ 4. Техника дифференцирования	Итоговый тест	
§ 5. Дифференциал функции		
§ 6. Основные свойства	Модуль 10. Геометрические	247
дифференцируемых функций120	преобразования	207
Упражнения и задачи на повторение 130	§ 1. Понятие геометрического	
Итоговый тест	преобразования.	267
	Изометрические преобразования	
Модуль 5. Приложения производной 134	§ 2. Центральная симметрия	270
§ 1. Роль первой производной в	§ 3. Осевая симметрия § 4. Симметрия относительно плоскости	
исследовании функций		
§ 2. Роль второй производной в	§ 5. Параллельный перенос § 6. Преобразование подобия.	213
исследовании функций	Гомотетия	277
§ 3. Построение графиков функций 148	§ 7. Поворот вокруг прямой	
§ 4. Применение производных в физике,	Задачи на повторение	
геометрии, экономике.	Заоачи на повторение Итоговый тест	
Задачи на максимум и минимум		
Упражнения и заоичи на повторение 100 Итоговый тест 162	Ответы и указания	284

